

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AOS
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
PRM/2019)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ESPECIALIDADES COM ACESSO DIRETO

Anestesiologia	Oftalmologia
Clínica Médica	Ortopedia e Traumatologia
Dermatologia	Otorrinolaringologia
Ginecologia e Obstetrícia	Patologia
Infectologia	Pediatria
Medicina Nuclear	Psiquiatria
Neurologia	Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica

QUESTÃO 1

Sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), analise as afirmativas abaixo e assinale a correta:

- (A) a Bronquite Crônica sem obstrução de longa duração do fluxo aéreo também está incluída na definição de DPOC.
- (B) o único fator de risco reconhecido mundialmente é o consumo de tabaco.
- (C) é uma doença comum, prevenível e tratável, heterogênea em sua apresentação clínica e evolução, caracterizada por limitação do fluxo aéreo, não totalmente reversível e geralmente progressiva.
- (D) o lavado bronco alveolar dos indivíduos fumantes com DPOC contém a mesma quantidade de macrófagos do lavado de não fumantes.
- (E) a espirometria não é importante para o diagnóstico.

QUESTÃO 2

A Crise Febril (CF) é definida como "uma crise epiléptica que ocorre entre _____ e _____ de idade, associada à doença febril, não causada por uma infecção do sistema nervoso central (SNC).

- (A) 6 meses e 6 anos.
- (B) 5 meses e 5 anos.
- (C) 4 meses e 4 anos.
- (D) 3 meses e 3 anos.
- (E) 2 meses e 2 anos.

QUESTÃO 3

Uma equipe de saúde decide realizar uma campanha de vacinação com crianças de um bairro carente. Assinale a opção correta em relação a esta medida:

- (A) Esta medida não é custo-efetiva.
- (B) É prevenção primária, já que atua na fase assintomática da doença.
- (C) É prevenção terciária dirigida a evitar sequelas de uma doença potencialmente letal.
- (D) É prevenção secundária, que visa ao diagnóstico precoce dos casos.
- (E) É prevenção primária, já que está dirigida a prevenir a doença.

QUESTÃO 4

Qual das citocinas está aumentada na fase aguda da cicatrização de feridas e estimula a proliferação e migração dos queratinócitos, sendo um potente mitógeno de células endoteliais vasculares?

- (A) PDGF.
- (B) EGF.
- (C) FGF.
- (D) KGF.
- (E) VEGF.

QUESTÃO 5

Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todo cidadão brasileiro, sem qualquer tipo de discriminação, tem direito ao acesso às ações e serviços de saúde. A alternativa que corresponde a esse princípio é:

- (A) igualdade.
- (B) universalidade.
- (C) equidade.
- (D) autonomia.
- (E) integralidade.

QUESTÃO 6

Na análise dos distúrbios puberais, é importante conhecer a cronologia normal dos eventos puberais. Qual o primeiro sinal puberal nos meninos?

- (A) Pêlos pubianos.
- (B) Aumento do tamanho do pênis.
- (C) Aumento do volume dos testículos.
- (D) Estirão puberal.
- (E) Primeira ejaculação.

QUESTÃO 7

São vacinas realizadas no segundo mês de vida, segundo o Ministério da Saúde:

- (A) Pentavalente / VIP / Pneumocócica 10V / Rotavírus.
- (B) Hepatite B / Meningocócica C / Pneumocócica 10V.
- (C) Pentavalente / Influenza / VIP / Rotavírus.
- (D) BCG / Hepatite B / VIP / Pneumocócica 10V.
- (E) Pentavalente / VIP / Rotavírus / Meningocócica C.

QUESTÃO 8

Com relação ao Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), o anticorpo que é inespecífico, predispõe ao lúpus cutâneo subagudo e ao lúpus neonatal com bloqueio cardíaco congênito, sendo associado a menor risco de nefrite, é:

- (A) anti-Sm.
- (B) anti-DNA.
- (C) anti-Ro.
- (D) anti-RNP.
- (E) anti-P.

QUESTÃO 9

Com relação à Insuficiência Adrenal, podemos afirmar que:

- (A) a suspensão abrupta de prednisona após uso prolongado e doses elevadas é causa de insuficiência adrenal devido ao aumento na produção de ACTH pela glândula hipófise.
- (B) pacientes com insuficiência adrenal crônica não apresentam risco aumentado de crise adrenal aguda quando expostos a infecções graves.
- (C) podem ser considerados sinais e sintomas causados pela deficiência de glicocorticóides: hiperglicemia, hipertensão arterial e hipernatremia.
- (D) a insuficiência adrenal aguda é uma emergência clínica cujo tratamento consiste na correção dos distúrbios hidroeletrólíticos, expansão volêmica e reposição endovenosa de glicocorticoide.
- (E) a hiperpigmentação da pele e mucosas ocorre na insuficiência adrenal primária e secundária.

QUESTÃO 10

São manobras envolvidas na condução do parto pélvico, respeitando-se a sequência:

- (A) de Pajot, de Deventer-Müller, de Bracht / Mauriceau, de Pinard.
- (B) de Bracht / Mauriceau, de Pajot, de Deventer-Müller, de Pinard.
- (C) de Pajot, de Pinard, de Deventer-Müller, de Bracht / Mauriceau.
- (D) de Pinard, de Deventer-Müller, de Pajot, de Bracht / Mauriceau.
- (E) de Deventer-Müller, de Pinard, de Pajot, De Bracht / Mauriceau.

QUESTÃO 11

No concernente à tromboflebite pélvica séptica, o(s) agente(s) mais comum(s), tratamento e complicação(ões), assinale a alternativa respectivamente correlacionada:

- (A) peptococos, peptostreptococos e bacteróides / antibiótico e anticoagulante / pioemia (êmbolos sépticos).
- (B) e. coli / antibiótico / choque séptico.
- (C) anaeróbios e estreptococos / laparotomia / abscesso.
- (D) peptococos, peptostreptococos e bacteróides / antibiótico e anticoagulante / embolia pulmonar maciça mortal.
- (E) e. coli / antibiótico / necrose tecidual.

QUESTÃO 12

As intoxicações exógenas são importantes causas de morbidade, constituindo relevante problema de saúde pública. Assinale a toxíndrome que tem como principais agentes: fenotiazínicos, butirofenonas, fenciclidina (PCP ou pó de anjo), lítio e metoclopramida.

- (A) Extrapiramidal.
- (B) Narcótica.
- (C) Depressiva.
- (D) Anticolinérgica.
- (E) Simpatomimética.

QUESTÃO 13

É fator prognóstico favorável na Leucemia Linfóide Aguda (LLA):

- (A) Idade inferior a 1 ano e superior a 9 anos.
- (B) Leucômetria acima de 50.000/mm³.
- (C) Hipodiploidia menor que 44 cromossomos.
- (D) Linfoblastos precursores de células T.
- (E) Linfoblastos precursores de células B.

QUESTÃO 14

Dentre os fatores de risco para o câncer de endométrio abaixo, o que confere o maior Risco Relativo é:

- (A) Obesidade.
- (B) Tamoxifeno.
- (C) Menopausa tardia.
- (D) Tabagismo.
- (E) Síndrome de Lynch II.

QUESTÃO 15

Os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIES), implantados desde 1993, são unidades de vacinação públicas e gratuitas que oferecem produtos específicos a indivíduos que necessitam de imunobiológicos específicos, mediante prescrição médica. Beneficiam-se dos CRIES, pacientes que podem ser agrupados nas seguintes categorias, EXCETO:

- (A) Profilaxia pré-exposição a agentes infecciosos em determinados grupos de risco.
- (B) Profilaxia pós-exposição a agentes infecciosos em determinados grupos de risco.
- (C) Substituição de produtos disponíveis na rede básica do país, quando não puderem ser utilizados por motivos clínicos.
- (D) Imunização de imunodeficientes.
- (E) Imunização de pacientes hígidos em uso de corticóide por curto período (até 10 dias).

QUESTÃO 16

No trauma hepático, mesmo as lesões de elevada gravidade devem ser consideradas para tratamento não cirúrgico. O principal preditivo do sucesso do tratamento não operatório é:

- (A) estabilidade hemodinâmica.
- (B) acompanhamento através de exames de imagem.
- (C) queda do hematócrito menor que 10 pontos.
- (D) dor abdominal sem irritação peritoneal.
- (E) exames abdominais seriados.

QUESTÃO 17

Paciente de 62 anos, com menopausa há onze anos, comparece para investigação de sangramento transvaginal. A causa mais comum envolvida nesta condição é:

- (A) câncer de endométrio.
- (B) trauma vaginal.
- (C) leiomioma do útero.
- (D) atrofia endometrial.
- (E) pólipos endometrial.

QUESTÃO 18

Sobre o Hipotireoidismo, é correto afirmar que:

- (A) o Hipotireoidismo autoimune nunca está associado ao bócio.
- (B) a deficiência de iodo continua sendo uma causa comum de Hipotireoidismo no mundo inteiro. Nas áreas com suficiência de iodo, a doença autoimune (Tireoidite de Hashimoto) e as causas iatrogênicas (tratamento do Hipertireoidismo) são mais comuns.
- (C) distúrbios infiltrativos: amiloidose, sarcoidose, hemocromatose, esclerodermia e cistinose não podem ser considerados causas de Hipotireoidismo.
- (D) são considerados sintomas: palpitações, perda de peso com apetite aumentado, intolerância ao calor e transpiração.
- (E) a síndrome do túnel do carpo e outras síndromes de encarceramento são comuns no Hipertireoidismo, mas não no Hipotireoidismo.

QUESTÃO 19

A complicação mais preocupante e potencialmente letal da TVP é a embolia pulmonar e, ocasionalmente, será indicado um filtro de veia cava. Dentre as alternativas abaixo, qual NÃO pode ser considerada indicação para seu implante?

- (A) Tromboembolismo recorrente apesar da anticoagulação adequada.
- (B) Tromboflebite superficial.
- (C) Complicações de anticoagulação.
- (D) Trombo venoso iliofemoral em propagação na vigência de anticoagulação.
- (E) Embolismo pulmonar crônico com hipertensão pulmonar resultante.

QUESTÃO 20

As infecções adquiridas intraútero ou durante o trabalho de parto são causas de significativa morbidade e mortalidade neonatal.

Um recém nascido exposto, que apresente uma ou mais das seguintes manifestações clínicas: rash maculopapular (palmas das mãos e plantas dos pés), rinite persistente, osteocondrite, periostite, e pseudoparalisia de Parrot, possui como diagnóstico mais provável:

- (A) Toxoplasmose.
- (B) Sífilis.
- (C) Rubéola.
- (D) Citomegalovírus.
- (E) Herpes simples.

QUESTÃO 21

Em relação ao Colangiocarcinoma, qual das alternativas NÃO contra-indica sua ressecção completa (R0)?

- (A) Comprometimento do ducto hepático bilateral até os ductos secundários.
- (B) Envolvimento bilateral a artéria hepática.
- (C) Envolvimento da veia porta, próximo a sua bifurcação.
- (D) Metástases à distância.
- (E) Comprometimento de estruturas vasculares unilobares.

QUESTÃO 22

Paciente de 20 anos, obesa, apresenta oligomenorréia e hirsutismo desde a puberdade. Sua avaliação laboratorial mostra prolactina, TSH e cortisol normais e, 17-hidroprogesterona elevada. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Anovulação crônica de causa hipotalâmica.
- (B) Síndrome dos ovários policísticos.
- (C) Hiperplasia adrenal na forma tardia.
- (D) Tumor ovariano produtor de androgênio.
- (E) Síndrome de Kallman.

QUESTÃO 23

Podemos afirmar que na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA):

- (A) são doenças oportunistas definidoras: candidíase de esôfago e hanseníase.
- (B) o agente etiológico é o HIV, que pertence à família dos retrovírus humanos e à subfamília dos lentivírus.
- (C) atualmente há evidências de que o HIV seja transmitido por contato casual e até que o vírus seja propagado por insetos.
- (D) nos pacientes não tratados ou nos quais o tratamento não conseguiu controlar de forma adequada a replicação viral, a contagem de células T CD4+ aumenta depois de um período variável abaixo de um limiar crítico.
- (E) são doenças oportunistas definidoras: hanseníase e pneumonia.

QUESTÃO 24

Na classificação da Insuficiência Cardíaca (New York Heart Association), pertencem a classe funcional III, pacientes com cardiopatia que:

- (A) resulta em evidente limitação das atividades físicas. Ficam confortáveis em repouso. Atividades físicas mínimas causam fadiga, palpitação, dispnéia ou dor anginosa.
- (B) os torna incapacitados para realizar qualquer atividade física sem desconforto.
- (C) dê sintomas de insuficiência cardíaca ou de síndrome anginosa mesmo durante o repouso. Se qualquer atividade física for realizada, o desconforto aumentará.
- (D) atividades físicas normais não causam fadiga exagerada, palpitações, dispnéia ou dor anginosa. Não limitam atividades físicas.
- (E) resulta em pequenas limitações das atividades físicas. Ficam confortáveis em repouso. A atividade física normal resulta em fadiga, palpitações, dispnéia ou dor anginosa.

QUESTÃO 25

São doenças de notificação compulsória no Brasil:

- (A) acidente de trabalho com exposição a material biológico e doença de Chagas.
- (B) acidente por animal peçonhento e doença meningocócica.
- (C) síndrome da rubéola congênita e nocardiose.
- (D) febre tifóide e endocardite.
- (E) doença herpética neonatal e febre reumática.

QUESTÃO 26

Sobre a Neoplasia Intraepitelial Vulvar (NIV) avalie as afirmativas:

- I- A vulvectomy pode ser utilizada como tratamento.
- II- A Doença de Paget da Vulva acomete principalmente mulheres brancas na pós-menopausa.
- III- O melanoma disseminado superficial é diagnóstico diferencial da Doença de Paget da Vulva.

Estão corretas:

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas a afirmativa II está correta.
- (C) Apenas a afirmativa III está correta.
- (D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 27

Um paciente tem IMC igual a 30 e circunferência abdominal de 95 cm. Realizou glicemia de jejum para rastreio de Diabetes. Este é um tipo de prevenção:

- (A) Primordial.
- (B) Primária.
- (C) Secundária.
- (D) Terciária.
- (E) Quaternária.

QUESTÃO 28

Sobre cardiopatias e gestação, é INCORRETO afirmar.

- (A) A ecocardiografia fetal está indicada pela possibilidade de transmissão congênita.
- (B) A via de parto preferencial é a cesariana.
- (C) Deve-se evitar anemia e infecção.
- (D) Na Síndrome de *Eisenmenger*, há indicação de aborto terapêutico.
- (E) A valvopatia mais importante é a estenose mitral.

QUESTÃO 29

Dentre as afirmativas abaixo, qual é considerada um fator desfavorável à cicatrização de fístulas intestinais externas:

- (A) origem colônica.
- (B) fístula lateral.
- (C) trato não epitelizado.
- (D) parede abdominal intacta ou não doente.
- (E) trajeto curto (menor que 2cm).

QUESTÃO 30

Com relação ao Choque Séptico, podemos afirmar que:

- (A) uma característica é a redução da resistência vascular periférica que ocorre a despeito dos níveis elevados de catecolaminas vasopressoras.
- (B) durante o período "hipodinâmico", a concentração sanguínea de lactato encontra-se baixa e a saturação venosa central de oxigênio se mostra alta.
- (C) não há necessidade de dosar lactato sérico.
- (D) a síndrome de angústia respiratória (SARA) não é uma complicação.
- (E) a depressão da função miocárdica, evidenciada pelo aumento dos volumes ventriculares diastólicos e sistólicos finais, bem como pela redução da fração de ejeção, surge em até uma semana na maioria dos pacientes.

QUESTÃO 31

Qual o padrão-ouro para o diagnóstico e quantificação do refluxo gastroesofágico?

- (A) Esofagografia.
- (B) Endoscopia digestiva alta.
- (C) Manometria esofágica.
- (D) pHmetria de 24 horas.
- (E) Ultrassonografia endoscópica.

QUESTÃO 32

Pacientes com câncer no ápice do pulmão e extensão local para o estreito torácico podem ter dor no ombro e braços, síndrome de *Horner* e, ocasionalmente, parestesia na distribuição do nervo ulnar da mão (quarto e quinto dedos). Os pacientes com todas essas características podem ser classificados como tendo síndrome de *Pancoast*. Neste caso, a dor é procedente de quais raízes nervosas:

- (A) C7 e C8.
- (B) C8 e T1.
- (C) T1 e T2.
- (D) T2 e T3.
- (E) C7 e T3.

QUESTÃO 33

Podemos afirmar que a maioria dos casos de anemia megaloblástica são ocasionados por deficiência de:

- (A) cobalamina e folato.
- (B) piridoxina e tiamina.
- (C) ácido ascórbico e niacina.
- (D) piridoxina e ácido fólico.
- (E) tiamina e cobalamina.

QUESTÃO 34

Com relação ao desenvolvimento infantil normal, é esperado que uma criança de 12 meses seja capaz de:

- (A) rabiscar, obedecer ordens, nomear objetos.
- (B) retirar uma vestimenta, tentar impor sua vontade.
- (C) falar as primeiras palavras, dar os primeiros passos.
- (D) correr, formular frases simples, subir escadas.
- (E) bater palmas, acenar, combinar sílabas.

QUESTÃO 35

Paciente deu entrada no Pronto Socorro de olhos abertos e apresentando retirada dos membros aos estímulos dolorosos. Quando questionado, respondeu de forma confusa às perguntas. Qual a pontuação obtida na escala de coma de *Glasgow* deste paciente?

- (A) 10
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 7
- (E) 13

QUESTÃO 36

O *rash* malar típico, "em asa de borboleta", caracterizado por uma lesão maculopapular que inclui o nariz e a região maxilar, mas preserva as dobras labiais, ocorre em cerca de 30% dos casos da seguinte doença:

- (A) Dermatomiosite.
- (B) Lúpus Eritematoso Sistêmico.
- (C) Artrite idiopática juvenil.
- (D) Esclerodermia.
- (E) Púrpura de Henoch Schonlein.

QUESTÃO 37

Paciente de 15 anos queixando-se de dor pélvica há um ano, sem menarca. Estatura e desenvolvimento de caracteres sexuais são normais para idade. Dosagens normais de prolactina e TSH. Teste de progesterona e de estrogênio negativos. Dentre as opções, a mais provável é:

- (A) Tumor de hipófise
- (B) Anovulação
- (C) Hímen imperfurado
- (D) Disgenesia Gonadal
- (E) Tumoração ovariana

QUESTÃO 38

A capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro chama-se:

- (A) Patogenicidade.
- (B) Infectividade.
- (C) Virulência.
- (D) Suscetibilidade.
- (E) Poder imunogênico.

QUESTÃO 39

Dentre os preditores clínicos de aumento do risco cardiovascular perioperatórios, qual aquele que corresponde a Risco Intermediário?

- (A) síndromes coronarianas instáveis.
- (B) insuficiência cardíaca descompensada.
- (C) bloqueio atrioventricular de alto grau.
- (D) infarto agudo do miocárdio anterior identificado pelo histórico ou evidências patológicas.
- (E) eletrocardiograma anormal (hipertrofia ventricular esquerda, bloqueio do ramo esquerdo, anormalidades no segmento ST-T).

QUESTÃO 40

Quais são as vacinas recomendadas para indivíduos nas faixas etárias de 20 a 59 anos e de 60 anos ou mais, conforme recomendação do calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde 2019?

- (A) apenas Hepatite B para ambas as faixas etárias.
- (B) apenas Dupla bacteriana adulto (dT) para ambas as faixas etárias.
- (C) Hepatite B (recombinante) e Dupla bacteriana adulto (dT).
- (D) apenas Tríplice viral (SCR).
- (E) tríplice viral (SCR) e Hepatite B.

QUESTÃO 41

Durante as primeiras 48 a 72 horas após uma intervenção cirúrgica no abdome, acredita-se que a maioria dos tipos de febre seja causada por:

- (A) infecção.
- (B) pneumonia.
- (C) atelectasia.
- (D) abscesso.
- (E) emocional.

QUESTÃO 42

Sabe-se que é recomendada a profilaxia antibiótica para Endocardite Infecçiosa nos pacientes portadores de condições de risco, quando submetidos a procedimentos de alto risco. Em qual das seguintes condições de risco, a profilaxia está indicada?

- (A) Prolapso de valva mitral sem regurgitação.
- (B) Comunicação Interatrial (CIA) *Osmium Secundum*.
- (C) Doença de Kawasaki sem disfunção valvar.
- (D) Valvopatia reumática.
- (E) Marcapasso cardíaco.

QUESTÃO 43

Dentre as manobras abaixo citadas, a que consiste em importante passo para o controle das hemorragias puerperais é:

- (A) manobra de *Taxe*.
- (B) manobra de *Ritgen*.
- (C) manobra de *Hamilton*.
- (D) manobra de *Rubin*.
- (E) manobra de *Jacob-Dublin*.

QUESTÃO 44

Na investigação de amenorréia, assinale a afirmativa correta sobre o teste de progesterona oral positivo:

- I- Não há obstrução da drenagem do fluxo.
- II- Há ausência de útero.
- III- Há estrogênio circulante.
- IV- Os níveis de progesterona estão normais.
- V- A anovulação está descartada.

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

QUESTÃO 45

Recém-nascido prematuro (IG: 28 semanas) apresentando desconforto respiratório desde o nascimento com piora progressiva nas primeiras horas de vida. A radiografia de tórax evidenciou infiltrado retículo granular difuso distribuído de maneira uniforme (aspecto de "vidro moído ou vidro fosco"), broncograma aéreo periférico e aumento de líquido pulmonar. Qual o provável diagnóstico?

- (A) Taquipneia transitória do recém-nascido.
- (B) Pneumonia bacteriana congênita.
- (C) Síndrome de aspiração meconial.
- (D) Hipertensão pulmonar persistente.
- (E) Doença de membrana hialina.

QUESTÃO 46

A vigilância epidemiológica identifica uma epidemia que, em um breve intervalo de tempo, apresenta uma rápida progressão, até atingir uma incidência máxima. Podemos classificá-la como:

- (A) Explosiva.
- (B) Propagada.
- (C) De contágio.
- (D) Expansiva.
- (E) Origem em bairros diferentes com transmissão de pessoa a pessoa.

QUESTÃO 47

Correspondem às causas mais comuns de Pancreatite Aguda:

- (A) divertículo periampular e hiperlipidemia.
- (B) insuficiência renal e vasculite.
- (C) autoimune e câncer de pâncreas.
- (D) infecção e fibrose cística.
- (E) cálculos biliares e álcool.

QUESTÃO 48

A reanimação neonatal depende da avaliação simultânea da respiração e da frequência cardíaca (FC). O principal determinante da decisão de indicar as diversas manobras de reanimação no recém nascido logo após o nascimento é:

- (A) Desconforto respiratório.
- (B) Frequência respiratória.
- (C) Frequência cardíaca.
- (D) Cianose central.
- (E) Apgar.

QUESTÃO 49

Assinale a opção que descreve a vacina indicada para todos os povos indígenas, independente da área com recomendação de vacina (ACRV):

- (A) DTP.
- (B) Febre Amarela.
- (C) Rotavírus.
- (D) Tríplice Viral.
- (E) Hepatite B.

QUESTÃO 50

São considerados fármacos que podem causar crises epiléticas, EXCETO:

- (A) quinolonas, aciclovir e isoniazida.
- (B) tramadol, fentanil e meperidina.
- (C) paracetamol, dipirona e ácido acetil salicílico.
- (D) bupropiona, clozapina e lítio.
- (E) cloroquina, mefloquina e clorambucil.

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
- 4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 6 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 7 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 8 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 90 minutos.
- 9 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
 - e) cometer ato grave de indisciplina; e
 - f) comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 10 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assine o seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

- 12 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50