

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

*Concurso Público para ingresso no Quadro de Apoio à
Saúde do Corpo de Saúde da Marinha
CP-CSM-S/2017*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO
DE MATERIAL EXTRA**

FONOAUDIOLOGIA

QUESTÃO 1

No que diz respeito à ausculta cervical, é correto afirmar que

- (A) é o procedimento que permite ouvir os sons pulmonares mediante o uso de estetoscópios, microfones e acelerômetros.
- (B) auxilia na avaliação da fase esofágica da deglutição.
- (C) a precisão e o detalhamento das informações captadas pela ausculta não dependem do instrumento utilizado.
- (D) o estetoscópio pediátrico é o mais adaptável ao pescoço do paciente traqueostomizado.
- (E) a deglutição normal produz um clique e dois sopros expiratórios à ausculta.

QUESTÃO 2

Segundo Zorzi (2009), o aspecto da linguagem escrita que se revela como o de maior desafio, o de maior complexidade para a aprendizagem da ortografia, denomina-se

- (A) apoio na oralidade.
- (B) representações múltiplas.
- (C) troca surda/sonora.
- (D) omissões.
- (E) confusão entre letras parecidas.

QUESTÃO 3

É correto afirmar que um paciente que apresenta redução ou ausência do reflexo nauseoso, disfagia por disfunção muscular da laringe, regurgitamento nasal de alimentos, ressonância nasal e disфония tem lesão de

- (A) núcleo do nervo vago.
- (B) nervo faríngeo inferior.
- (C) núcleo do nervo glossofaríngeo.
- (D) nervo laríngeo medial.
- (E) nervo Trígêmeo.

QUESTÃO 4

De acordo com Darley, Aronson e Brown (1975), sobre a classificação das disartrofonias, assinale a opção que apresenta o único tipo que não é observado nos Distúrbios do Movimento.

- (A) Espástico.
- (B) Hipocinético.
- (C) Flácido.
- (D) Atáxico.
- (E) Hipercinético.

QUESTÃO 5

Segundo Zaliouk (1960), o efeito de um mecanismo deficiente de monitoramento de voz em crianças surdas leva a uma produção de voz do tipo

- (A) gutural, aguda e tensa.
- (B) falsete, grave e hipernasal.
- (C) bitonal, aguda e tensa.
- (D) falsete, aguda e tensa.
- (E) monótona, grave e hipernasal.

QUESTÃO 6

Sobre a realização da audiometria tonal liminar, durante a pesquisa da condução óssea, assinale a opção INCORRETA.

- (A) O objetivo principal desse teste é investigar as condições de orelha interna.
- (B) O vibrador ósseo apresenta limitações mecânicas para a transmissão de frequências abaixo de 250 Hz.
- (C) É importante evitar a proximidade de estruturas que possam amortecer a vibração, como cabelo e hastes de óculos.
- (D) Mudanças de posição do vibrador na mastoide podem provocar mudanças de até 10 dB nas respostas.
- (E) A atenuação interaural sempre estará presente, pois as duas cócleas são estimuladas simultaneamente.

QUESTÃO 7

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.

Na proposição piagetiana, a linguagem é uma função cognitiva, que emerge como fruto de uma evolução que se inicia no período _____, num processo que, de forma contínua, supõe dois polos formadores de esquemas: o da _____ e o da _____.

- (A) sensório-motor / acomodação / assimilação
- (B) pré-silábico / manutenção / sintetização
- (C) pré-silábico / acomodação / sintetização
- (D) simbólico / perpetuação / assimilação
- (E) sensório-motor / perpetuação / sintetização

QUESTÃO 8

Com relação ao distúrbio fonológico, assinale a opção correta.

- (A) Uma alteração no desenvolvimento fonológico indica dificuldades potenciais em diversos níveis, como a discriminação de diferenças fonéticas.
- (B) Não provoca impacto na articulação e no conhecimento internalizado de uma língua.
- (C) A alteração fonética pode afetar o modo pelo qual a informação sonora é armazenada e representada no léxico mental.
- (D) A alteração fonêmica pode refletir na inabilidade para articular os sons da fala envolvendo componente motor.
- (E) Não afeta a produção e/ou a representação mental dos sons da fala de determinada língua.

QUESTÃO 9

O surgimento de equipamentos capazes de capturar as emissões otoacústicas (EOA) aprimorou a prática audiológica, fornecendo um potente instrumento não invasivo para estudo sobre os mecanismos cocleares. Sobre o exame de EOA, assinale a opção correta.

- (A) Torna possível, de maneira fácil e não invasiva, o exame da modulação aferente dos mecanismos cocleares.
- (B) Por se tratar de um exame objetivo, não sofre interferências de fatores como o ajuste da sonda na orelha e o estado comportamental do paciente.
- (C) O procedimento é altamente sensível a patologias de orelha média ou externa, o que pode gerar resultados falso-negativos.
- (D) Por ser uma medida eletroacústica, as OEA constituem um teste direto da audição, fornecendo informações sobre parte do sistema auditivo.
- (E) Possibilita o diagnóstico diferencial entre patologias sensoriais e neurais.

QUESTÃO 10

A videoendoscopia da deglutição é um método instrumental, utilizado para complementar a avaliação fonoaudiológica clínica em pacientes com sinais e sintomas de disfagia. Com relação a esse exame pode-se afirmar que

- (A) não permite avaliar a sensibilidade faríngea e laríngea.
- (B) possibilita avaliar a dinâmica de todas as fases da deglutição.
- (C) não possibilita avaliar o funcionamento do esfíncter velofaríngeo.
- (D) não permite avaliar, o momento exato da deglutição, devido à apnéia.
- (E) permite mensurar a excursão laríngea em sua amplitude máxima.

QUESTÃO 11

Com relação à fonoterapia nas paralisias laríngeas, assinale a opção correta.

- (A) O relaxamento da região cervical, geralmente prejudicial à qualidade vocal no início do tratamento, torna-se necessário em casos de hipercompensação funcional.
- (B) A frequência fundamental grave auxilia na coaptação glótica, nivelando pregas vocais e elevando a laringe.
- (C) O posicionamento da cabeça com inclinação posterior pode comprometer a adução glótica, por desfavorecer a elevação da laringe.
- (D) Os exercícios de *pushing* não são indicados, pois pioram o condicionamento muscular e a firmeza glótica.
- (E) A técnica do "espaguete retido" promove a abdução por atividade dos músculos intrínsecos da laringe.

QUESTÃO 12

Considerando-se o trabalho fonoaudiológico vocal em crianças com fissura palatina, deve-se enfatizar, EXCETO:

- (A) exercícios de sobrearticulação.
- (B) técnica mastigatória ou som basal.
- (C) empuxo em fonemas fricativos sonoros.
- (D) técnica do bocejo-suspiro.
- (E) voz salmodiada.

QUESTÃO 13

Sobre a Discalculia do Desenvolvimento, é correto afirmar que

- (A) está associada a uma hipoperfusão em regiões parietais do encéfalo.
- (B) caracteriza-se por um desempenho em aritmética abaixo do esperado e pode ser explicada por déficits sensoriais.
- (C) ocorre em crianças com inteligência normal e se explica pela falta de acesso ao ensino formal adequado.
- (D) crianças com Discalculia do Desenvolvimento demonstram dificuldades nas habilidades verbais
- (E) é decorrente de disfunções nos sistemas mnemônicos, atencional e visuoespacial, assim como do ensino inadequado.

QUESTÃO 14

São algumas das principais alterações encontradas na leitura de escolares com dificuldade de aprendizagem, EXCETO

- (A) atenção fracionada.
- (B) nomeação rápida.
- (C) consciência fonológica.
- (D) memória de trabalho.
- (E) vocabulário expressivo.

QUESTÃO 15

Com relação à aquisição da fala, assinale a opção correta.

- (A) Até mais ou menos 2 meses de idade, o bebê apresenta o choro como comunicação intencional, não verbal, sendo a forma de expressar suas necessidades básicas.
- (B) Os aspectos motores do desenvolvimento não contribuem para a evolução da comunicação e da linguagem nos primeiros meses de vida.
- (C) Por volta de 12 meses de idade, o sistema fonológico amplia-se significativamente, iniciando o uso de estruturas silábicas mais complexas, combinando-as em frases de 2 ou 3 elementos.
- (D) Até aproximadamente o 5º mês de vida, a produção vocal ocorre por ato reflexo de vocalizações, o que explica os balbucios em bebês surdos.
- (E) Ao atingir 18 meses, a criança já produz uma média de 50 palavras, faz uso de palavras isoladas de contexto familiar e já demonstra compreensão de ordens simples.

QUESTÃO 16

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.

Dentre os tipos de cirurgias para ressecção de tumor laríngeo, a laringectomia _____, hemilaringectomia, leva ao uso de uma fonte sonora _____, e o foco da reabilitação nestes casos é a _____.

- (A) quase-total / esofágica / introdução do ar no esôfago
- (B) horizontal / glótica / estabilização da emissão e ressonância
- (C) parcial vertical / supraglótica / redução da soproidade
- (D) horizontal / supraglótica / sonorização e o controle da oclusão do traqueostoma
- (E) parcial vertical / infraglótica / redução da frequência fundamental

QUESTÃO 17

No que se refere aos aspectos biofísicos da audição, sobre a Teoria da forma cônica da cóclea, assinale a opção correta.

- (A) Nessa estrutura, acontece a transdução do impulso nervoso em onda hidráulico-mecânica.
- (B) Esse formato cônico, possivelmente, serve como um corretor de perdas mecânicas.
- (C) A cóclea é topograficamente dividida por frequência, os tons graves são captados na base e os agudos, no ápice.
- (D) A membrana de Reissner permite eliminar qualquer diferença de pressão entre as escalas vestibular e timpânica.
- (E) O helicotrema, também chamado de "bateria" da cóclea, é importante para a geração dos potenciais intracocleares.

QUESTÃO 18

Recém-nascido com 2 semanas de vida e desenvolvimento normal, apresentando respiração ruidosa de grau variável, que ocorre tanto em repouso quanto em atividade, com sinais de obstrução de vias aéreas superiores, estridor inspiratório, que piora durante a alimentação. É correto afirmar que o texto acima se refere a um bebê com

- (A) fissura palatina.
- (B) mielomeningocele.
- (C) laringomalácia.
- (D) anquiloglossia.
- (E) micrognatia.

QUESTÃO 19

De acordo com Bianchini (1995), a desproporção maxilomandibular em que a língua tende a acomodar-se no assoalho da boca, tornando-se hipocontraída e simulando uma macroglossia, cujo padrão de mastigação apresenta predomínio de movimentos verticais de mandíbula com excessiva participação de dorso da língua para amassamento, corresponde

- (A) ao retrognatismo.
- (B) à mordida aberta anterior.
- (C) à sobremordida.
- (D) ao prognatismo.
- (E) à classe II, 2ª divisão.

QUESTÃO 20

De acordo com Granja (2011), até que idade a criança apresenta uma cavidade oral ainda pequena em relação à língua, que favorece o ceceio ou, seja, a protrusão da língua em fonemas sibilantes?

- (A) 4 anos.
- (B) 5 anos.
- (C) 6 anos.
- (D) 7 anos.
- (E) 8 anos.

QUESTÃO 21

Crianças que não desenvolvem a linguagem de forma esperada chegam aos 5 ou 6 anos de idade com padrões atípicos de desenvolvimento e mantêm dificuldades significativas com relação à linguagem ao longo da vida, principalmente na escolaridade, o que configura um quadro típico de

- (A) Distúrbio Específico de Linguagem.
- (B) perda auditiva.
- (C) síndrome do dialeto estrangeiro.
- (D) afasia infantil.
- (E) lesões neurológicas adquiridas.

QUESTÃO 22

Uma variedade de alterações de fala e de linguagem pode surgir em decorrência de uma lesão no Sistema Nervoso Central (SNC). A afasia é definida como uma alteração no conteúdo, na forma e no uso da linguagem e de seus processos cognitivos subjacentes. Sobre essa condição é correto afirmar que

- (A) na afasia transcortical motora, são marcantes os erros encontrados na prova de repetição e a emissão mostra-se muito mais prejudicada do que na fala espontânea.
- (B) a afasia amnésica é uma afasia não fluente caracterizada por alterações semânticas, como as parafasias, perífrases e anomias.
- (C) na afasia de condução, o paciente é não fluente, apresenta muitas parafasias fonêmicas e verbais formais e em seu discurso podem aparecer hesitações e autocorreções.
- (D) a afasia transcortical sensorial é uma afasia não fluente caracterizada por parafasias semânticas, anomias e circunlóquios.
- (E) na afasia de Wernicke, a fala é logorreica, jargonafásica, com muitos neologismos, a repetição encontra-se bastante prejudicada e a associação com anosognosia é muito frequente.

QUESTÃO 23

Com relação aos testes utilizados para avaliar o processamento auditivo central, assinale a opção correta.

- (A) O SSW avalia o subprocesso/habilidade auditiva de figura-fundo (separação binaural), utilizando como estímulo principal sons não verbais.
- (B) O Teste Padrão Duração (TPD) avalia o subprocesso/habilidade auditiva de resolução temporal, apresentando como estímulo o tom puro.
- (C) O RGDT avalia o subprocesso/habilidade auditiva de discriminação da frequência sonora, por meio da apresentação de ruído branco como estímulo.
- (D) O SSI-MCI é um teste monoaural de baixa redundância, que avalia o subprocesso/habilidade auditiva de figura-fundo para sons verbais, utilizando como estímulo principal 25 palavras monossílabas.
- (E) O teste de fala com ruído é um teste monoaural de baixa redundância, que avalia a habilidade auditiva de fechamento, utilizando como ruído competitivo o ruído branco.

QUESTÃO 24

A disfagia é uma característica comum nas disordens degenerativas. Sintomas iniciais como dificuldade para deglutir sólidos, tempo de refeição prolongado e necessidade de ingerir porções menores, associados à fadiga durante a alimentação, são características específicas de que condição?

- (A) Esclerose Múltipla.
- (B) Síndrome de Guillain-Barré.
- (C) Doença de Huntington.
- (D) Esclerose Lateral Amiotrófica.
- (E) Doença do Neurônio Motor.

QUESTÃO 25

Cada sistema de escrita possui uma característica própria que, dependendo da menor unidade linguística codificada na unidade básica da escrita, pode ser classificado como

- (A) logográfico, silábico e alfabético.
- (B) pragmático, semântico e alfabético.
- (C) logográfico, semântico e lexical.
- (D) silábico, ortográfico e lexical.
- (E) ortográfico, pragmático e alfabético.

QUESTÃO 26

Com relação ao diagnóstico diferencial da disfluência neurológica, analise as informações abaixo.

- I- Repetições, prolongamentos e bloqueios estão restritos às sílabas iniciais de palavras grandes e aos substantivos.
- II- A movimentação secundária, quando presente, manifesta-se de forma amena.
- III- Há notória ansiedade em relação às rupturas na fala, evitando emitir certas palavras e situações de comunicação.
- IV- O efeito de adaptação na leitura dificilmente será observado.
- V- A disfluência permanece mesmo durante a fala automática e o canto.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
- (E) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 27

Com relação à localização dos eventos de gagueira em adultos, é correto afirmar que as disfluências ocorrem com maior frequência

- (A) em palavras-conteúdo.
- (B) em palavras de função.
- (C) no meio da unidade lexical.
- (D) no final da unidade lexical.
- (E) em palavras iniciadas por vogais.

QUESTÃO 28

Segundo a classificação dos graus de perda auditiva, proposta pela OMS (2014), é correto afirmar que

- (A) na criança, a audição é considerada normal quando a média entre as frequências 500, 1000, 2000 e 4000 Hz encontra-se entre 0-15 dB.
- (B) indivíduos com perda auditiva leve podem ouvir e repetir palavras em volume elevado a um metro de distância.
- (C) em crianças, classifica-se a perda auditiva como moderada quando a média das frequências 250, 500, 1000 e 2000 Hz encontra-se entre 41-60 dB.
- (D) nos casos de perdas auditivas severas, o paciente é incapaz de ouvir e entender, mesmo em voz gritada.
- (E) a classificação dos graus é calculada pela média entre as frequências de 250, 500, 1000 e 2000 Hz.

QUESTÃO 29

No que diz respeito à amplificação sonora em bebês, é correto afirmar que

- (A) o processo de adaptação do aparelho deve contemplar as mesmas 4 etapas utilizadas com o adulto: avaliação, seleção, calibração e validação.
- (B) o algoritmo nível de sensação desejado (DSL) oferece um método sistemático para o ajuste pediátrico de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) e assegura a audibilidade do tom puro amplificado.
- (C) a etapa da calibração é fundamental para nos certificarmos se a programação feita no aparelho gera o Nível de Pressão Sonora (NPS) necessário para tornar a fala audível e confortável.
- (D) o processo de validação corresponde à mensuração dos limiares eletrofisiológicos em situações clínicas preestabelecidas.
- (E) na etapa da avaliação, o diagnóstico audiológico nos primeiros meses de vida é baseado em respostas eletrofisiológicas por frequência específica, em dB_{HL}.

QUESTÃO 30

Com relação ao envelhecimento natural, é correto afirmar que

- (A) acarreta modificações heterogêneas nas habilidades de comunicação em razão das diferenças individuais decorrentes da história de vida.
- (B) constitui uma deterioração das habilidades intelecto-cognitivas que passam a interferir nas atividades de vida diária da pessoa.
- (C) consiste na dificuldade de interpretar informações contextuais devido a problemas na construção de relações interpretativas.
- (D) as principais características são os distúrbios no conteúdo semântico da linguagem e o déficit no raciocínio linguístico.
- (E) influencia o comportamento social, a memória, o julgamento, a linguagem e as percepções, assim como as interações sociais.

QUESTÃO 31

Paciente do sexo masculino, 34 anos de idade, com histórico de exposição a ruído no trabalho, vem apresentando zumbido bilateral e dificuldades auditivas em situações sociais, quando há ruído competitivo no ambiente. Seu exame audiométrico evidencia perda auditiva sensorineural moderada a severa e, durante a pesquisa dos reflexos acústicos na imitanciometria, observam-se todos os reflexos presentes. Na comparação entre os limiares do reflexo acústico contralateral e o limiar tonal na mesma frequência, há uma diferença de 40dB. É correto afirmar que esse paciente apresenta

- (A) Fenômeno de Túlio.
- (B) Microfonismo coclear.
- (C) Disfunção tubária.
- (D) Recrutamento de Metz.
- (E) Integração multissensorial.

QUESTÃO 32

Qual síndrome é caracterizada pela falta de sincronia entre o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento de linguagem, em que os déficits linguísticos são maiores que os cognitivos?

- (A) Down.
- (B) Goldenhar.
- (C) Moebius.
- (D) Pierre Robin.
- (A) Asperger.

QUESTÃO 33

Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo, em relação ao desenvolvimento da linguagem, e assinale, a seguir, a opção que apresenta a sequência correta.

- () O processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem se dá como resultado das interações entre a biologia e as experiências do indivíduo no meio.
- () O significante se refere ao uso funcional da linguagem, considerado como o responsável pela comunicação no meio social.
- () O significado é constituído pela combinação hierárquica dos seguintes elementos: fonemas, palavras, orações e discurso.
- () O uso efetivo da linguagem só ocorre com a intersecção harmônica dos componentes fonológico, semântico-lexical, morfossintático e pragmático.

- (A) (V) (F) (F) (V)
- (B) (F) (F) (F) (V)
- (C) (F) (V) (F) (V)
- (D) (V) (F) (V) (F)
- (E) (F) (V) (V) (F)

QUESTÃO 34

Quanto às principais características da apraxia da fala, assinale a opção correta.

- (A) Quando pacientes apráxicos realizam leituras repetitivas de um mesmo material, observa-se diminuição significativa no número de erros fonêmicos.
- (B) Os erros relacionados ao modo articulatório são mais frequentes do que os relacionados à zona de articulação.
- (C) Pacientes apráxicos apresentam a fala automática relativamente preservada e a fala espontânea extremamente prejudicada.
- (D) A repetição apresenta-se melhor que a fala espontânea, além de o paciente apresentar menor latência na realização dessa tarefa.
- (E) Consoantes iniciais são melhor articuladas quando comparadas às consoantes que se encontram em outras posições.

QUESTÃO 35

Como se denomina a fenda glótica decorrente de um estado de contração intensa da musculatura intrínseca da laringe, com predisposição a nódulos?

- (A) Triangular anteroposterior.
- (B) Triangular médio-posterior.
- (C) Triangular fusiforme.
- (D) Fusiforme posterior.
- (E) Fusiforme anterior.

QUESTÃO 36

Segundo Colella-Santos (2009), com relação à triagem auditiva em crianças, na idade escolar, é correto afirmar que

- (A) os procedimentos para a triagem devem ser rápidos, mas complexos.
- (B) deve ser realizada, principalmente, entre 4 e 7 anos, com atenção diferenciada para as crianças de 6 anos.
- (C) deve priorizar todas as crianças, não somente aquelas cujos pais apresentem queixas de alterações de fala e/ou dificuldade de aprendizagem.
- (D) justifica-se na medida em que um pequeno número de crianças em idade escolar falha.
- (E) a falha na triagem não é sugestiva de alterações periféricas e/ou de alterações nas habilidades auditivas.

QUESTÃO 37

Entre os procedimentos para a avaliação eletrofisiológica da audição, está a Resposta Auditiva de Estado Estável (RAEE). Sobre esse exame assinale a opção correta.

- (A) Pode ser utilizado para a avaliação dos níveis máximos de resposta da criança, fazendo uso de amplificação.
- (B) A resposta é obtida apresentando-se um estímulo em um ritmo suficientemente lento.
- (C) Os principais parâmetros analisados são as frequências portadoras e a estimulação de múltiplas frequências.
- (D) Para atingir uma condição satisfatória de exame a criança deve estar em estado de alerta.
- (E) Em candidatos ao implante coclear, a RAEE pode avaliar a audição remanescente e auxiliar na escolha do lado a ser implantado.

QUESTÃO 38

Sobre a pesquisa do reflexo acústico na Imitancíometria, assinale a opção correta.

- (A) O arco reflexo estapédio-coclear é uma atividade exercida basicamente pelo corpo caloso.
- (B) A única função do reflexo acústico do músculo estapédio é a proteção da orelha interna.
- (C) O arco reflexo estapédio-coclear depende apenas da integridade das vias auditivas de associação.
- (D) O estudo da latência do reflexo acústico acrescenta informações somente sobre a via auditiva central.
- (E) O reflexo acústico pode ser investigado tanto por seu limiar quanto pela sua latência.

QUESTÃO 39

Sobre as propriedades contráteis da musculatura intrínseca da laringe, quais músculos de contração rápida estão envolvidos na proteção das vias aéreas?

- (A) TA, IA e CAP
- (B) TA, CAL e CAP
- (C) TA, CAL e IA
- (D) CT, CAP e IA
- (E) CT, IA e CAL

QUESTÃO 40

Ainda não se sabe exatamente como e quanto a via auditiva periférica e central da criança é afetada pela exposição a sons intensos, mas sabe-se que o critério de segurança para exposição a níveis de pressão sonora elevados (NPSE) deve ser baseado em uma atitude mais conservadora quando comparada aos critérios aplicados aos adultos. Sobre esse assunto é correto afirmar que

- (A) o programa *Dangerous Decibels* tem como objetivo reduzir a incidência de Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados (PAINPSE), e de zumbido entre adultos e idosos.
- (B) ainda não há uma versão do roteiro da atividade educativa do *Dangerous Decibels* traduzida para o português.
- (C) o uso de protetores auditivos deve ser a primeira opção em termos de proteção auditiva.
- (D) uma perda auditiva neurossensorial a partir de grau severo é suficiente para levar a criança ao fracasso acadêmico.
- (E) a permanência em UTI Neonatal pode ser considerada uma das situações de risco de exposição a NPSE para crianças.

QUESTÃO 41

De acordo com a psicogênese da aquisição da escrita, adotando o modelo piagetiano que apresenta os estágios de pensamento percorridos pela criança até atingir a compreensão do sistema de escrita alfabético, correlacione as fases de desenvolvimento às suas respectivas características e assinale a opção correta.

FASES

- I- pré-silábica
- II- silábica
- III- silábico-alfabética
- IV- alfabética

CARACTERÍSTICAS

- () a criança passa a problematizar a relação entre as representações fonológicas e ortográficas da língua.
- () a criança entende que os elementos devem ser escritos em linha (linearidade) e que deve haver alguma forma de segmentação entre eles (descontinuidade).
- () em geral, a criança busca atribuir um caráter de regularidade às correspondências letra-som.
- () a criança passa a estabelecer correspondências psicométricas de maneira assistemática e convencional.
- () a quantidade de letras varia de acordo com o componente sonoro das palavras, e a criança representa cada sílaba da palavra por uma letra.

- (A) (I) (II) (III) (IV) (-)
- (B) (III) (I) (IV) (-) (II)
- (C) (IV) (III) (-) (II) (I)
- (D) (II) (-) (I) (III) (IV)
- (E) (-) (IV) (II) (I) (III)

QUESTÃO 42

Quanto ao tratamento dos distúrbios da deglutição, em pacientes portadores de Paralisia Cerebral, assinale a opção correta.

- (A) O padrão variado e não específico de mobilidade e reações orais facilita a padronização de técnicas de reabilitação.
- (B) Em geral, utilizam-se técnicas de estimulação da musculatura oral, por meio de manobras diretas ou indiretas.
- (C) Nos casos em que o quadro neurológico é muito grave, para que se tente uma abordagem fonoaudiológica efetiva, pode-se lançar mão da alimentação exclusiva por via oral.
- (D) O trabalho corporal global não é um aspecto relevante na reabilitação da disfagia nesses pacientes.
- (E) As manobras diretas consistem em mudanças na textura, temperatura e volume do alimento.

QUESTÃO 43

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, com relação ao protocolo para solicitação de avaliação fonoaudiológica em UTI Neonatal e assinale a opção correta. Para que se dê início à transição da alimentação para via oral, os seguintes critérios devem ser observados:

- () Presença de suporte de ventilação com pressão positiva.
- () Estabilidade clínica determinada pelo neonatologista.
- () Manutenção estável da saturação de oxigênio e frequência cardíaca.
- () Não aceitação da dieta enteral.
- () Idade corrigida < ou = 32 semanas para o início da via oral.

- (A) (V) (F) (V) (F) (F)
- (B) (F) (V) (V) (F) (F)
- (C) (F) (V) (F) (V) (V)
- (D) (F) (F) (V) (V) (F)
- (E) (V) (V) (F) (F) (V)

QUESTÃO 44

Com relação à dislexia do desenvolvimento, é correto afirmar que

- (A) é uma expressão genérica que se refere a um grupo heterogêneo de alterações manifestadas por dificuldades significativas na aquisição da leitura, escrita e habilidades matemáticas.
- (B) não depende dos avanços realizados pela criança durante o processo de alfabetização, pois existe uma importante influência entre consciência fonológica e aquisição da escrita.
- (C) é uma desordem definida como uma dificuldade de realizar a leitura, mesmo com a inteligência dentro dos padrões de normalidade, motivação e educação adequadas.
- (D) é uma parte integrante da habilidade metalinguística e está relacionada à habilidade de manipular os seguimentos linguísticos e a capacidade de operar com rimas, aliteração, sílabas e fonemas.
- (E) não depende da existência de perturbação de aptidões cognitivas fundamentais, frequentemente de origem constitucional.

QUESTÃO 45

Correlacione os indícios de comprometimento neurológico na avaliação clínica fonoaudiológica ao seu provável significado clínico e, a seguir, assinale a opção correta.

INDÍCIOS

- I- Ausência de tosse reflexa
- II- Voz muito aguda
- III- Voz muito grave
- IV- Voz com sopro
- V- Voz tensa-estrangulada

SIGNIFICADO

- () Incapacidade de alongar pregas vocais, geralmente por paralisia de laringes superiores.
 - () Perda do mecanismo esfíntérico da laringe, comprometimento laríngeo bilateral.
 - () Predomínio da ação esfíntérica da laringe, geralmente por transtorno do neurônio motor superior
 - () Fenda glótica por falta de coaptação adequada, paresia ou paralisia laríngea.
 - () Incapacidade de encurtar as pregas vocais, geralmente compensatória à paralisia do recorrente.
- (A) (II) (I) (V) (III) (IV)
(B) (III) (I) (V) (IV) (II)
(C) (III) (IV) (I) (V) (II)
(D) (V) (II) (IV) (III) (I)
(E) (II) (IV) (I) (V) (III)

QUESTÃO 46

Com relação à Síndrome de Guillain-Barré, é correto afirmar que

- (A) a paralisia bulbar está presente em raros casos.
- (B) é um processo inflamatório que acomete o corpo celular do neurônio motor superior.
- (C) a diplegia facial é um quadro bastante frequente.
- (D) apresenta como característica fraqueza muscular assimétrica, em direção próximo-distal.
- (E) apresenta prognóstico desfavorável, com reversibilidade do quadro em raríssimos casos.

QUESTÃO 47

Sobre as abordagens fonoterápicas nas disartrofonias, assinale a opção correta.

- (A) A estimulação direta, por meio de toques, ou indireta, por meio de sopro, sucção e assobio, costumam ser eficientes para os casos de hipernasalidade.
- (B) São contraindicadas as técnicas de empuxo ou *vocal fry* para pacientes com disfunções velofaríngeas associadas a quadros hipercinéticos ou flácidos.
- (C) Pode haver uma melhora evidente da qualidade vocal tensa-estrangulada quando o indivíduo eleva a frequência, leva a cabeça para trás e inicia as produções com um volume pulmonar alto.
- (D) O tratamento das disartrofonias com hipoadução inclui técnicas de relaxamento específico da musculatura cervical e dos músculos intrínsecos da laringe, evitando os possíveis golpes de glote.
- (E) O principal objetivo da fonoterapia em pacientes disártricos é a prevenção de pneumonias broncoaspirativas.

QUESTÃO 48

Leia o texto a seguir.

De acordo com a classificação de Behlau e Pontes (1995), há um tipo de voz em que a configuração laríngea pode ser a de um triângulo completo anteroposterior ou somente um triângulo posterior, ou até mesmo ser observada fenda paralela. A aparente passividade dessa configuração representa, na verdade, um ato fonatório hipercinético que está associado à constrição supraglótica. É correto afirmar que o texto acima se refere à voz

- (A) pastosa.
- (B) áspera.
- (C) bitonal.
- (D) sussurrada.
- (E) trêmula.

QUESTÃO 49

Com relação à avaliação fonoaudiológica das disfagias neurogênicas, assinale a opção correta.

- (A) A avaliação clínica fonoaudiológica inicia-se pelo exame das estruturas orofaríngeas.
- (B) Aspectos de fala também devem ser avaliados, pois há uma relação entre o grau de disartria e de disfagia.
- (C) Na avaliação da voz, a qualidade vocal molhada não é um sinal sugestivo de aspiração traqueal.
- (D) A avaliação clínica nos fornece todas as informações necessárias ao diagnóstico, dispensando sempre a realização de exames complementares.
- (E) Quando a capacidade para deglutição de saliva está preservada, realiza-se apenas a estimulação gustativa, não se ofertando alimentos.

QUESTÃO 50

Segundo Brasoletto (2009), com relação à voz do idoso, é correto afirmar que

- (A) a presbifonia é uma desordem vocal estabelecida por uma patologia de base.
- (B) o edema e a atrofia de pregas vocais são as duas categorias de alterações laríngeas mais frequentes.
- (C) a promoção de saúde vocal na terceira idade é restrita, uma vez que não há como minimizar os efeitos da degradação natural da voz.
- (D) é bastante frequente a ocorrência de alterações de mucosa das pregas vocais nos quadros de presbilaringe.
- (E) pode ocorrer diminuição da frequência fundamental da voz nos homens e o aumento nas mulheres.


RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	



INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
- 4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo 20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
- 5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
- 10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desprezar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
 - e) cometer ato grave de indisciplina; e
 - f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assine o seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:



Nome: ROBERTO SILVA

Assinatura: Roberto Silva

ERRADO:  **CORRETO:** 

INSCRIÇÃO

7	2	7
---	---	---

DV

2	4
---	---

02	03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48	49
50							

02	03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48	49
50							

T
A
R
J
A

- 13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias (BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEEnM na Internet. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50