

MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

*(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO
DE APOIO À SAÚDE DO CORPO DE SAÚDE DA
MARINHA / CP-CSM-S /2024)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

Segundo Eliopoulos (2019), como é denominado o estágio das lesões por pressão que se caracteriza por perda de tecido na espessura total, com a base coberta por laceração e/ou escara, que só pode ser determinado após a remoção de laceração ou escara, de modo a expor a base e a real profundidade da ferida?

- (A) Lesão tecidual profunda.
- (B) Lesão em tecido profundo por pressão.
- (C) Estágio 3.
- (D) Estágio 4.
- (E) Não passível de estadiamento.

QUESTÃO 2

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais (2022), qual é a manifestação clínica da sífilis congênita precoce caracterizada por desmineralização e destruição óssea da parte superior medial tibial?

- (A) Sinal de Parrot.
- (B) Sinal de Wimberger.
- (C) Sinal de Wegner.
- (D) Sinal de Flapping.
- (E) Sinal de Clifton.

QUESTÃO 3

De acordo com o Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: limpeza e desinfecção de superfície (2012), assinale a opção correta sobre sobrevivência de micro-organismos em matéria orgânica ressecada na temperatura ambiente.

- (A) Micro-organismo HIV: tempo de sobrevivência até 5 dias.
- (B) Micro-organismo *Acinetobacter baumannii*: tempo de sobrevivência até 4 dias.
- (C) Micro-organismo Rotavírus: tempo de sobrevivência até 7 dias.
- (D) Micro-organismo *Clostridium difficile*: tempo de sobrevivência até 6 meses.
- (E) Micro-organismo vírus da Hepatite B: tempo de sobrevivência até 4 dias.

QUESTÃO 4

De acordo com Wong (2014), o tumor de Wilms é o tumor renal e intra-abdominal maligno mais comum na infância. O estadiamento do tumor não hematogênico residual que se mostra confinado ao abdome é o estágio:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

QUESTÃO 5

Segundo Brunner e Suddarth (2016), assinale a opção que apresenta corretamente os sinais e os sintomas da cirrose compensada.

- (A) Esplenomegalia, edema maleolar e dor abdominal.
- (B) Perda de peso, equimoses espontâneas e fraqueza.
- (C) Ascite, debilidade muscular e baqueteamento digital.
- (D) Hipotensão, febre baixa e contínua e icterícia.
- (E) Equimoses espontâneas, ascite e fraqueza.

QUESTÃO 6

Segundo "Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde" (2017), qual o tipo de cobertura que mantém o meio úmido e aquecido, estimula neoangiogênese e autólise e é impermeável a micro-organismos?

- (A) Papaína.
- (B) Colagenase.
- (C) Gaze não aderente.
- (D) Hidropolímeros com prata.
- (E) Hidrocoloide.

QUESTÃO 7

A ética no processo de negociação dependerá de valores pessoais e profissionais, entre outros aspectos importantes que devem ser discutidos de modo mais aprofundado pelos participantes do processo. Segundo Kurgant (2023), alguns estilos são pontuados como principais, embora tenham nos interstícios uma diversidade de nuances. Correlacione os estilos de negociação as suas respectivas descrições assinale a opção correta.

ESTILOS

- I- Restritivo/duro
- II- Ardiloso
- III- Amigável
- IV- Confrontador

DESCRIÇÕES

- () Nesse estilo a astúcia é privilegiada, predominando o impulso para desconsideração.
- () Voltado para o controle e para a confiança entre os negociadores que, supostamente, buscam a equidade e o melhor acordo e se apoiam no mérito e no compromisso mútuo a ser aprovado.
- () Prioriza flexibilidade e cordialidade, independentemente de alguma conquista importante.
- () Baseado em estratégias de coerção, medo e ameaça.

- (A) (II) (I) (III) (IV)
- (B) (II) (IV) (III) (I)
- (C) (II) (I) (IV) (III)
- (D) (IV) (II) (III) (I)
- (E) (IV) (I) (III) (II)

QUESTÃO 8

De acordo com a RDC nº 15, de 15 de março de 2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências, coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, assinalando a seguir, a opção que apresenta a sequência correta.

- () Este Regulamento se aplica aos Centros de Material e Esterilização (CME) dos serviços de saúde públicos e privados, civis e militares, e às empresas processadoras envolvidas no processamento de produtos para saúde.
- () Produto para saúde crítico de conformação complexa são produtos para saúde que possuam lúmen inferior a sete milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas.
- () O CME Classe II é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, passíveis de processamento.
- () Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza.
- () O serviço de saúde não responde por eventuais danos ao paciente causados pela empresa processadora contratada, no que se refere às atividades relacionadas ao processamento dos produtos para saúde.

- (A) (F) (F) (F) (F) (V)
- (B) (F) (F) (V) (F) (V)
- (C) (F) (V) (F) (V) (F)
- (D) (V) (V) (F) (V) (F)
- (E) (V) (F) (F) (V) (F)

QUESTÃO 9

Um exame físico detalhado do tórax e pulmões requer uma revisão das funções ventilatórias e respiratórias dos pulmões. Reconhecer os sons criados pelo fluxo aéreo permite que se detectem sons causados por uma obstrução. Segundo Potter e Perry (Fundamentos de Enfermagem, 2013), assinale a opção que apresenta corretamente a descrição do som respiratório vesicular .

- (A) Sons suaves, leves e de baixo tom. A fase inspiratória é 3 vezes mais longa do que a fase expiratória.
- (B) Sons altos e de tom elevado, de qualidade oca. A expiração é mais longa do que a inspiração.
- (C) Sons de sopro que possuem tom e intensidade médios. A fase inspiratória é igual à fase expiratória.
- (D) Sons suaves, leves e de baixo tom. A fase inspiratória é mais longa do que a fase expiratória.
- (E) Sons respiratórios normais diferem em característica, dependendo da área que está sendo auscultada.

QUESTÃO 10

De acordo com a RDC nº 222 de 28 de março de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento de resíduos de saúde, é correto afirmar que:

- (A) o abrigo temporário é o ambiente no qual ocorre o armazenamento externo dos coletores de resíduos.
- (B) a reutilização é o processo de aproveitamento dos resíduos líquidos sem sua transformação biológica, física ou físico-química.
- (C) os resíduos de serviços de saúde (RSS) de fácil putrefação devem ser submetidos a método de conservação em caso de armazenamento por período superior a doze horas.
- (D) no armazenamento temporário e externo de resíduos é obrigatório manter os sacos acondicionados dentro de coletores com a tampa fechada.
- (E) os coletores com mais de 200 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo.

QUESTÃO 11

Segundo a Norma Regulamentadora nº32 (2005), os produtos químicos, inclusive intermediários, e resíduos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador, devem ter uma ficha descritiva contendo, no mínimo, as seguintes informações, EXCETO:

- (A) as características e as formas de utilização do produto.
- (B) os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, considerando as formas de utilização.
- (C) as medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da saúde dos trabalhadores.
- (D) os relatórios sobre exposições e acidentes.
- (E) as condições e local de estocagem.

QUESTÃO 12

O problema clínico do paciente e a condição geral determinam a localização da colostomia. Segundo Potter e Perry (Fundamentos de Enfermagem, 2013), existem três tipos de construções de colostomias. Nesse contexto, assinale a opção que apresenta corretamente os três tipos de construções de colostomia.

- (A) Colostomia Tipo Anastomose; Colostomia de Kock e Colostomia em Barreira Dupla.
- (B) Colostomia Tipo Anastomose; Colostomia Terminal e Colostomia Ileocecal.
- (C) Colostomia em Alça; Colostomia de Kock e Colostomia em Barreira Dupla.
- (D) Colostomia em Alça; Colostomia Terminal e Colostomia Ileocecal.
- (E) Colostomia em Alça; Colostomia Terminal e Colostomia em Barreira Dupla.

QUESTÃO 13

Segundo o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (2014), assinale a opção que apresenta corretamente uma competência da Esfera Federal sobre o Programa Nacional de Imunização (PNI).

- (A) O descarte e a destinação final de frascos, seringas e agulhas utilizados, conforme as normas técnicas vigentes.
- (B) O provimento de seringas e agulhas, itens que também são considerados insumos estratégicos.
- (C) A coordenação e a execução das ações de vacinação integrantes do PNI, incluindo a vacinação de rotina e as estratégias especiais.
- (D) O provimento dos imunobiológicos definidos pelo PNI, considerados insumos estratégicos.
- (E) A notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação.

QUESTÃO 14

Segundo Brunner e Suddarth (2016), a resposta simpático-suprarrenal-medular ao estresse ou reação luta ou fuga, com o mecanismo de aumento do débito cardíaco por causa da elevação da contratilidade miocárdica, da frequência cardíaca e aumento do retorno venoso (vasoconstrição periférica), tem como objetivo:

- (A) a maior perfusão para os órgãos vitais.
- (B) a provisão de oxigênio para energia.
- (C) o aumento da disponibilidade de energia.
- (D) a prevenção de hemorragia na eventualidade de um traumatismo.
- (E) a disposição para atividade, diminuição da fadiga.

QUESTÃO 15

Segundo o Guia de Vigilância em Saúde (2016), a vacina influenza é capaz de promover imunidade efetiva e segura durante o período de circulação sazonal do vírus. Assinale a opção que apresenta corretamente uma contraindicação para a vacinação da influenza trivalente.

- (A) Puérperas até 45 dias após o parto.
- (B) População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.
- (C) Gestantes.
- (D) Menores de 6 meses de idade.
- (E) Toda a população indígena, a partir dos 6 meses de idade.

QUESTÃO 16

De acordo com o Documento de Referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente (2014), "a redução do tempo de espera e de atrasos potencialmente danosos tanto para quem recebe como para quem presta o cuidado" refere-se a qual atributo da qualidade?

- (A) Segurança.
- (B) Efetividade .
- (C) Eficiência.
- (D) Oportunidade.
- (E) Equidade .

QUESTÃO 17

Segundo Brunner e Suddarth (2016) , sobre as vantagens da prostatectomia radical laparoscópica robótica assistida, é correto afirmar que há:

- (A) perda sanguínea diminuída para 150 ml.
- (B) retorno mais demorado as atividades normais.
- (C) maior incidência pós-operatória de incontinência urinária.
- (D) uma menor ampliação do campo operatório.
- (E) possibilidade de delinear a proximidade do comprometimento.

QUESTÃO 18

De acordo com o Caderno de Atenção Básica em Saúde Mental (2013), como é denominado o efeito indesejado mais comum com os antipsicóticos de baixa potência (clorpromazina, tioridazina e levomepromazina)?

- (A) Redução da libido.
- (B) Hipotensão postural.
- (C) Galactorreia.
- (D) Anorgasmia.
- (E) Retenção urinária.

QUESTÃO 19

De acordo com o Manual de Gestação de Alto Risco (2022), são considerados fatores de risco para o aborto espontâneo de repetição (AER), EXCETO:

- (A) alto índice de folato.
- (B) cafeína.
- (C) consumo de álcool e drogas.
- (D) extremos de peso.
- (E) tabagismo.

QUESTÃO 20

De acordo com Eliopoulos (2019), indivíduos com prejuízo cognitivo podem ter confusão noturna , conhecida como a síndrome do pôr-do-sol porque costuma ocorrer ao anoitecer. De que maneira os enfermeiros podem prevenir e controlar a síndrome do pôr-do-sol ?

- (A) Evitar o uso de objetos familiares no quarto do paciente.
- (B) Usar do toque para proporcionar contato humano e acalmar o paciente.
- (C) Proibir atividade física pela tarde para ajudar a pessoa a gastar energia.
- (D) Ajustar a iluminação ambiental para que o quarto escureça ao entardecer.
- (E) Evitar o contato frequente com o paciente para oferecer tranquilidade e orientação.

QUESTÃO 21

Segundo Potter e Perry (Procedimentos e Intervenções, 2013), assinale a opção que apresenta corretamente as causas comuns de dor abdominal, com sinais físicos e sintomas da condição de constipação.

- (A) Desconforto abdominal generalizado acompanhado de anorexia, náuseas, vômitos, diarreia e cólicas abdominais.
- (B) Distensão abdominal generalizada grave, náuseas e vômitos. Diminuição ou sons intestinais ausentes.
- (C) Dor epigástrica estacionária severa perto do umbigo irradiada para as costas. Associada a rigidez abdominal e vômitos. A dor não é aliviada por vômito e piora em decúbito dorsal.
- (D) Desconforto generalizado acompanhado por distensão e palpação de uma massa dura no quadrante inferior esquerdo. Náuseas e vômitos podem começar depois de vários dias.
- (E) Dor epigástrica aborrecida, localizada na linha média. Saciedade precoce, geralmente não aliviada pela ingestão de alimentos ou antiácidos.

QUESTÃO 22

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Prevenção da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites Virais (2022), são vacinas recomendadas em gestante vivendo com HIV, EXCETO:

- (A) pneumococo.
- (B) meningocócica conjugada.
- (C) dT.
- (D) HPV.
- (E) influenza.

QUESTÃO 23

Segundo Kurgant (2023), no que tange ao gerenciamento de recursos materiais, o estoque de segurança (ES), ou estoque mínimo, é a quantidade de cada item que deve ser mantida como reserva para garantir a continuidade do atendimento caso haja elevação brusca no consumo ou atraso no suprimento. A maneira mais simples e empírica de se calcular o ES é :

- (A) diminuir à cota mensal 15 a 20% do consumo médio mensal (CMM), somando ao consumo diário durante o tempo de reposição(CTR).
- (B) diminuir à cota mensal 10 a 20% do consumo médio mensal (CMM), somando ao consumo diário durante o tempo de reposição (CTR).
- (C) acrescentar à cota mensal 20 a 30% do consumo médio mensal (CMM), somando ao consumo diário durante o tempo de reposição(CTR).
- (D) acrescentar à cota mensal 15 a 20% do consumo médio mensal(CMM), somando ao consumo diário durante o tempo de reposição(CTR).
- (E) acrescentar à cota mensal 10 a 20% do consumo médio mensal (CMM), somando ao consumo diário durante o tempo de reposição(CTR).

QUESTÃO 24

Segundo Brunner e Suddarth(2016), em relação à dissecação de linfonodos axilares, é correto afirmar que:

- (A) não há necessidade de dreno cirúrgico.
- (B) o tempo de permanência é mais curto no centro cirúrgico.
- (C) há provável diminuição da amplitude de movimento no pós-operatório.
- (D) há necessidade de anestesia local com sedação intravenosa moderada.
- (E) há incidência de linfedema entre 0 a 8%.

QUESTÃO 25

Segundo Eliopoulos (2019), além da doença de Alzheimer, uma variedade de outras patologias pode causar demência. Um distúrbio cerebral bastante raro causador de demência de surgimento e progressão rápidos, caracterizando-se por prejuízo neurológico grave, que acompanha a demência denomina-se:

- (A) demência vascular.
- (B) demência frontotemporal.
- (C) demência dos corpos de Lewy.
- (D) doença encefalopática de Wernicke.
- (E) doença de Creutzfeldt-Jakob.

QUESTÃO 26

Segundo Brunner e Suddarth (2016), a laceração transmural do esôfago inferior que causa o esvaziamento do conteúdo gástrico para o mediastino é denominada síndrome de :

- (A) zenker.
- (B) treitz.
- (C) boerhaave.
- (D) barret.
- (E) frey.

QUESTÃO 27

Segundo a Nota Técnica nº01/2018 GVIMS/GGTES/ANVISA: Orientações Gerais para Higiene das Mãos em Serviços de Saúde, ao selecionar a preparação alcoólica para a higienização das mãos (HM), é importante, além da averiguação do devido registro ou notificação na ANVISA, utilizar critérios precisos para o alcance de um produto de qualidade que proporcione uma melhor adesão a prática apropriada e sustentada da higienização das mãos, prevenindo as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Sobre requisitos importantes para a aquisição dessas preparações, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A eficácia antimicrobiana da preparação alcoólica das mãos depende do tipo de álcool utilizado, da concentração, da técnica e do tempo de contato com a pele das mãos.
- (B) A preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos deve apresentar boa tolerância cutânea, uma vez que podem ocorrer dermatites de contato.
- (C) Características como odor, consistência e cor podem afetar a aceitação da preparação alcoólica para as mãos pelos usuários nos serviços de saúde.
- (D) A preparação alcoólica para as mãos não deve apresentar desnaturante em sua fórmula a fim de evitar ingestão acidental por crianças ou risco de mau uso por pacientes.
- (E) O tempo requerido para a secagem das preparações alcoólicas nas mãos não deve ser muito além do tempo necessário de aplicação da preparação alcoólica para as mãos (20 a 30 segundos).

QUESTÃO 28

De acordo com Wong (2014), o tipo de pé torto congênito de ocorrência mais frequente é a deformidade composta Talipes:

- (A) equinovarus.
- (B) valgus.
- (C) varus.
- (D) equinus.
- (E) calcaneus.

QUESTÃO 29

Segundo Brunner e Suddarth (2016), o modelo Transteórico de Mudança, também conhecido como modelo dos estágios de mudança, é uma estrutura que incide sobre a motivação de uma pessoa de tomar decisões que promovam mudança no comportamento de saúde. Assim, correlacione o estágio à sua descrição, assinalando a opção correta.

ESTÁGIO

- I- Pré-contemplativo
- II- Contemplativo
- III- Tomada de decisão
- IV- Ação
- V- Manutenção
- VI- Conclusão

DESCRIÇÃO

- () A pessoa apenas pensa em mudar em um futuro próximo.
- () A pessoa não está pensando em fazer uma mudança.
- () A pessoa constrói um plano para mudar seu comportamento.
- () A pessoa se esforça para prevenir recaídas e para manter os ganhos obtidos com as ações tomadas.
- () A pessoa tem a capacidade de resistir às recaídas de retorno ao(s) comportamento(s) não saudável(eis).
- () A pessoa toma medidas para operacionalizar o plano de ação.

- (A) (I) (II) (III) (V) (VI) (IV)
- (B) (II) (I) (III) (V) (VI) (IV)
- (C) (I) (III) (II) (V) (VI) (IV)
- (D) (II) (VI) (IV) (I) (III) (V)
- (E) (I) (II) (IV) (VI) (III) (V)

QUESTÃO 30

Segundo Kurgant (2023), a determinação de um Índice de Segurança Técnica (IST) consiste em:

- (A) uma diminuição no quantitativo de pessoal de enfermagem por categoria profissional, para a cobertura das ausências ao serviço. Como ausências previstas os dias relativos às folgas e às férias, e como ausências não previstas os dias referentes às faltas e às licenças.
- (B) uma diminuição no quantitativo da equipe técnica de enfermagem, para a cobertura das ausências ao serviço. Como ausências previstas os dias relativos às folgas e às férias, e como ausências não previstas os dias referentes às faltas e às licenças.
- (C) um acréscimo no quantitativo de pessoal de enfermagem por categoria profissional, para a cobertura das ausências ao serviço. Como ausências previstas os dias relativos às folgas e às férias, e como ausências não previstas os dias referentes às faltas e às licenças.
- (D) um acréscimo no quantitativo de pessoal de enfermagem na categoria de enfermeiro, para a cobertura das ausências ao serviço. Como ausências previstas os dias relativos às folgas e às férias, e como ausências não previstas os dias referentes às faltas e às licenças.
- (E) uma diminuição no quantitativo de pessoal de enfermagem por categoria profissional, para a cobertura das ausências ao serviço somente previstas os dias relativos às folgas e às férias.

QUESTÃO 31

Conforme Fukuda (2017), a maconha é a substância ilícita mais utilizada em todo o mundo. Com relação aos seus principais efeitos, assinale a opção correta.

- (A) Sensação de leveza e relaxamento.
- (B) Medo infundado e ideação paranoide.
- (C) Estado de vigília e autoconfiança elevada.
- (D) Pressão da fala e diminuição da fadiga.
- (E) Sedação e humor normal.

QUESTÃO 32

De acordo com o Manual de Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama (2013), qual é a recomendação de conduta no resultado do exame mamográfico categoria BI-RADS 4?

- (A) Rotina de rastreamento.
- (B) Controle radiológico.
- (C) Avaliação adicional com incidências.
- (D) Correlação com outros métodos de imagem.
- (E) Avaliação por exame de cito ou histopatológico.

QUESTÃO 33

Segundo a Norma Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº04/2020, atualizada em 31/03/2023 e revisada em 02/05/2023, existem evidências de que o SARS-CoV-2 pode ser detectado antes do início dos sintomas da covid-19 e que, portanto, pode ser transmitido no período pré-sintomático. Assim, é possível que pessoas infectadas com o SARS-CoV-2 possam transmitir o vírus antes que sintomas significativos se desenvolvam. Esse período corresponde a:

- (A) 1 a 4 dias.
- (B) 1 a 5 dias.
- (C) 1 a 6 dias.
- (D) 1 a 7 dias.
- (E) 1 a 10 dias.

QUESTÃO 34

Segundo Brunner e Suddarth (2016), em relação aos critérios de elegibilidade para a administração de ativador do plasminogênio tecidual, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Ausência de convulsão no início do acidente vascular encefálico (AVE).
- (B) Ausência de sangramento gastrointestinal ou urinário nos últimos 21 dias.
- (C) Não recebeu heparina nas últimas 48h com tempo de tromboplastina parcial prolongado.
- (D) Não apresentou acidente vascular encefálico (AVE), traumatismo cranioencefálico grave ou cirurgia intracraniana nos últimos 3 meses.
- (E) Não foi submetido a nenhum procedimento cirúrgico de grande porte nos últimos 7 dias.

QUESTÃO 35

Segundo Brunner e Suddarth (2016), sobre a doença de Crohn, é correto afirmar que:

- (A) embora suas alterações histopatológicas características possam ocorrer em qualquer local do sistema digestório, ocorre mais comumente no íleo proximal.
- (B) há sensibilidade abdominal e espasmos, as dores do tipo cólica ocorrem antes das refeições.
- (C) ocorre febre e leucocitose, os sintomas agudos incluem diarreia, dor abdominal e esteatorreia.
- (D) úlceras começam a surgir na mucosa inflamada, esses agrupamentos de úlceras tendem a assumir um aspecto clássico de "pedra de calçamento".
- (E) o início dos sintomas normalmente é insidioso, com dor abdominal no quadrante inferior esquerdo proeminente.

QUESTÃO 36

Segundo Brunner e Suddarth (2016), sobre os princípios éticos comuns que podem ser usados para validar reivindicações morais na prática clínica, é correto afirmar que :

- (A) a justiça distributiva é um princípio ético geralmente aplicado a situações clínicas. Este princípio é mantido quando os benefícios e encargos são distribuídos equitativamente e de modo justo considerando idade, gênero e condição socioeconômica.
- (B) o duplo efeito é um princípio que justifica moralmente algumas ações que têm tanto bons quanto maus efeitos. Um critério que não precisa ser cumprido é a ação moralmente boa ou neutra.
- (C) o princípio da autonomia implica falta do direito do cliente de não receber informações de modo que tenha capacidade de fazer uma escolha livre, sem constrangimentos externos.
- (D) a não maleficência é o dever de não infligir dano. A única ocasião em que é considerado moralmente permitido exercer poder sobre uma pessoa competente contra a sua vontade é quando, ao fazê-lo, danos a terceiros são evitados.
- (E) o duplo efeito é um princípio que justifica moralmente algumas ações que têm tanto bons quanto maus efeitos. Um critério que não precisa ser cumprido é o critério do efeito bom não ser alcançado por meio de um efeito mau.

QUESTÃO 37

Segundo Brunner e Suddarth (2016), ondas de calor, menstruações irregulares, risco aumentado de câncer de endométrio e risco aumentado para eventos tromboembólicos, são efeitos colaterais de qual medicamento utilizado para o tratamento do câncer de mama?

- (A) Anastrozol.
- (B) Tamoxifeno.
- (C) Exemestano.
- (D) Letrozol.
- (E) Trastuzumabe.

QUESTÃO 38

Segundo Potter e Perry (Fundamentos de Enfermagem, 2013), são critérios de avaliação de insuficiência venosa e arterial: cor, temperatura, pulso, edema e alterações da pele. Assinale a opção que apresenta corretamente os sinais de insuficiência arterial.

- (A) Cor pálido, piora com a elevação da extremidade; vermelho-escuro quando a extremidade é abaixada, temperatura normal, pulso diminuído ou ausente, edema ausente ou fraco e pele fina, brilhante, diminuição no crescimento do pelo e unhas espessadas.
- (B) Cor pálido, piora com a elevação da extremidade; vermelho-escuro quando a extremidade é abaixada, temperatura fria, pulso diminuído ou ausente, edema ausente ou fraco e pele fina, brilhante, diminuição no crescimento do pelo e unhas espessadas.
- (C) Cor normal ou cianótica, temperatura fria (fluxo sanguíneo bloqueado na extremidade), pulso diminuído ou ausente, edema ausente ou fraco e pele com pigmentação marrom ao redor dos tornozelos.
- (D) Cor normal ou cianótica, temperatura normal e fria (fluxo sanguíneo bloqueado na extremidade), pulso normal, edema geralmente marcado e pele com pigmentação marrom ao redor dos tornozelos.
- (E) Cor pálido, piora com a elevação da extremidade; vermelho-escuro quando a extremidade é abaixada, temperatura fria, pulso normal, edema geralmente marcado, pele fina, brilhante, diminuição no crescimento do pelo e unhas espessadas.

QUESTÃO 39

Segundo Brunner e Suddarth (2016), em relação à assistência de enfermagem ao paciente com intubação gastrointestinal, é correto afirmar que:

- (A) um tubo de alimentação inserido por via nasal, deve permanecer no local durante não mais do que 6 semanas antes da sua substituição por um novo tubo.
- (B) a posição de Trendelenburg reversa pode ser considerada quando não for possível ou recomendável elevar a cabeceira do leito do cliente.
- (C) as extremidades com peso de tungstênio facilitam a migração da extremidade do tubo do estômago para o intestino.
- (D) o tubo de Levin é conectado à sucção intermitente alta para evitar a erosão ou ruptura do revestimento gástrico.
- (E) os agentes pró-cinéticos não podem ser administrados para facilitar a movimentação da sonda por peristaltismo para dentro do duodeno.

QUESTÃO 40

Segundo Potter e Perry (Fundamentos de Enfermagem, 2013), cada via de injeção difere em relação ao tipo de tecido em que o medicamento será aplicado. As características dos tecidos influenciam na velocidade de absorção do medicamento e, dessa maneira do início de sua ação. Sobre as injeções intramusculares, é correto afirmar que a via intramuscular fornece uma absorção mais:

- (A) rápida do medicamento do que a subcutânea devido à maior vascularização do músculo; o peso e a quantidade de tecido adiposo não influencia na seleção do tamanho da agulha; o músculo é mais sensível a medicamentos irritantes e viscosos.
- (B) lenta do medicamento do que a subcutânea devido à menor vascularização do músculo; o peso e a quantidade de tecido adiposo podem influenciar na seleção do tamanho da agulha; o músculo é menos sensível a medicamentos irritantes e viscosos.
- (C) rápida do medicamento do que a subcutânea, devido à maior vascularização do músculo; o peso e a quantidade de tecido adiposo podem influenciar na seleção do tamanho da agulha; o músculo é menos sensível a medicamentos irritantes e viscosos.
- (D) rápida do medicamento do que a endovenosa devido à maior vascularização do músculo; o peso e a quantidade de tecido adiposo não influencia na seleção do tamanho da agulha; o músculo é menos sensível a medicamentos irritantes e viscosos.
- (E) rápida do medicamento do que a intradérmica devido à maior vascularização do músculo; o peso e a quantidade de tecido adiposo podem influenciar na seleção do tamanho da agulha; o músculo é mais sensível a medicamentos irritantes e viscosos.

QUESTÃO 41

Segundo Brunner e Suddarth (2016), a anormalidade da boca caracterizada por pápulas brancas na intersecção de uma rede de lesões entrelaçadas, habitualmente ulceradas e dolorosas, denomina-se:

- (A) líquen plano.
- (B) leucoplaquia.
- (C) queilite actínica.
- (D) candidíase.
- (E) estomatite.

QUESTÃO 42

Segundo Eliopoulos (2019), pessoas idosas apresentam maior risco de toxicidade por anticonvulsivantes, com necessidade de uso criterioso. Sobre as diretrizes de enfermagem para idosos que usam anticonvulsivantes, assinale a opção correta:

- (A) aconselhar os pacientes a não ingerir produtos fitoterápicos até que os analisem com o médico.
- (B) garantir que sejam feitas culturas diante de infecção presente ou suspeitada.
- (C) observar o aparecimento de sinais de sangramento.
- (D) manter a vitamina K sempre disponível como antídoto.
- (E) ficar atento ao fato de que esses fármacos podem piorar a doença hepática ou renal existente.

QUESTÃO 43

Segundo Eliopoulos (2019,) correlacione os problemas gastrointestinais com as suas respectivas características, assinalando a seguir, a opção correta.

PROBLEMA GASTROINTESTINAL

- I- Hérnia de hiato
- II- Câncer colorretal
- III- Úlcera péptica
- IV- Doença diverticular
- V- Câncer de esôfago

CARACTERÍSTICAS

- () Tende a apresentar sintomas mais agudos nos indivíduos mais velhos, como dor, sangramento, obstrução e perfuração.
 - () Quando os sintomas estão presentes, podem incluir sangramento leve, mudança nos hábitos intestinais (constipação, diarreia ou ambas) e sensibilidade à palpação do quadrante inferior esquerdo.
 - () Disfagia, perda de peso, salivação excessiva, sede, soluço, anemia e sangramento crônico são sintomas da doença.
 - () Alguns sintomas incluem sangramento do reto e fezes com sangue, alteração no padrão intestinal, sensação de esvaziamento incompleto do intestino, anorexia, náusea, desconforto abdominal e dor sobre a região afetada.
 - () Azia, disfagia, eructação, vômito e regurgitação são sintomas comuns. São sintomas especialmente problemáticos, quando o paciente está recumbente (posição dorsal). Dor por vezes confundida com ataque cardíaco.
- (A) (I) (V) (III) (II) (IV)
(B) (V) (III) (I) (IV) (II)
(C) (III) (IV) (V) (II) (I)
(D) (IV) (III) (V) (II) (I)
(E) (III) (IV) (I) (V) (II)

QUESTÃO 44

De acordo com Wong (2014), qual é o segundo sinal mais comumente observado no retinoblastoma?

- (A) Reflexo branco no olho.
- (B) Anisometropia.
- (C) Glaucoma.
- (D) Estrabismo.
- (E) Olho vermelho.

QUESTÃO 45

De acordo com a American Heart Association (2020), coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo com relação à ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e assinale a seguir, a opção correta.

- () Na ressuscitação cardiopulmonar, a dose de intravenosa (IV)/ intraósseo (IO) de epinefrina é de 1 mg a cada 3 a 5 minutos.
 - () Comprima com força (pelo menos 5 cm), rápido (100 a 120/min) e aguarde o retorno total do tórax.
 - () Não é recomendado que leigos iniciem a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) para uma suposta parada cardiorrespiratória (PCR), pois o risco de dano ao paciente é alto se o paciente não estiver em parada cardiorrespiratória.
 - () A dose intravenosa (IV) / intraósseo (IO) de amiodarona é primeira dose Bolus de 150 mg e segunda dose de 300 mg.
 - () Na fase de estabilização inicial, o controle dos parâmetros respiratórios titule FiO₂ para SpO₂ de 92% a 98%, inicie em 15 ventilações/min, titule PaCO₂ de 35 a 45mmHg.
- (A) (F) (F) (V) (V) (F)
(B) (V) (V) (V) (F) (F)
(C) (V) (V) (F) (F) (F)
(D) (F) (V) (F) (F) (V)
(E) (V) (V) (F) (V) (F)

QUESTÃO 46

Segundo Brunner e Suddarth (2016), assinale a opção que apresenta corretamente o principal eletrólito intracelular que influencia a atividade do músculo esquelético e do cardíaco e da aldosterona e que também aumenta a excreção pelo rim.

- (A) Cálcio.
- (B) Sódio.
- (C) Magnésio.
- (D) Potássio.
- (E) Fósforo.

QUESTÃO 47

De acordo com a RDC nº 15, de 15 de março de 2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências, sobre o monitoramento do processo de esterilização, é correto afirmar que:

- (A) o monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada carga em pacote teste desafio sem integradores químicos, segundo rotina definida pelo próprio centro de material e esterilização(CME), ou pela empresa processadora.
- (B) a área de monitoramento do processamento de produtos para saúde não deve dispor de sistema para guarda dos registros dos monitoramentos.
- (C) o monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito diariamente, em pacote desafio disponível comercialmente ou construído pelo próprio centro de material e esterilização (CME) ou pela empresa processadora.
- (D) no monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde implantáveis não deve ser adicionado indicador biológico a cada carga.
- (E) o pacote desafio disponível comercialmente ou construído pelo próprio centro de material e esterilização (CME), deve ser posicionado no centro de menor desafio ao processo de esterilização definido durante os estudos do equipamento de esterilização.

QUESTÃO 48

Segundo Potter e Perry (Fundamentos de Enfermagem, 2013), quando se aplicam as principais habilidades de pensamento crítico à enfermagem, elas mostram a natureza complexa da tomada de decisão clínica. Correlacione as habilidades de pensamento crítico às suas respectivas aplicações práticas de enfermagem e assinale a opção correta.

HABILIDADES

- I- Interpretação
- II- Análise
- III- Inferência
- IV- Avaliação
- V- Auto regulação

APLICAÇÕES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM

- () Olhe para todas as situações objetivamente. Use critérios (exemplo: resultados esperados, característica da dor, objetivos de aprendizagem) para determinar os resultados de ações de enfermagem.
- () Tenha mente aberta ao analisar as informações sobre o cliente. Não faça suposições descuidadas. Será que os dados revelam o que você acredita que seja verdade ou há outras opções?
- () Reflita sobre suas experiências. Identifique maneiras com as quais você pode melhorar seu próprio desempenho. O que faz você acreditar que foi bem-sucedido?
- () Olhe para o significado e importância dos resultados. Existem relações entre os achados? Os dados sobre o cliente ajudam-no a ver que há um problema?
- () Seja ordenado na coleta de dados. Procure padrões para categorizar os dados (exemplo: diagnósticos de enfermagem). Esclareça quaisquer dados sobre os quais estiver incerto.

- (A) (IV) (V) (III) (I) (II)
- (B) (V) (IV) (II) (III) (I)
- (C) (IV) (II) (V) (III) (I)
- (D) (II) (III) (I) (V) (IV)
- (E) (II) (IV) (I) (V) (III)

QUESTÃO 49

De acordo com a RDC nº 36 de 25 de julho de 2013, a aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional define:

- (A) gestão de risco.
- (B) garantia de qualidade.
- (C) boas práticas de funcionamento
- (D) tecnologias em saúde .
- (E) cultura de segurança.

QUESTÃO 50

Segundo Fukuda (2017), a maioria dos psicofármacos provoca uma gama de efeitos colaterais que devem ser monitorados pelo enfermeiro. Nesse contexto, assinale a opção INCORRETA sobre os cuidados gerais de enfermagem que devem ser somados aos específicos na utilização de psicofármacos.

- (A) Hiperglicemia. Observar os níveis glicêmicos e orientar quanto à realização de dieta.
- (B) Visão turva. Esclarecer ao paciente que esse sintoma deve regredir em algumas semanas e orientá-lo para não dirigir até a diminuição desse efeito.
- (C) Boca seca. Oferecer água ao paciente com frequência e orientá-lo a fazer bochecho e higiene oral várias vezes ao dia.
- (D) Diminuição do hábito intestinal. Estar atento à ingestão de alimentos ricos em fibra e à hidratação.
- (E) Retenção urinária. Observar e registrar a ingestão, a eliminação de líquidos e a presença de edema.

PROVA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES

1. A redação deverá ser uma dissertação argumentativa com ideias coerentes, claras e objetivas, em língua portuguesa e com letra legível. Se utilizada a letra de forma (caixa-alta), as letras maiúsculas deverão receber o devido realce;
2. Deverá ter, no mínimo, 15 (quinze) linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e, no máximo, 30 (trinta) linhas. Não poderá conter qualquer marca identificadora ou assinatura, o que implicará a atribuição de nota zero;
3. Os trechos da redação que contiverem cópias dos textos de apoio ao tema proposto ou dos textos do caderno de prova serão desconsiderados para a correção e para a contagem do número mínimo de linhas;
4. O candidato deverá dar um título à redação; e
5. O rascunho deverá ser feito em local apropriado.

TEXTO I

A relação entre a prática de exercícios físicos e a manutenção da saúde mental tornou-se um consenso entre os profissionais de saúde. Pesquisas mostram que o exercício físico regular pode reduzir o risco de depressão e reduzir a perda cognitiva em pacientes com Alzheimer. Uma das descobertas de pesquisas recentes é que exercícios como caminhar, correr ou andar de bicicleta são essenciais para manter a função nervosa saudável, mesmo com a idade mais avançada. Diante do declínio do nível de atividade física da população mundial, a Organização Mundial da Saúde (OMS) assumiu que estamos vivenciando a prevalência de estilos de vida sedentários. Ou seja, a falta de exercícios não é mais apenas um problema estético, mas um grave problema de saúde pública, causando 2 milhões de mortes a cada ano.

Disponível em: <https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/beneficios-do-esporte-para-a-saude-mental/>. Acesso em 08 de maio de 2024. (adaptado)

TEXTO II

Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 40,3% da população brasileira com 18 anos ou mais idade pode ser considerada insuficientemente ativa, ou seja, não pratica atividade física ou pratica menos de 150 minutos por semana, considerando lazer, trabalho e deslocamento para o trabalho. Entre os jovens, o número é maior e ainda mais alarmante: 84%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda de acordo com a OMS, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina e ocupa a quinta posição no *ranking* mundial. Não é de hoje que a OMS vem alertando quanto à necessidade de modificar o estilo de vida sedentário e praticar exercícios físicos regularmente para uma melhor qualidade de vida e saúde. Romper com esse padrão e mudar as estatísticas pode ser simples e leve. Precisamos incluir as atividades físicas no nosso dia a dia e pensar nelas como um fator que vai melhorar nossa qualidade de vida hoje e todos os dias a partir de então.

Disponível em: <https://viverbem.unimedbh.com.br/qualidade-de-vida/atividade-fisica/> Acesso em 08 de maio de 2024. (adaptado)

TEXTO III

As atividades e seus benefícios

Confira cinco tipos de atividades essenciais que promovem a qualidade de vida de uma forma bastante completa:



Natação

Aprimora os sistemas respiratório e cardiovascular, aumenta a resistência, auxilia na perda de peso, fortalece as articulações e reduz o estresse.



Musculação

Libera hormônios associados à sensação de bem-estar e inibe a atuação de agentes inflamatórios, sendo fundamental no tratamento de doenças como diabetes e hipertensão.



Corrida e caminhada

Melhoram a circulação e atividade cardiorrespiratória, fortalecem os músculos da perna, como a panturrilha, e aumentam a sensação de bem-estar.



Para a mente e o corpo

São os exercícios que trabalham a saúde física e mental, como ioga, tai chi chuan, bodybalance e pilates. Reduzem a ansiedade, melhoram a respiração e aprimoram a concentração, a postura e a coordenação motora.

Alongamento

Melhora a flexibilidade, a circulação e a estrutura muscular. Também alivia tensões e ajuda no relaxamento.

Disponível em: <https://www.folhape.com.br/noticias/pratica-de-exercicios-fisicos-traz-qualidade-de-vida-e-ajuda-a-curar/161904/>. Acesso em 08 de maio de 2024. (adaptado)

PROPOSTA DE REDAÇÃO - A partir da leitura dos textos de apoio e de suas reflexões, redija uma dissertação argumentativa a respeito do tema “O impacto das práticas esportivas na qualidade de vida”. Dê um título ao seu texto.


RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas: o caderno é composto por uma prova escrita objetiva com 50 questões de múltipla escolha e uma prova de Redação. Escreva e assinhe corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo necessário à Redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
- 4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela Marinha do Brasil;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 6 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 7 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de **120 minutos**.
- 8 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; e
 - e) cometer ato grave de indisciplina.
- 9 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta de material transparente;
 - b) escreva seu nome em letra legível no local indicado;
 - c) assinhe seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 10 - Preencha a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:



Nome: **ROBERTO SILVA**

Assinatura: **Roberto Silva**

PREENCHIMENTO DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO					DV	P	G	
5	7	0	2	0	7	0	2	4

PREENCHIMENTO DAS RESPOSTAS

01 (A) (B) (C) (D) (E)	27 (A) (B) (C) (D) (E)
02 (A) (B) (C) (D) (E)	28 (A) (B) (C) (D) (E)
03 (A) (B) (C) (D) (E)	29 (A) (B) (C) (D) (E)
04 (A) (B) (C) (D) (E)	30 (A) (B) (C) (D) (E)
05 (A) (B) (C) (D) (E)	31 (A) (B) (C) (D) (E)
06 (A) (B) (C) (D) (E)	32 (A) (B) (C) (D) (E)
07 (A) (B) (C) (D) (E)	33 (A) (B) (C) (D) (E)
08 (A) (B) (C) (D) (E)	34 (A) (B) (C) (D) (E)
09 (A) (B) (C) (D) (E)	35 (A) (B) (C) (D) (E)
10 (A) (B) (C) (D) (E)	36 (A) (B) (C) (D) (E)
11 (A) (B) (C) (D) (E)	37 (A) (B) (C) (D) (E)
12 (A) (B) (C) (D) (E)	38 (A) (B) (C) (D) (E)
13 (A) (B) (C) (D) (E)	39 (A) (B) (C) (D) (E)
14 (A) (B) (C) (D) (E)	40 (A) (B) (C) (D) (E)
15 (A) (B) (C) (D) (E)	41 (A) (B) (C) (D) (E)
16 (A) (B) (C) (D) (E)	42 (A) (B) (C) (D) (E)
17 (A) (B) (C) (D) (E)	43 (A) (B) (C) (D) (E)
18 (A) (B) (C) (D) (E)	44 (A) (B) (C) (D) (E)
19 (A) (B) (C) (D) (E)	45 (A) (B) (C) (D) (E)
20 (A) (B) (C) (D) (E)	46 (A) (B) (C) (D) (E)
21 (A) (B) (C) (D) (E)	47 (A) (B) (C) (D) (E)
22 (A) (B) (C) (D) (E)	48 (A) (B) (C) (D) (E)
23 (A) (B) (C) (D) (E)	49 (A) (B) (C) (D) (E)
24 (A) (B) (C) (D) (E)	50 (A) (B) (C) (D) (E)

T
A
R
J
A

- 11 - Será autorizado ao candidato levar a prova faltando 30 minutos para o término do tempo previsto de realização do concurso. Ressalta-se que o caderno de prova levado pelo candidato é de preenchimento facultativo, e não será válido para fins de recursos ou avaliação.
- 12 - O candidato que não desejar levar a prova está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, no modelo de gabarito impresso no fim destas instruções. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.
- 13 - O candidato somente poderá destacar o modelo de gabarito na presença do fiscal e após terminar a prova. Caso o modelo de gabarito seja destacado sem a presença do fiscal, o candidato será eliminado do concurso.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50