

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

*(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE
ESPECIALIZAÇÃO, SOB A FORMA DE
TREINAMENTO EM SERVIÇO PARA
ENFERMEIROS, NOS MOLDES DE RESIDÊNCIA
DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL NAVAL
MARCÍLIO DIAS
C-EENF/2019)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

Considerando os cuidados específicos durante a cesariana em gestantes portadoras do vírus HIV/AIDS, podemos afirmar que:

- I- A cesárea eletiva deve ser realizada a partir da 38ª semana de gestação.
- II- Proceder ao parto empêlcado.
- III- Realizar a completa hemostasia após realizar a histerotomia.
- IV- Confirmar a idade gestacional.
- V- Evitar antibiótico profilático.

- (A) As assertivas I, II e V são verdadeiras; III e IV são falsas.
- (B) As assertivas III e V são verdadeiras; I, II e IV são falsas.
- (C) Todas as assertivas são verdadeiras.
- (D) As assertivas I, II e IV são verdadeiras; III e V são falsas.
- (E) Todas as assertivas são falsas.

QUESTÃO 2

Nas medidas relacionadas à prevenção de infecção de cateteres periféricos NÃO é recomendado:

- (A) Uso de preparação alcoólica para as mãos (60% a 80%).
- (B) Escolha de cateteres de menor calibre.
- (C) Uso da metodologia de visualização para instalação de cateteres.
- (D) Limitar ao máximo de 4 as tentativas para punção periférica.
- (E) Avaliar o sítio de inserção a cada 48 horas.

QUESTÃO 3

Assinale a opção em que a mulher Fator Rh negativo deve realizar a prevenção, da sensibilização pelo Fator Rh, administrando a imunoglobulina anti-D.

- (A) Após o parto de mulheres com coombs direto positivo e recém-nascido Rh negativo.
- (B) Após procedimentos invasivos em mulheres gestantes: amniocentese e cordocentese.
- (C) Após procedimentos invasivos: ultrasonografia do terceiro trimestre e pesquisa de estreptococos do grupo B.
- (D) Após o parto de mulheres com coombs indireto positivo e recém-nascido Rh negativo.
- (E) Antes do parto de gestantes com coombs direto positivo e pai Rh positivo.

QUESTÃO 4

Assinale a opção que corresponde aos principais efeitos adversos da quetiapina, medicação utilizada no tratamento da esquizofrenia.

- (A) Congestão nasal/ diminuição do volume ejaculatório/ taquicardia.
- (B) Taquicardia/ ganho de peso/ agitação.
- (C) Agranulocitose/ taquicardia/ risco alto para convulsão.
- (D) Constipação/ hipotensão postural/ perda de peso.
- (E) Hipertensão/ perda acentuada de peso/ sudação.

QUESTÃO 5

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é dever do profissional:

- (A) revelar sobre o fato sigiloso somente quando o fato já for de conhecimento público.
- (B) manter segredo sobre fato sigiloso, exceto se obtiver o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
- (C) não revelar sobre o fato sigiloso mesmo quando necessário à prestação da assistência.
- (D) revelar sobre o fato sigiloso se intimado como testemunha a comparecer perante a autoridade.
- (E) revelar sobre o fato sigiloso somente em caso de falecimento da pessoa envolvida.

QUESTÃO 6

No tratamento das gestantes com sífilis, após a primeira dose de penicilina, a paciente pode apresentar exacerbação das lesões cutâneas com eritema, dor ou prurido, as quais regridem espontaneamente após doze a vinte e quatro horas, sem a necessidade da descontinuidade do tratamento. Assinale a opção que corresponde a esta manifestação clínica.

- (A) Síndrome de *Lyell*.
- (B) Síndrome de *Stevens-Johnson*.
- (C) Reação treponêmica.
- (D) Reação de *Jarisch-Herxheimer*.
- (E) Síndrome do homem vermelho.

QUESTÃO 7

As alterações respiratórias no recém-nascido são a principal causa de internação no período neonatal e sua incidência e gravidade estão relacionados EXCETO:

- (A) idade gestacional.
- (B) infecção materna.
- (C) sofrimento fetal agudo.
- (D) uso de corticoides antenatal.
- (E) imaturidade dos vasos da matriz germinal.

QUESTÃO 8

O eletrocardiograma é um galvanômetro que amplia, filtra e registra a atividade elétrica do coração em um papel milimetrado especialmente determinado para este fim. Com relação ao eletrocardiograma, assinale a alternativa correta.

- (A) O papel para registro do eletrocardiograma é quadriculado, com distância de um milímetro entre cada linha horizontal e vertical. O eixo horizontal mede a amplitude e o eixo vertical mede o tempo.
- (B) O traçado do eletrocardiograma se dá na forma de ondas que possuem características próprias, como duração, amplitude e configuração.
- (C) O registro do eletrocardiograma é a soma do potencial elétrico captado por eletrodos posicionados sobre a superfície corpórea do indivíduo.
- (D) Os dipolos de despolarização ou repolarização podem ser representados como vetores que terão características com potencial para condutância, potencial elétrico e potencial de vetores.
- (E) Quanto à voltagem dos traçados eletrocardiográficos, cada linha horizontal corresponde a 0,5 mV sendo possível determinar a duração do evento registrado.

QUESTÃO 9

A punção venosa periférica consiste em instalar cateter em trajeto venoso periférico para manutenção de uma via de acesso para infusão de soluções ou administração de medicamentos. A avaliação de flebite e infiltração é um cuidado de enfermagem importante. Pacientes que apresentam no sítio da punção presença de dor, com eritema ou edema com endurecimento e cordão fibroso palpável pode ter sua flebite classificada como:

- (A) grau 0
- (B) grau 1
- (C) grau 2
- (D) grau 3
- (E) grau 4

QUESTÃO 10

As penalidades a serem impostas pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem são: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional. É considerada circunstância atenuante:

- (A) aproveitar-se da fragilidade da vítima.
- (B) realizar atos sob emprego real de força física.
- (C) cometer a infração com abuso de autoridade.
- (D) ter maus antecedentes profissionais.
- (E) cometer infração dolosamente.

QUESTÃO 11

Os frascos de vacina com prazo de validade expirado são classificados como resíduos de saúde do grupo:

- (A) A1
- (B) A2
- (C) A3
- (D) A4
- (E) A5

QUESTÃO 12

A síndrome de Guillain-Barré refere-se a desmielinização inflamatória autoimune (celular e hormonal). Assinale a opção que corresponde às manifestações clínicas clássicas desta doença.

- (A) Arreflexia e fraqueza ascendente.
- (B) Alteração cognitiva e do nível de consciência.
- (C) Hiperplexia e parestesias das mãos e pés.
- (D) Hiporeflexia e fraqueza descendente.
- (E) Cegueira e hiperflexia.

QUESTÃO 13

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o programa Cirurgia Segura Salva Vidas preconiza uma lista de verificação denominada *checklist* para cirurgia segura. Assinale a alternativa que inclui o procedimento a ser realizado pela equipe cirúrgica na etapa chamada de TIME OUT.

- (A) O coordenador da equipe checa verbalmente com a equipe de anestesia se o paciente tem risco de perda sanguínea.
- (B) A enfermagem revisa se o antibiótico profilático foi administrado nos últimos 60 minutos.
- (C) A equipe conclui a verificação do carro de anestesia e de medicamentos.
- (D) O cirurgião realiza a demarcação do local da cirurgia.
- (E) O coordenador da equipe checa verbalmente com a equipe de anestesia se o paciente tem dificuldade de obtenção de vias aéreas.

QUESTÃO 14

A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo *Treponema pallidum*. Sobre essa doença, avalie as afirmações abaixo:

- I- A transmissão pode ser sexual e vertical.
- II- É classificada em sífilis primária, secundária e terciária.
- III- A penicilina G benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento, sendo administrada sempre em três doses.
- IV- O diagnóstico pode ser feito por testes treponêmicos, sendo Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) teste em cartão da reagina plasmática rápida (RPR-CT) os mais utilizados.
- V- As lesões da sífilis primária e secundária são altamente infecciosas.

As alternativas corretas são:

- (A) I-II-III
- (B) I-III-IV
- (C) I-II-IV
- (D) II-III-V
- (E) I-II-V

QUESTÃO 15

A administração de nutrição parenteral tem como objetivo proporcionar suporte energético e nutricional visando manter as funções orgânicas e preservar a estrutura corpórea em pacientes cuja via digestória esteja comprometida ou não seja suficiente para suprir suas necessidades. Identifique como verdadeira (V) ou falsa (F) as seguintes afirmativas:

- () A responsabilidade da administração da terapia de nutrição parenteral é do enfermeiro, inclusive a manipulação do cateter, quando necessário.
- () A temperatura ambiente, as bolsas de nutrição parenteral tem validade de 72 horas.
- () A nutrição parenteral deve ser infundida, em via exclusiva, quando instalada em cateter de duplo lúmen. Caso seja por tripla via, deve-se utilizar a via proximal.
- () Medicamentos como anfotericina, ampicilina, carbenicilina e gentamicina são incompatíveis com a solução de nutrição parenteral.

- (A) V-F-V-F
- (B) F-V-F-F
- (C) F-F-V-V
- (D) V-F-F-V
- (E) F-V-F-V

QUESTÃO 16

As vacinas com vírus vivos atenuados são contraindicadas na gestação. Assinale a vacina de vírus vivo atenuado onde a imunização poderá ser indicada para gestantes com risco de exposição ao vírus, considerando o risco-benefício.

- (A) Vacina influenza/H1N1.
- (B) Vacina da febre Amarela.
- (C) Vacina da hepatite B.
- (D) Vacina da hepatite A.
- (E) Vacina meningocócica.

QUESTÃO 17

A principal via de transmissão da hepatite B é a sexual, seguida da vertical. Quais os marcadores devem ser solicitados na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite B?

- (A) Anti-HBc total e HbeAg.
- (B) Anti- HBc IgG e HBsAg.
- (C) HBeAg e Anti-Hbe.
- (D) Anti- HBc IgG E Anti-Hbe.
- (E) HBsAg e Anti-HBc Total.

QUESTÃO 18

A Sobrecarga ventricular é a situação na qual mais comumente ocorre o aumento da amplitude do QRS. Em que situação o QRS pode estar aumentado em indivíduos normais?

- (A) Estenose aórtica.
- (B) Insuficiência mitral.
- (C) Persistência do canal atrial.
- (D) Vagotomia.
- (E) Hipertensão arterial.

QUESTÃO 19

Para realização de sondagem vesical de demora em mulheres adultas é necessário que:

- (A) o cateter escolhido tenha calibre entre 6 e 8.
- (B) a paciente seja posicionada na posição de Sims, para melhor visualizar o meato urinário.
- (C) a assepsia do local seja realizada com solução tópica, aquosa e degermante.
- (D) a sonda seja fixada na face interna da coxa.
- (E) a assepsia seja realizada iniciando-se nos grandes lábios, pequenos lábios, orifício vaginal e por fim meato urinário.

QUESTÃO 20

No Brasil, os fármacos Rifampicina (R), Isoniazida (H), Pirazinamida (Z) e Etambutol (E) são utilizados para o tratamento da tuberculose (TB). Qual o esquema básico para tratamento da TB meningoencefálica e osteoarticular em adultos e adolescentes maior ou igual a 10 anos de idade?

- (A) 2RHZ/2RH.
- (B) 2RHZ/10 RH.
- (C) 2RMZ/4RH.
- (D) 2RMZE/10RH.
- (E) 2RMZE/4RH.

QUESTÃO 21

A imunidade inespecífica se opõe à colonização, a penetração, a multiplicação e a persistência do agente infeccioso no organismo. Seus principais componentes são , EXCETO:

- (A) fagocitose.
- (B) barreiras físicas.
- (C) fatores séricos e teciduais.
- (D) produção de células de memória.
- (E) barreiras fisiológicas.

QUESTÃO 22

Na análise dos gases arteriais durante a acidose respiratória, é correto encontrarmos os seguintes achados:

- (A) pH baixo, HCO_3^- normal ou alto, PaCO_2 alto.
- (B) pH alto, HCO_3^- baixo ou normal , PaCO_2 baixo.
- (C) pH alto, 2 HCO_3^- alto , PaCO_2 normal.
- (D) pH baixo, 2 HCO_3^- baixo , PaCO_2 baixo ou normal.
- (E) pH baixo, 2 HCO_3^- alto, PaCO_2 baixo ou normal.

QUESTÃO 23

O quadro evolutivo da úlcera de pressão caracterizado por perda de derme em espessura parcial, e que apresenta-se como úlcera aberta rasa com leito de ferida róseo-avermelhado sem esfacelo ou contusão corresponde ao estágio

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) inestadiável.

QUESTÃO 24

O vírus Zika é um flavivírus capaz de causar infecção em humanos. As anomalias congênitas, associadas à infecção pelo vírus Zika, foram observadas logo após a entrada do vírus no território nacional. Identifique como verdadeiro (V) ou falso (F) as seguintes afirmativas para casais que desejam a concepção:

- () Aguardar até três meses após sinais/sintomas relacionados à infecção pelo vírus Zika quando o homem foi infectado.
 - () Aguardar até seis meses após sinais/sintomas relacionados à infecção pelo vírus Zika quando o homem foi infectado.
 - () Aguardar até oito semanas após sinais/sintomas relacionados à infecção pelo vírus Zika quando a mulher foi infectada.
 - () Aguardar até seis semanas após sinais/sintomas relacionados à infecção pelo vírus Zika quando a mulher foi infectada.
- (A) V-F-F-V
 - (B) F-F-V-V
 - (C) F-V-V-F
 - (D) V-V-F-F
 - (E) F-V-F-V

QUESTÃO 25

A *Extracorporeal Membrane Oxygenation* (ECMO), idealizada para fornecer aporte cardiopulmonar adequado a pacientes com insuficiência cardíaca e ou respiratória que não respondem às intervenções terapêuticas convencionais. São consideradas contraindicações absolutas para qualquer tipo de ECMO; EXCETO:

- (A) Doença neurológica irreversível.
- (B) Avançada doença Hepática.
- (C) Peso corpóreo > 100kg.
- (D) Parada cardiorrespiratória maior que 60 minutos (não assistida).
- (E) AIDS com doença maligna secundária.

QUESTÃO 26

Entre as medidas de segurança que devem ser adotadas pelos serviços de vacinação que utilizam refrigeradores domésticos estão:

- (A) utilizar preferencialmente refrigeradores tipo frigobar.
- (B) utilizar o termômetro digital de cabo extensor com o sensor posicionado no ponto posterior da câmara interna.
- (C) manter a temperatura ideal do refrigerador em +5 graus C.
- (D) utilizar bobinas reutilizáveis para auxílio da manutenção da temperatura da câmara interna.
- (E) acondicionar os imunobiológicos sempre na primeira prateleira.

QUESTÃO 27

Reação transfusional é toda consequência ou efeito desfavorável de uma transfusão de sangue ou hemocomponente. Assinale a reação transfusional que se evidencia por uma síndrome de angústia respiratória que ocorre dentro de quatro horas após a transfusão e se caracteriza por dispneia e hipóxia secundária a edema pulmonar não cardiogênico.

- (A) Sobrecarga circulatória.
- (B) TRALI.
- (C) Reação febril não hemolítica.
- (D) Reação hemolítica aguda.
- (E) Reação alérgica.

QUESTÃO 28

Alguns fatores, situações e condições podem ser indicadas como possíveis de contraindicações sérias à administração de todo imunobiológico e devem ser objetivo de avaliação. Assinale a opção que corresponde à situação onde a administração de imunobiológicos deve ser adiada.

- (A) Ocorrência de efeito adverso em dose anterior de uma vacina, a exemplo de uma reação local (dor e vermelhidão no local da aplicação).
- (B) Diagnósticos clínicos prévios de doenças, tais como tuberculose, coqueluche, tétano, difteria, poliomielite, sarampo, rubéola e caxumba.
- (C) Contato domiciliar de gestante uma vez que os vacinados transmitem o vírus do sarampo, caxumba e rubéola.
- (D) Histórico de alergia não especificada, individual ou familiar, com ocorrência de evento adverso (exemplo: convulsão).
- (E) Usuário que necessite receber imunoglobulina, sangue ou hemoderivados não devem ser vacinados com vacinas que contenham agentes vivos atenuados nas quatro semanas que antecederem e até cinquenta dias após o uso destes produtos.

QUESTÃO 29

De acordo com a classificação Internacional de Segurança do Paciente, criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pode-se descrever o termo Incidente como um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário a pessoa. Assinale a opção correta de como se classificam os Incidentes.

- (A) Incidente com dano; incidente comprovado, *Near miss*.
- (B) Incidente sem dano; evento adverso; erro confirmado.
- (C) *Near Miss*, Incidente sem dano; incidente com dano.
- (D) *Near Miss*, quase erro, acidente confirmado.
- (E) Acidente com dano; incidente com dano; incidente sem dano.

QUESTÃO 30

A enoxaparina é uma medicação que deve ser administrada por via subcutânea. Assinale a opção correta relacionada a este fármaco.

- (A) A enoxaparina é apresentada em seringas, prontas para uso (a seringa tem uma bolha de ar que não deve ser retirada antes da administração).
- (B) O fabricante recomenda a aplicação na região abdominal (para que haja absorção mais rápida do medicamento). Não se deve alternar o lado e local de aplicação na região abdominal.
- (C) A enoxaparina é apresentada em seringas, prontas para uso (a seringa tem uma bolha de ar que deve ser retirada antes da administração).
- (D) O fabricante não recomenda a aplicação na região abdominal (dificulta a absorção mais rápida do medicamento). Deve-se alternar os locais de aplicação.
- (E) A enoxaparina é um fármaco do grupo dos anticoagulantes com alto peso molecular encontrada em frascos multidoses.

QUESTÃO 31

A hipertensão portal é caracterizada pelo aumento patológico do gradiente de pressão venosa hepática. De acordo com a etiologia, qual a causa pode ser classificada como pré-hepática?

- (A) Trombose de veia Porta.
- (B) Cirrose alcoólica.
- (C) Fibrose hepática congênica.
- (D) Hepatites virais crônicas.
- (E) Síndrome de Budd-chiavi.

QUESTÃO 32

Assinale a opção que corresponde a um critério para antecipação do parto segundo as condições maternas na pré-eclâmpsia grave longe do termo.

- (A) Contagem de plaquetas menor que $150.000/\text{mm}^3$.
- (B) Diminuição progressiva da creatinina sérica.
- (C) Pressão Arterial maior ou igual 150/100 apesar de doses máximas de anti-hipertensivos.
- (D) Oligohidrâmnio.
- (E) Cefaleia ou distúrbios visuais persistentes.

QUESTÃO 33

O volume da vacina hepatite B (recombinante) normalmente a ser administrado é de 0,5 ml até os _____ anos de idade e, após, 1ml.

- (A) 2
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 12
- (E) 19

QUESTÃO 34

A vacinação simultânea consiste na administração de duas ou mais vacinas no mesmo momento em diferentes regiões anatômicas e vias de administração. De um modo geral, as vacinas constantes nos calendários de vacinação podem ser administradas simultaneamente sem que ocorra interferência na resposta imunológica. Assinale a opção em que NÃO pode ocorrer a administração simultânea.

- (A) Difteria e Tétano.
- (B) BCG e Hepatite B.
- (C) Hepatite A e Hepatite B.
- (D) Tríplice Viral e Hepatite B.
- (E) Febre Amarela e Tríplice Viral.

QUESTÃO 35

A Hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo *Mycobacterium leprae*. Os esquemas terapêuticos utilizados para multibacilar podem apresentar efeitos adversos das drogas. Os efeitos cutâneos podem acontecer no uso da maioria das drogas utilizadas. Assinale a opção correta da droga que pode causar a síndrome de *Stevens-Johnson*, dermatite esfoliativa ou eritrodermia.

- (A) Rifampicina.
- (B) Clofazimina.
- (C) Dapsona.
- (D) Talidomida.
- (E) Etambutol.

QUESTÃO 36

As complicações mais comuns da administração de nutrição parenteral são:

- (A) hipercapnia e hiperglicemia.
- (B) hipoglicemia e retardo do esvaziamento gástrico.
- (C) embolia e desidratação.
- (D) hiperglicemia e pneumotórax.
- (E) sepse e hipocalemia.

QUESTÃO 37

De acordo com a NR32 o empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estão expostos por falta ou recusa de vacinação. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente, programa de imunização ativa contra:

- (A) tétano, diftéria, sarampo, gripe e tuberculose.
- (B) tétano, diftéria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
- (C) tuberculose, gripe, hepatite B e Tétano.
- (D) tétano, febre amarela, hepatite B, e os estabelecidos no PCMSO.
- (E) hepatite B, rubéola, sarampo e os estabelecidos no PCMSO.

QUESTÃO 38

O uso da ventilação mecânica não invasiva tem demonstrado redução na incidência de pneumonia quando comparada com a ventilação mecânica invasiva. Assinale a opção que corresponde a uma contra indicação absoluta da ventilação mecânica não invasiva.

- (A) Trauma ou deformidade facial.
- (B) Alto risco de aspiração.
- (C) Necessidade de intubação de emergência.
- (D) Obstrução das vias aéreas superiores.
- (E) Anastomose de esôfago recente.

QUESTÃO 39

A anemia falciforme é uma anemia hemolítica grave, que resulta da herança do gene da hemoglobina falciforme (Hbs), que produz uma molécula de hemoglobina defeituosa. Assinale a opção que corresponde a uma complicação potencial desta doença.

- (A) Linfadenopatia.
- (B) Hiponatremia.
- (C) Priapismo.
- (D) Atelectasia.
- (E) Esplenomegalia.

QUESTÃO 40

Na iminência do trabalho de parto prematuro, o agente tocolítico de primeira escolha é o(a):

- (A) atosibano.
- (B) ritodrina.
- (C) nifedipina.
- (D) terbutalina.
- (E) indometacina.

QUESTÃO 41

De acordo com a RDC ANVISA Nº 306/04 e Resolução CONAMA Nº 358, os resíduos de serviços de saúde são classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E. Assinale a opção abaixo na qual as bolsas transfusionais com resíduo inferior a 10 ml estão incluídas.

- (A) Grupo A.
- (B) Grupo B.
- (C) Grupo C.
- (D) Grupo D.
- (E) Grupo E.

QUESTÃO 42

A tuberculose na criança apresenta especificidades que devem ser consideradas durante sua investigação diagnóstica. Assinale a opção que caracteriza a Tríade Clássica que deve ser observada na suspeita de tuberculose pulmonar na criança maior de 10 anos de idade.

- (A) Febre de origem indeterminada; ganho de peso; anidrose.
- (B) Tosse seca; febre alta; aumento do apetite.
- (C) Eritema nodoso; anidrose; ausência de ruído adventício.
- (D) Redução do apetite, perda de peso; tosse crônica.
- (E) Presença de expectoração; anidrose; febre diurna.

QUESTÃO 43

O intervalo QT aumenta com o avanço da idade e durante o sono. É normalmente melhor mensurado em V2 e V3 e deve ser corrigido pela frequência (QTC ou QT corrigido). Qual o significado eletrofisiológico deste intervalo?

- (A) Repolarização atrial.
- (B) Tempo de condução através do nó AV.
- (C) Duração total da sístole elétrica ventricular.
- (D) Repolarização ventricular.
- (E) Ativação dos átrios.

QUESTÃO 44

De acordo com *Kurgant* (2010), no gerenciamento de recursos materiais, a especificação é realizada em qual momento do fluxo das principais atividades do gerenciamento da cadeia logística?

- (A) Compra.
- (B) Armazenamento.
- (C) Programação.
- (D) Recepção.
- (E) Distribuição e controle.

QUESTÃO 45

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem -Resolução COFEN 0564/2017 - é dever do profissional:

- (A) anunciar a prestação de serviços para os quais tenha habilidade e competência.
- (B) realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente.
- (C) permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando, nestas, não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação.
- (D) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.
- (E) aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade.

QUESTÃO 46

Relacione a doença infecciosa (primeira coluna) com seu agente etiológico (segunda coluna) e assinale a alternativa correta.

- I- Coqueluche.
- II- Oxiuríase.
- III- Linfogranuloma venéreo.
- IV- Ancilostomíase.
- V- Cancroide.

- () *Bordetella pertussis*.
- () *Haemophilus ducreyi*.
- () *Necator americanus*.
- () *Enterobius vermicularis*.
- () *Chlamydia inguinale*.

- (A) I-II-III-IV-V
- (B) I-III-II-V-IV
- (C) I-V-IV-II-III
- (D) II-III-IV-I-V
- (E) II-IV-III-I-II

QUESTÃO 47

De acordo com a RDC 222/2018, os materiais perfurocortantes devem ser descartados em recipientes identificados, rígidos, providos com tampa, resistentes à punctura, ruptura e vazamento. A qual grupo dos resíduos de saúde os materiais perfurocortantes pertencem?

- (A) Grupo D.
- (B) Grupo E.
- (C) Grupo A.
- (D) Grupo B.
- (E) Grupo C.

QUESTÃO 48

A síndrome de *korsakoff* é um distúrbio caracterizado pelos seguintes sintomas:

- (A) afasia e apraxia.
- (B) agnosia e disartria.
- (C) delírios e psicose.
- (D) afasia e dormência.
- (E) cefaleia e hemorragia.

QUESTÃO 49

Uma boa amostra para realização do bacteriológico para diagnóstico de tuberculose é a que provém da árvore brônquica, obtida após esforço de tosse. O volume ideal é de:

- (A) 3 a 8 ml
- (B) 5 a 10 ml
- (C) Até 5 ml
- (D) 3 a 5 ml
- (E) 2 a 6 ml

QUESTÃO 50

Se um indivíduo considerado como suscetível, relata ter realizado três doses da vacina hepatite B há 6 meses, o resultado da sorologia para hepatite B apontará como positivo(s) o(s) seguinte(s) anticorpo(s)/ antígeno(s):

- (A) apenas HbsAg.E.
- (B) HBs-Ag E AntiHBc total.
- (C) Apenas anti-Hbs.
- (D) Anti-HBe e HbsAg.
- (E) HBs-Ag E AntiHBc IGM.

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1- Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2- O tempo para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3- Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
- 4- Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5- Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 6- Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 7- Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 8- O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 90 minutos.
- 9- Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
 - e) cometer ato grave de indisciplina; e
 - f) comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 10- Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assine o seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

- 12 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

| ANOTE SEU GABARITO | | | | | | | | | | PROVA DE COR _____ | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |