

**MARINHA DO BRASIL**  
**SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA**

*(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO  
DE APOIO À SAÚDE DO CORPO DE SAÚDE DA  
MARINHA / CP-CSM-S /2021)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**ENFERMAGEM**

### QUESTÃO 1

Segundo Araújo (2014), o volume de líquido amniótico inferior a 400ml no terceiro trimestre da gestação define a oligodramnia. Sobre condutas e intervenções de enfermagem, é INCORRETO afirmar que deve-se:

- (A) monitorar continuamente o estado da mãe e do feto, incluindo sinais vitais e padrões de frequência cardíaca fetal.
- (B) alertar a gestante a evitar esforço durante a defecação.
- (C) orientar quanto ao repouso no leito e estimular a gestante a deitar-se do lado direito.
- (D) avaliar sinais e sintomas de trabalho de parto.
- (E) avaliar a necessidade de solicitar um profissional especializado para apoio emocional.

### QUESTÃO 2

De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, que trata do Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, é um dever do profissional de Enfermagem:

- (A) participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- (B) formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha.
- (C) realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente.
- (D) aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade.
- (E) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organização de categoria.

### QUESTÃO 3

De acordo com Brunner e Suddarth (2014), a doença hereditária progressiva e crônica do sistema nervoso que resulta em movimentos coreiformes involuntários progressivos e demência é descrita como:

- (A) Síndrome de Guillain - Barré.
- (B) Doença de Huntington.
- (C) Paralisia de Bell.
- (D) Doença de Parkinson.
- (E) Esclerose Lateral Amiotrófica.

### QUESTÃO 4

Segundo Brunner e Suddarth (2014), são possíveis complicações da nutrição parenteral:

- (A) náuseas, vômitos e hiperglicemia.
- (B) diarreia, sobrecarga de líquidos e hipoglicemia de rebote.
- (C) sepse, pneumotórax, pneumonia aspirativa.
- (D) hiperglicemia, azotemia, distensão abdominal.
- (E) pneumotórax, embolia e sepse.

### QUESTÃO 5

Segundo Brunner e Suddarth (2014), a embolia pulmonar constitui o problema tromboembólico mais comum em pacientes com insuficiência cardíaca. Assim, assinale a opção que apresenta indicadores clínicos típicos de embolia pulmonar.

- (A) Ausência de pulso periférico, taquicardia e dor torácica.
- (B) Taquipneia, dor torácica e hemoptise.
- (C) Taquicardia, hemoptise e pulso paradoxal.
- (D) Dispneia, cianose de extremidades e batimento de fúrcula.
- (E) Palidez, sudorese e baqueteamento digital.

### QUESTÃO 6

De acordo com Brunner e Suddarth (2014), os agentes quimioterápicos antineoplásicos podem ser classificados por seu potencial para lesionar o tecido mole quando acidentalmente infiltram a partir de uma veia. Assim, de acordo com os autores, é correto afirmar que:

- (A) quando há suspeita de extravasamento, a administração do medicamento é reduzida.
- (B) a via de acesso para administração de agentes vesicantes deve ser a periférica, preferencialmente nas veias da mão ou punho.
- (C) na ocorrência de extravasamento de quimioterápico vesicante, pode ser feita tentativa de aspirar qualquer medicamento remanescente, a partir do sítio do extravasamento, através da agulha existente.
- (D) os cateteres centrais inseridos por via periférica (PICC) devem ser evitados para administração frequente ou prolongada dos vesicantes antineoplásicos.
- (E) a extensão plena do dano tecidual leva poucas semanas para ficar evidente.

### QUESTÃO 7

Gota é um grupo heterogêneo de condições relacionadas com um defeito do metabolismo das purinas, que resulta em hiperuricemia. Segundo Brunner e Suddarth (2014), é correto afirmar que:

- (A) as crises de gota parecem estar relacionada com a elevação ou diminuição regular dos níveis séricos de ácido úrico.
- (B) as manifestações da síndrome da gota consistem em artrite gotosa aguda, tofos, nefropatia gotosa e cálculos urinários de oxalato de cálcio.
- (C) o início abrupto da crise de gota é frequentemente observado pela manhã e desperta o paciente com dor intensa, rubor, edema e calor da articulação acometida.
- (D) a colchicina é administrada no início da crise de Gota e a dose é aumentada até haver alívio da dor ou desenvolvimento de diarreia.
- (E) em geral, os tofos estão associados a episódios inflamatórios raros e graves. As concentrações séricas mais elevadas de ácido úrico também estão associadas à formação mais extensa de tofos.

### QUESTÃO 8

Segundo o Caderno de Controle dos Cânceres do Colo do Útero e das Mamas (2013), qual o mais importante fator de risco para o câncer de mama?

- (A) História familiar.
- (B) Ingestão regular de álcool.
- (C) Obesidade.
- (D) Idade.
- (E) Terapia de reposição hormonal.

### QUESTÃO 9

A Área Técnica Saúde do Idoso vem desenvolvendo ações estratégicas com base nas diretrizes contidas na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2010). São estratégias para promoção do envelhecimento ativo e saudável, EXCETO:

- (A) Assistência Farmacêutica e Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.
- (B) Atenção Domiciliar e Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS.
- (C) Curso de Aperfeiçoamento em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa e Oficinas Estaduais de Prevenção da Osteoporose, Quedas e Fraturas em Pessoas Idosas.
- (D) Campanhas anuais de vacinação com o Programa Nacional de Imunização e reorganização do processo de acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde.
- (E) Curso de Gestão em Envelhecimento e Programa de Prevenção de Doenças Ocupacionais.

### QUESTÃO 10

De acordo com o Guia de bolso - Doenças Infecciosas e Parasitárias (2010), a Tuberculose é uma doença infecciosa que atinge todos os grupos etários, com maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos e do sexo masculino. Com relação a essa doença, marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- ( ) É uma doença de notificação compulsória e investigação obrigatória.
- ( ) A vacina BCG confere poder protetor às formas graves de Tuberculose, decorrentes da primoinfecção.
- ( ) A Tuberculose miliar é a forma mais frequente nos pacientes adultos, atingindo cerca de 90% dos casos.
- ( ) A prova tuberculínica quando positiva, isoladamente, indica a presença de infecção, sendo considerada suficiente para o diagnóstico da Tuberculose.
- ( ) A Baciloscopia direta do escarro é o método de diagnóstico laboratorial prioritário, permitindo identificar o doente bacilífero.

- (A) (V) (F) (V) (V) (F)
- (B) (V) (V) (F) (F) (V)
- (C) (F) (F) (V) (V) (V)
- (D) (V) (V) (F) (V) (F)
- (E) (F) (V) (V) (F) (V)

### QUESTÃO 11

De acordo com a Cartilha da Política Nacional de Humanização: Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco (2004), a área de emergência destinada à assistência de pacientes críticos e semicríticos, já com terapêutica de estabilização iniciada, é classificada como área:

- (A) vermelha.
- (B) amarela.
- (C) verde.
- (D) azul.
- (E) marrom.

### QUESTÃO 12

De acordo com Tannure (2019), o processo de enfermagem é um dos instrumentos metodológicos para sistematizar a assistência de enfermagem. A etapa que determina e nomeia as necessidades de saúde que precisam ser foco do atendimento é:

- (A) a investigação.
- (B) o diagnóstico de enfermagem.
- (C) o planejamento.
- (D) a implementação.
- (E) a avaliação.

### QUESTÃO 13

Com relação aos objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (2008), marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- ( ) Garantir o acesso aos serviços especializados de atenção secundária e terciária para todos os casos, uma vez que os agravos à saúde desse grupo populacional são considerados de alta complexidade.
- ( ) Incentivar o uso de preservativo como medida de dupla proteção da gravidez inoportuna e das DST/AIDS.
- ( ) Ampliar e qualificar a atenção ao planejamento reprodutivo masculino, inclusive a assistência à infertilidade.
- ( ) Desencorajar a contracepção cirúrgica voluntária masculina.
- ( ) Estimular, na população masculina, através da informação, educação e comunicação, o autocuidado com sua própria saúde.

- (A) (V) (F) (V) (V) (F)
- (B) (V) (V) (F) (F) (V)
- (C) (F) (F) (V) (V) (V)
- (D) (V) (V) (F) (V) (F)
- (E) (F) (V) (V) (F) (V)

### QUESTÃO 14

Em relação ao novo coronavírus, de acordo com a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020, atualizada em 25/02/2021, assinale a opção correta.

- (A) O novo coronavírus pode ser enquadrado como agente biológico classe de risco 4.
- (B) Na implementação de coorte, é fundamental que seja mantida uma distância mínima de 1,5 metros entre os leitos dos pacientes.
- (C) Os testes de pesquisa viral por RT-PCR em tempo real devem ser colhidos a partir do 1° dia dos sintomas.
- (D) Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem aqueles à base de cloro, alcoóis, alguns fenóis e alguns iodóforos e quaternário de amônio.
- (E) Na transferência interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados de Covid -19, o paciente deve utilizar máscara N95/PPF2 durante todo o percurso.

### QUESTÃO 15

De acordo com Potter e Perry (2017), o exame físico é um componente rotineiro da avaliação do paciente. Qual é a posição para avaliar reto e vagina?

- (A) Supina.
- (B) Prona.
- (C) Decúbito dorsal.
- (D) Sims.
- (E) Litotômica.

### QUESTÃO 16

Segundo Brunner e Suddarth (2014), a doença de Paget é um distúrbio de renovação óssea rápida. Assinale a opção que apresenta a deformidade esquelética que ocorre na doença de Paget.

- (A) O fêmur e a tíbia tendem a sofrer arqueamento, produzindo uma marcha Parkinsoniana.
- (B) A coluna inclina-se para trás e torna-se rígida.
- (C) Os braços são inclinados para dentro e para frente.
- (D) O queixo eleva-se sobre o tórax.
- (E) O tronco é flexionado sobre as pernas para manter o equilíbrio.

### QUESTÃO 17

Em relação à oximetria de pulso, de acordo com Potter e Perry (2017), é correto afirmar que:

- (A) os valores obtidos com a oximetria são menos precisos em saturações inferiores a 80%.
- (B) a icterícia interfere na capacidade do oxímetro de processar a luz refletida.
- (C) os corantes intravasculares (azul de metileno) aumentam a saturação artificialmente.
- (D) fontes de luz externas não interferem na capacidade do oxímetro de processar a luz refletida.
- (E) o monóxido de carbono reduz artificialmente a saturação de O<sub>2</sub>.

### QUESTÃO 18

Segundo Townsend (2002), o distúrbio da personalidade, no qual as pessoas são hipervigilantes e prontas para qualquer ameaça real ou imaginária, é chamado de:

- (A) esquizoide.
- (B) borderline.
- (C) paranoide.
- (D) narcisística.
- (E) esquizotípica.

### QUESTÃO 19

De acordo com Brunner e Suddarth (2014), o cateterismo cardíaco é um procedimento diagnóstico invasivo usado, frequentemente, para diagnosticar doença arterial coronária. São cuidados de enfermagem após o cateterismo cardíaco:

- (A) avaliar queixas de dor e sensações de dormência ou formigamento no membro afetado, que podem indicar insuficiência venosa.
- (B) manter repouso no leito por 24 horas com a perna afetada flexionada e a cabeça elevada a 45°.
- (C) avaliar os pulsos periféricos, no membro afetado, a cada 30 minutos na primeira hora.
- (D) avaliar as arritmias cardíacas através da observação do monitor cardíaco ou da avaliação dos pulsos apical e periférico.
- (E) manter restrição hídrica por 24 horas, para evitar nefropatia induzida por agente de contraste.

### QUESTÃO 20

A Lei nº 7498/86 dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. No que tange às atividades do enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- ( ) Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação.
- ( ) Cuidados direto de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- ( ) Prescrição da assistência de enfermagem.
- ( ) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
- ( ) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.

- (A) (F)(F)(V)(V)(F)
- (B) (V)(F)(V)(V)(F)
- (C) (F)(V)(F)(F)(V)
- (D) (V)(F)(F)(V)(F)
- (E) (V)(V)(F)(F)(V)

### QUESTÃO 21

Segundo Brunner e Suddarth (2014), a cirurgia de próstata pode estar indicada para o paciente com hiperplasia prostática benigna ou câncer de próstata. Segundo os autores, as complicações potenciais pós-operatórias podem incluir:

- (A) ansiedade, infecção e disfunção sexual.
- (B) hemorragia, infecção e obstrução do cateter.
- (C) ansiedade, disfunção sexual e obstrução do cateter.
- (D) hemorragia, orquite e choque.
- (E) trombose venosa profunda, disfunção sexual e orquite.

### QUESTÃO 22

Segundo o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (2014), é correto afirmar que:

- (A) o volume máximo de um imunobiológico a ser administrado pela via intradérmica é 1,0 ml.
- (B) para a reconstituição de imunobiológicos apresentados sob a forma liofilizada, a tampa de borracha do frasco-ampola deve ser limpa com algodão embebido em álcool a 70%.
- (C) na sala de vacinação, recomenda-se o uso de caixa térmica de poliuretano para acomodação dos imunobiológicos de uso diário.
- (D) é necessário observar intervalo de 30 minutos entre a alimentação (inclusive leite materno) e a administração da vacina oral rotavírus humano.
- (E) a sala de vacinação é classificada como área crítica e deve ser destinada exclusivamente à administração dos imunobiológicos.

### QUESTÃO 23

Segundo Brunner e Suddarth (2014), sobre a anemia falciforme é correto afirmar que:

- (A) a crise falciforme é indolor e resulta da hipóxia tecidual e necrose.
- (B) os pacientes com anemia falciforme são habitualmente diagnosticados na idade adulta.
- (C) o paciente com anemia falciforme apresenta hematócrito elevado e células afoiçadas no esfregaço.
- (D) dor abdominal, febre, sinais de infecção e fraqueza são sinais e sintomas de complicações da anemia falciforme.
- (E) a crise de sequestro resulta de infecção pelo parvovírus humano.

#### QUESTÃO 24

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada nº222/2018, a definição “distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos” está relacionada a qual ação de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde?

- (A) Destinação final ambientalmente adequada.
- (B) Disposição final ambientalmente adequada.
- (C) Manejo dos resíduos de serviço de saúde.
- (D) Sala de utilidades.
- (E) Compostagem.

#### QUESTÃO 25

De acordo com a Instrução Normativa Referente ao Calendário Nacional de Vacinação (2020), é correto afirmar que:

- (A) crianças vacinadas com a BCG, na faixa etária preconizada, que não apresentam cicatriz vacinal necessitam ser revacinadas.
- (B) se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a administração da vacina rotavírus humano (VRH) deve-se repetir a dose.
- (C) pessoas de 5 a 59 anos de idade que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação contra febre amarela devem receber duas doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias.
- (D) a vacina tríplice viral é contraindicada para gestantes e crianças abaixo dos 6 meses de idade, exceto em situações de surto de sarampo ou rubéola.
- (E) a vacina DTP (difteria, tétano e pertussis) é contraindicada para crianças a partir de 7 anos de idade.

#### QUESTÃO 26

De acordo com Potter e Perry (2017), os opioides são prescritos para dores moderadas a intensas. Assinale a opção que apresenta efeitos colaterais associados ao uso prolongado desses medicamentos.

- (A) Constipação intestinal e enurese.
- (B) Diminuição da libido e nistagmo.
- (C) Prurido e Síndrome de Cushing.
- (D) Tremor essencial e enurese.
- (E) Diminuição da libido e padrões de sono alterados.

#### QUESTÃO 27

O Caderno de Assistência Segura: uma reflexão teórica aplicada à prática (2017) traz os principais conceitos da Classificação Internacional de Segurança do Paciente, suas definições e termos. Assim, em relação à classificação dos incidentes, qual a definição de *near miss*?

- (A) Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano.
- (B) Incidente que atingiu o paciente de forma intencional.
- (C) Incidente que não atingiu o paciente.
- (D) Uma ação ou circunstância que resulta na descoberta de um incidente.
- (E) Incidente que resulta em dano ao paciente.

#### QUESTÃO 28

Segundo Brunner e Suddarth (2014), as complicações da Diálise Peritoneal são mínimas, entretanto quando não tratadas podem ter graves consequências. São complicações agudas da Diálise Peritoneal:

- (A) peritonite, extravasamento e sangramento.
- (B) hipertrigliceridemia, dor lombar e anorexia.
- (C) peritonite, extravasamento e hipertrigliceridemia.
- (D) hipertrigliceridemia, hérnia abdominal e anorexia.
- (E) peritonite, sangramento e hérnia abdominal.

#### QUESTÃO 29

Segundo Brunner e Suddarth (2014), a gasometria arterial de um paciente revelou um pH de 7,5, a pressão parcial de CO<sub>2</sub> (PaCO<sub>2</sub>) de 25mmHg e o bicarbonato (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>) de 24mEq/l. De acordo com os valores apresentados, esse paciente apresenta a condição clínica de:

- (A) ausência de distúrbio acidobásico.
- (B) acidose metabólica.
- (C) acidose respiratória.
- (D) alcalose metabólica.
- (E) alcalose respiratória.

### QUESTÃO 30

São objetivos específicos e estratégias da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (2011), EXCETO:

- (A) ampliar e qualificar a atenção ao planejamento familiar, incluindo a assistência à infertilidade.
- (B) garantir a oferta de ácido fólico e sulfato ferroso apenas para as gestantes de alto risco.
- (C) organizar rede de serviços de atenção obstétrica e neonatal, garantindo atendimento à gestante de alto risco e em situações de urgência/emergência.
- (D) promover ações preventivas em relação à violência doméstica e sexual.
- (E) garantir o cumprimento da Lei Federal que prevê a cirurgia de reconstrução mamária nas mulheres que realizaram mastectomia.

### QUESTÃO 31

De acordo com o Caderno de Atenção Básica: Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica - Diabetes Mellitus (2013), a prevenção, por meio do exame frequente dos pés de pessoas com Diabetes Mellitus (DM), pelo enfermeiro da Atenção Básica, é de vital importância para a redução de complicações. Assinale a opção que apresenta cuidados essenciais para lesões ulceradas nos pés de pessoas com DM.

- (A) Postergar o desbridamento, em caso de crosta ou calosidades, e não apoiar o pé no chão.
- (B) Evitar o uso de esparadrapo diretamente sobre a pele e realizar limpeza diária com solução fisiológica 0,9% gelada.
- (C) Coletar material para cultura nos ferimentos infectados (base da úlcera) e utilizar solução furacinada.
- (D) Usar preparados que contenham permanganato de potássio e realizar limpeza diária com solução fisiológica 0,9% aquecida.
- (E) Orientar repouso com o membro inferior afetado ligeiramente elevado e não apoiar o pé no chão.

### QUESTÃO 32

De acordo com o Caderno de Atenção Básica: Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica - Hipertensão Arterial Sistêmica (2013), assinale a opção correta.

- (A) A pressão diastólica corresponde ao valor em que começam a ser ouvidos os ruídos de Korotkoff.
- (B) A constatação de um valor elevado em apenas um dia, em mais de uma medida, é suficiente para estabelecer o diagnóstico de hipertensão.
- (C) A pressão diastólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos, no caso em que se ouvirem os batimentos até zero, considerar o abafamento do som.
- (D) A partir de 130 mmHg de pressão sistólica e de 90 mmHg de pressão diastólica, o risco para eventos cardiovasculares aumenta de forma constante.
- (E) Para a aferição da pressão arterial, o paciente deve estar sentado, com o braço abaixo da altura do precórdio.

### QUESTÃO 33

Segundo Campos (2016), assinale a opção que apresenta os fatores de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão, avaliados na escala de Braden.

- (A) Umidade, atividade e localização da dor.
- (B) Saturação de O<sub>2</sub>, nutrição e mobilidade.
- (C) Fricção e cisalhamento, percepção sensorial e nível de consciência.
- (D) Resposta motora, percepção sensorial e nutrição.
- (E) Mobilidade, umidade e atividade.

### QUESTÃO 34

Segundo Araújo (2014), a icterícia fisiológica do recém-nascido caracteriza-se pelo aumento progressivo da concentração sérica de bilirrubina indireta, ocorrendo em que período após o nascimento?

- (A) 12 a 24h
- (B) 24 a 36h
- (C) 36 a 48h
- (D) 48 a 72h
- (E) 72 a 96h

### QUESTÃO 35

Segundo o Caderno de Atenção Básica: Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica - Diabetes Mellitus (2013), assinale a opção INCORRETA sobre as recomendações para o armazenamento, transporte, preparo e aplicação da insulina.

- (A) Em caso de combinação de dois tipos de insulina, aspirar antes a insulina de ação intermediária (NPH) para que o frasco não se contamine com a insulina de ação curta (regular).
- (B) Esperar cinco segundos após a aplicação antes de se retirar a agulha do subcutâneo, para garantir injeção de toda a dose de insulina.
- (C) Após aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C, ou também em refrigeração, entre 2°C a 8°C.
- (D) Apesar de serem descartáveis, as seringas com agulhas acopladas podem ser reutilizadas pela própria pessoa, desde que a agulha e a capa protetora não tenham sido contaminadas.
- (E) Não é necessário puxar o êmbolo para verificar a presença de sangue.

### QUESTÃO 36

Segundo Kurcgan (2010), o dimensionamento de pessoal de enfermagem é um instrumento auxiliar no planejamento e avaliação do serviço de enfermagem. Marque a opção que apresenta algumas variáveis para a aplicação desse método.

- (A) Tempo efetivo de trabalho e nível técnico dos profissionais.
- (B) Índice de segurança técnica e carga média de trabalho na unidade.
- (C) Absenteísmo e nível técnico dos profissionais.
- (D) Índice de segurança técnica e custo efetivo.
- (E) Tempo efetivo de trabalho e centro de custos.

### QUESTÃO 37

De acordo com o Manual Técnico Pré-natal e Puerpério: Atenção Qualificada e Humanizada (2006), coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e assinale a opção correta.

- ( ) O retorno da mulher e do recém-nascido ao serviço de saúde, de 7 a 10 dias após o parto, deve ser incentivado desde o pré-natal, na maternidade e pelos agentes comunitários de saúde na visita domiciliar.
- ( ) O abortamento é a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas de gestação ou quando o concepto pesa menos de 500g. O abortamento é dito precoce quando ocorre até a 13ª semana e tardio quando ocorre entre a 13ª e a 22ª semanas.
- ( ) A pré-eclâmpsia geralmente ocorre após a 20ª semana de gestação, classicamente pelo desenvolvimento gradual de hipertensão, proteinúria e convulsões tônico-clônicas.
- ( ) Conceitua-se aminiorrexe prematura quando a rotura da bolsa se dá antes de instalado o trabalho de parto.

- (A) (V)(V)(F)(V)
- (B) (V)(F)(V)(F)
- (C) (F)(V)(F)(V)
- (D) (F)(F)(F)(V)
- (E) (V)(V)(F)(F)

### QUESTÃO 38

Sobre hanseníase, de acordo com o Guia de bolso - Doenças Infecciosas e Parasitárias (2010), é correto afirmar que:

- (A) é uma doença granulomatosa, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*.
- (B) a transmissão ocorre por compartilhamento de objetos, sendo considerada transmissão de contato.
- (C) o esquema terapêutico utilizado para Paucibacilar é uma associação de Rifampicina, Daptomicina e Clofazimina.
- (D) a gravidez e o aleitamento materno contraindicam o tratamento da Hanseníase.
- (E) em mulheres na idade reprodutiva, deve-se atentar ao fato de que a Rifampicina pode interagir com anticoncepcionais orais, diminuindo sua ação.



### QUESTÃO 39

Segundo Brunner e Suddarth (2014), a intubação gastrointestinal é a inserção de uma sonda flexível dentro do estômago, duodeno ou jejuno. A sonda pode ser inserida através da boca, nariz ou da parede abdominal. Com relação à intubação gastrointestinal, assinale a opção correta.

- (A) A intubação gastrointestinal pode ser realizada para comprimir um sítio hemorrágico.
- (B) As sondas nasoentéricas são usadas para descompressão gástrica e remoção de líquido e gás.
- (C) As sondas devem ser inseridas com o paciente em decúbito dorsal.
- (D) A sonda de Sengstaken-Blackemore é usada para diagnosticar distúrbios da motilidade gastrointestinal.
- (E) A sonda orogástrica é uma sonda de fino calibre, inserida através da boca, para a remoção de conteúdo gástrico.

### QUESTÃO 40

Segundo Townsend (2002), com relação à etapa de implementação do processo de enfermagem na enfermagem psiquiátrica/ de saúde mental, qual a intervenção em que a enfermeira psiquiátrica proporciona, estrutura e mantém um ambiente terapêutico em colaboração com o cliente e outros prestadores de cuidados de saúde?

- (A) Terapia do meio.
- (B) Aconselhamento.
- (C) Atividades de autocuidado.
- (D) Instruções de saúde.
- (E) Controle de casos.

### QUESTÃO 41

Um paciente adulto deu entrada na emergência apresentando queimadura em membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo. Segundo Brunner e Suddarth (2014), utilizando a Regra dos Noves, qual o percentual estimado da área de superfície corporal total atingida?

- (A) 9%
- (B) 18%
- (C) 27%
- (D) 36%
- (E) 45%

### QUESTÃO 42

De acordo com o Caderno de Atenção Básica: Controle dos Cânceres do Colo de Útero e de Mama (2013), assinale a opção que apresenta o procedimento de coleta do material para exame citopatológico do colo do útero.

- (A) O profissional de saúde deve lavar as mãos com água e sabão, secá-las com papel toalha e calçar luvas estéreis.
- (B) A coleta do material deve ser realizada na ectocérvice e na endocérvice em lâminas separadas, para que não haja mistura dos materiais.
- (C) Para coleta na endocérvice, utilizar a escova endocervical. Recolher o material introduzindo a escova endocervical e fazer um movimento giratório de 360°.
- (D) Estender o material sobre a lâmina de maneira firme para a obtenção de um esfregaço uniformemente distribuído.
- (E) Para coleta na ectocérvice utiliza-se espátula de Ayre e deve-se encaixar a ponta mais longa da espátula no orifício interno do colo, apoiando-a firmemente, fazendo uma raspagem em movimento rotativo de 360°.

### QUESTÃO 43

A Síndrome de Down geralmente pode ser diagnosticada somente através de manifestações clínicas. De acordo com Wong (2014), assinale a opção que apresenta algumas manifestações clínicas da Síndrome de Down.

- (A) Prega transversal na palma das mãos, quinto dedo encurvado e dobra epicantal.
- (B) Caixa torácica pequena, nariz grande e hipertonia muscular.
- (C) Pescoço longo, língua protusa e braquicefalia.
- (D) Orelhas grandes, quinto dedo encurvado e hipertonia muscular.
- (E) Hipotonia muscular, dobra epicantal e pescoço longo.

#### QUESTÃO 44

Segundo Brunner e Suddarth (2014), cada componente do sangue precisa ser processado e armazenado de modo diferente, para maximizar a longevidade das células e fatores nele contidos. Sobre o armazenamento e conservação do sangue e hemoderivados, assinale a opção correta.

- (A) As papas de hemácias são armazenadas a 4°C e podem ser conservadas por até 42 dias.
- (B) As plaquetas devem ser imediatamente congeladas e podem ser conservadas por até 1 ano.
- (C) O plasma deve ser armazenado entre 2°C e 8°C e pode ser conservado por até 1 ano.
- (D) As papas de hemácias são congeladas e podem ser armazenadas por até 1 ano.
- (E) As plaquetas são armazenadas em temperatura ambiente e podem ser conservadas por até 42 dias.

#### QUESTÃO 45

Segundo Brunner e Suddarth (2014), as complicações da fratura podem ser agudas ou crônicas. A complicação imediata que envolve uma diminuição súbita e intensa no fluxo sanguíneo para os tecidos distais a uma área de lesão é chamada de:

- (A) choque.
- (B) tromboembolia venosa.
- (C) síndrome da embolia gordurosa.
- (D) necrose avascular do osso.
- (E) síndrome compartimental.

#### QUESTÃO 46

Segundo Brunner e Suddarth (2014), o choque é uma condição grave e configura-se por perfusão inadequada, que pode resultar em morte celular. Assim, correlacione os tipos de choque com suas características e assinale a opção correta.

##### TIPOS

- I- Choque hipovolêmico
- II- Choque cardiogênico
- III- Choque séptico
- IV- Choque neurogênico

##### CARACTERÍSTICAS

- ( ) Ocorre como consequência de perda do equilíbrio entre as estimulações parassimpática e simpática.
- ( ) Presença de taquicardia, febre, pele quente e ruborizada.
- ( ) Tem como etiologias possíveis: infarto agudo do miocárdio, tamponamento cardíaco e arritmias cardíacas.
- ( ) Presença de taquicardia, pele fria e pegajosa, sudorese e palidez.

- (A) (IV) (III) (II) (I)
- (B) (II) (I) (IV) (III)
- (C) (IV) (II) (III) (I)
- (D) (III) (I) (II) (IV)
- (E) (IV) (I) (II) (III)

#### QUESTÃO 47

De acordo com Wong (2014), as convulsões são distúrbios neurológicos pediátricos muito comuns. Sobre os cuidados de enfermagem adotados nos casos de convulsão hospitalar, é correto afirmar que:

- (A) a criança deve ser contida durante um episódio de convulsão.
- (B) uma cânula de Guedel deve ser inserida na cavidade oral, no momento da convulsão.
- (C) a colocação da criança em decúbito lateral ajuda a manter as vias aéreas pérvias.
- (D) deve-se evitar falar com a família sobre o ocorrido, após um episódio de convulsão, a fim de não assustá-la.
- (E) se a criança está sob o risco de cair, deve ser colocada sentada numa cadeira fixa.

### QUESTÃO 48

Segundo Wong (2014), a fototerapia consiste na exposição da pele do recém-nascido a uma fonte especial de luz. Sobre esse método terapêutico, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A luz promove a excreção de bilirrubina através de fotoisomerização.
- (B) Os olhos do recém-nascido devem estar cobertos com máscara opaca.
- (C) As pálpebras do recém-nascido devem ser fechadas antes do uso de máscaras.
- (D) O tórax do recém-nascido deve ser protegido da exposição direta à luz.
- (E) A temperatura corporal do recém-nascido deve ser monitorada precisamente.

### QUESTÃO 49

De acordo com o Caderno de Atenção Básica: Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica - Hipertensão Arterial Sistêmica (2013), são evidências de doença cardiovascular ou repercussão em órgão-alvo em um paciente com Hipertensão Arterial Sistêmica:

- (A) insuficiência cardíaca e pancreatite crônica.
- (B) nefropatia e doença arterial periférica.
- (C) angina de peito e cetoacidose.
- (D) síndrome hiperosmolar hiperglicêmica e nefropatia.
- (E) hipertrofia ventricular esquerda e insuficiência hepática.

### QUESTÃO 50

A estomia é um procedimento cirúrgico que consiste em exteriorizar um segmento corpóreo através de um orifício externo. Dessa forma, segundo Campos (2016), qual complicação precoce está relacionada ao estoma?

- (A) Estenose.
- (B) Prolapso.
- (C) Necrose.
- (D) Retração.
- (E) Descolamento mucocutâneo.

# RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

|    |  |
|----|--|
| 1  |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |

