

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CORPO
DE SAÚDE DA MARINHA / PS-CSM/2011)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

- 1) A avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem, verificada através das anotações de enfermagem no prontuário dos pacientes e/ou das próprias condições deste, denomina-se:
- (A) serviço de enfermagem.
 - (B) auditoria em enfermagem.
 - (C) supervisão em enfermagem.
 - (D) planejamento da assistência de enfermagem.
 - (E) educação continuada no serviço de enfermagem.
- 2) Muitas mulheres iniciam o acompanhamento pré-natal já ultrapassadas as primeiras 8 a 12 semanas de gestação. Esse período de intensa organogênese fetal, é fundamental para estabelecerem-se as bases do acompanhamento adequado. A maioria dos fatores que influenciam, negativamente, o binômio materno-fetal tem sua gênese no seguinte período:
- (A) primeiro trimestre gestacional.
 - (B) segundo trimestre gestacional.
 - (C) terceiro trimestre gestacional.
 - (D) pré-concepcional.
 - (E) pré-parto.
- 3) Assinale a opção que NÃO apresenta fatores de risco para a embolia pulmonar.
- (A) Imobilização prolongada e lesão raquimedular.
 - (B) Tromboflebite e doença vascular.
 - (C) Tumor pancreático e insuficiência cardíaca.
 - (D) Fratura de quadril e diabetes.
 - (E) Tabagismo e tuberculose.
- 4) O choque hemorrágico é uma das maiores causas de mortalidade materna, principalmente nos países em desenvolvimento. Sendo a hemorragia interna mais difícil de ser avaliada, quais os sinais e sintomas clínicos encontrados na instalação do choque hemorrágico moderado?
- (A) Hipotensão, palidez cutânea, fraqueza e poliúria.
 - (B) Hipertensão, fraqueza, poliúria e palidez cutânea.
 - (C) Hipertensão, fraqueza, pele fria e oligúria.
 - (D) Hipotensão, oligúria, confusão mental e alterações no eletrocardiograma.
 - (E) Queda da pressão sistólica, taquicardia, sensação de sede e oligúria.

- 5) O distrúrbio amnéstico alcoólico e a encefalopatia alcoólica são consequências tardias do consumo de álcool em grande quantidade e por vários anos. Uma enfermeira diante de um paciente com distrúrbio amnéstico alcoólico é correto afirmar que ele possui:
- (A) déficit acentuado da memória recente.
 - (B) aumento acentuado da memória recente.
 - (C) cognição aumentada.
 - (D) transtorno psicótico leve.
 - (E) cognição leve.
- 6) Existem várias formas de tuberculose, a mais frequente e mais contagiosa é a pulmonar. Um paciente pulmonar bacilífero, se não tratado, em um ano pode infectar várias pessoas. Uma vez iniciado o tratamento, o paciente, normalmente, não transmitirá mais a doença em no máximo quantos dias?
- (A) 10
 - (B) 15
 - (C) 20
 - (D) 25
 - (E) 30
- 7) O planejamento e o processo decisório como instrumento do processo de trabalho gerencial na prática do enfermeiro foi composto por quatro etapas pré-definidas, com tarefas precisas e limites cronológicos. Assinale a opção que apresenta essas etapas na sequência correta.
- (A) Descrição da situação, implementação, elaboração da programação e avaliação.
 - (B) Avaliação, descrição da situação, elaboração da programação e implementação.
 - (C) Descrição da situação, elaboração da programação, implementação e avaliação.
 - (D) Implementação, elaboração da programação, descrição da situação e avaliação.
 - (E) Descrição da situação, avaliação, elaboração da programação e implementação.

- 8) Dentre os distúrbios metabólicos no recém-nascido, qual constitui uma das alterações de melhor prognóstico, por não ter sido estabelecida uma relação direta entre a sua presença e a lesão no sistema nervoso central?
- (A) Hipoglicemia.
 - (B) Hiperglicemia.
 - (C) Hipocalcemia.
 - (D) Hipermagnesemia.
 - (E) Hipomagnesemia.
- 9) O choque afeta todos os sistemas orgânicos podendo desenvolver-se de maneira rápida ou lenta. Em relação aos tipos de choque, assinale a opção correta.
- (A) o choque séptico e o neurogênico são tipos de choque circulatórios.
 - (B) a imunossupressão é um fator de risco para o choque neurogênico.
 - (C) no choque cardiogênico a contratilidade está aumentada.
 - (D) no choque hipovolêmico o volume intravascular está aumentado.
 - (E) o tamponamento cardíaco é um exemplo de choque cardiogênico coronário.
- 10) O bloqueio átrio ventricular que apresenta uma falha súbita de condução de um impulso atrial aos ventrículos, sem aumentos progressivos no tempo de condução de ondas P consecutivas é denominado de bloqueio de
- (A) 1º grau.
 - (B) 2º grau tipo I.
 - (C) 2º grau tipo II.
 - (D) alto grau.
 - (E) 3º grau.
- 11) Dentre os fatores psicológicos predisponentes para o uso abusivo de substâncias é correto destacar:
- (A) a tendência familiar.
 - (B) a autoestima baixa.
 - (C) o metabolismo alterado.
 - (D) a etnicidade.
 - (E) o embotamento afetivo.

- 12) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo em relação aos tipos de auditoria em enfermagem, e assinale a opção que apresenta a sequência correta.
- () A auditoria retrospectiva é feita após a alta do paciente.
 - () A auditoria operacional é feita enquanto o paciente está internado.
 - () A auditoria tem como vantagem maior profundidade no trabalho.
 - () A auditoria não tem como objetivo primordial a melhoria dos registros de enfermagem.
 - () A auditoria de enfermagem limita-se à avaliação do cuidado de enfermagem prestado ao paciente.
- (A) (V) (V) (F) (V) (F)
(B) (F) (V) (F) (V) (V)
(C) (V) (V) (F) (F) (F)
(D) (V) (V) (F) (F) (V)
(E) (F) (F) (V) (F) (V)
- 13) As úlceras por pressão são lesões decorrentes de hipóxia celular, que levam à necrose tecidual. No estágio II, essas úlceras caracterizam-se por:
- (A) presença de drenagem de exudato e abrasão.
 - (B) eritema e edema discreto.
 - (C) perda total de pele e do tecido subcutâneo.
 - (D) bolhas e perda parcial do epitélio.
 - (E) cratera pouco profunda e infecção.
- 14) Segundo MEEKER (1997), a cicatrização de qualquer ferimento é uma resposta complexa do tecido com solução de continuidade causada por uma agressão. Assinale a opção que apresenta a causa mais comum de retardo na cicatrização do ferimento em pacientes no pós-operatório.
- (A) Condição imunológica.
 - (B) Infecção local.
 - (C) Idade do paciente.
 - (D) Diabetes.
 - (E) Contaminação exógena.

- 15) A Resolução CONAMA nº358/2005 considera os restos de sangue, fezes, urina e saliva, que permanecem nos tubos de coleta após a retirada do material necessário à realização de investigação, como:
- (A) líquidos corpóreos.
 - (B) redução de carga microbiana.
 - (C) sobras de amostras.
 - (D) Príons.
 - (E) agentes de classe de risco 4.
- 16) A Lei 7.498, de 25/06/1986, e o Decreto 94.406, de 08/06/1987, que versam sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, determinam como atividade privativa do enfermeiro:
- (A) a realização de cuidados de enfermagem de menor complexidade.
 - (B) a consultoria em procedimentos médicos.
 - (C) a execução de parto sem distórcia.
 - (D) a prescrição de medicamentos.
 - (E) a assistência exclusiva ao idoso.
- 17) Uma ferida no abdômem causada por arma de fogo e uma apendicectomia não perfurada são classificadas, respectivamente, como ferida:
- (A) contaminada e ferida infectada.
 - (B) infectada e ferida contaminada.
 - (C) contaminada e ferida aberta contaminada.
 - (D) contaminada e ferida aberta.
 - (E) aberta contaminada e ferida infectada.
- 18) A educação continuada está inserida na maioria das organizações com o objetivo de capacitar seus profissionais por meio de uma educação reflexiva e participativa. Assinale a opção que apresenta a finalidade da educação continuada.
- (A) Participar do serviço de ouvidoria.
 - (B) Elaborar programas de pesquisa científica.
 - (C) Manter protocolos de assistência atualizados.
 - (D) Coordenar atividades de residência em enfermagem.
 - (E) Coordenar os programas de treinamento.

- 19) Os eventos adversos pós-vacina contra a hepatite B, quando se fazem presentes, geralmente são leves e transitórios, com duração menor que vinte e quatro horas. Assinale a opção que apresenta um evento adverso pós-vacina contra a hepatite B.
- (A) Enduração local.
 - (B) Reação lupoide.
 - (C) Reação queloide.
 - (D) Abscessos cutâneos frios.
 - (E) Úlcera com diâmetro maior que um centímetro.
- 20) Segundo SCHECHTER (1998), a grande dificuldade no diagnóstico da tuberculose na criança decorre do fato de que, na maioria dos casos, é difícil a comprovação pelo achado do Bacilo de KOCH nas secreções. As principais razões da negatividade desses exames são o pequeno número de bacilos nas lesões da infância e a dificuldade de obter-se material adequado do aparelho respiratório, por isso, utiliza-se para confirmação do diagnóstico o seguinte material biológico:
- (A) sangue.
 - (B) líquido.
 - (C) saliva.
 - (D) suor.
 - (E) lavado gástrico.
- 21) De um modo geral, o recém-nascido com distúrbio de trocas gasosas, apresenta os seguintes sinais de insuficiência respiratória:
- (A) retrações abdominais e dispneia leve.
 - (B) diminuição da perfusão periférica e hipotensão.
 - (C) apneia e atonia.
 - (D) eupneia e hipotonia.
 - (E) sono profundo e retrações costais leves.

- 22) Em obstetrícia, a coagulação intravascular disseminada pode se apresentar de duas formas clínicas, aguda ou crônica, sendo estas respectivamente:
- (A) descolamento prematuro da placenta e pré-eclâmpsia.
 - (B) diabetes gestacional e doença hipertensiva específica da gestação.
 - (C) diabetes gestacional e descolamento prematuro da placenta.
 - (D) doença hipertensiva específica da gestação e embolia amniótica.
 - (E) descolamento prematuro da placenta e eclâmpsia.
- 23) A cetoacidose diabética, conforme descrito por BRUNNER (2005), é causada por uma ausência ou quantidade acentuadamente inadequada de insulina. Quais os três principais aspectos clínicos da cetoacidose diabética?
- (A) Hiperglicemia, desidratação e acidose.
 - (B) Hipoglicemia, polidipsia e poliúria.
 - (C) Hiperglicemia, perda de peso e enurese.
 - (D) Hiperglicemia, fadiga e perda acentuada de peso.
 - (E) Hipoglicemia, hálito cetônico e poliúria.
- 24) Segundo WOODS (2005), certos marcadores séricos se elevam no paciente após um infarto agudo do miocárdio. O marcador que se eleva de 6 a 8 horas após o início da isquemia denomina-se
- (A) CK.
 - (B) Desidrogenase látea.
 - (C) Mioglobina.
 - (D) CK MB.
 - (E) Troponina.
- 25) Propiciar a interação afetiva entre pais e filho; estimular os pais a participarem nos cuidados prestados ao filho, valorizando suas experiências anteriores e propondo mudanças de atitudes que possam trazer maiores benefícios aos pais e à criança; possibilitar o acompanhamento da amamentação sem rigidez de horários visando esclarecer as dúvidas da mãe e incentivá-la nos momentos de insegurança, são objetivos
- (A) do atendimento em grupo.
 - (B) do planejamento da assistência de enfermagem.
 - (C) do sistema de alojamento conjunto.
 - (D) da manutenção da integridade pessoal e social.
 - (E) do processo de ações multidisciplinares.

Prova : Amarela
Profissão : ENFERMAGEM

Concurso : PS-CSM/11

- 26) O Retinoblastoma é um tumor maligno congênito raro, que pode apresentar-se ao nascimento ou durante os dois primeiros anos de vida. Uma das metas de enfermagem mais importante é ter um alto índice de suspeita desta malignidade, observando as manifestações clínicas. Qual dos sinais abaixo NÃO é uma manifestação clínica desta patologia?
- (A) Reflexo do olho de gato.
 - (B) Estrabismo.
 - (C) Olho vermelho, doloroso.
 - (D) cegueira.
 - (E) Obstrução da glândula lacrimal.
- 27) O interesse pela prescrição de medicamentos por enfermeiros vem crescendo, em muitos países, objetivando:
- (A) diminuir o tempo de remarcação de consultas.
 - (B) melhorar o relacionamento entre os pacientes.
 - (C) diminuir a quantidade de médicos.
 - (D) aumentar a credibilidade profissional.
 - (E) redistribuir o trabalho entre profissionais capacitados.
- 28) De acordo com WOODS (2005), as arritmias cardíacas resultam de formação de impulso anormal, condução anormal de impulso ou dos dois mecanismos juntos. A arritmia cardíaca caracterizada por uma frequência atrial de 120 a 250 batimentos por minutos, ritmo regular, ondas P ectópicas, intervalo PR mais curto ou mais longo do que o normal e condução frequentemente normal pelo nó AV e nos ventrículos, denomina-se:
- (A) marcapasso atrial migratório.
 - (B) taquicardia multifocal atrial.
 - (C) flutter atrial.
 - (D) taquicardia atrial paroxística.
 - (E) fibrilação atrial.
- 29) A demência constitui uma Síndrome na qual estão comprometidas funções intelectuais como a memória, a linguagem, a capacidade do conhecimento, do reconhecimento e da personalidade. No caso do idoso, a forma mais comum de demência é:
- (A) acidente vascular cerebral hemorrágico.
 - (B) esquizofrenia.
 - (C) depressão.
 - (D) doença de Alzheimer.
 - (E) transtorno bipolar do humor.

- 30) Segundo a Resolução do COFEN 311/2007, na Seção I que dispõe sobre as relações com a pessoa, família e coletividade, assinale a opção que apresenta um direito do enfermeiro.
- (A) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica.
 - (B) Exercer a enfermagem com autonomia.
 - (C) Participar da prática multiprofissional.
 - (D) Recusar-se a revelar informações confidenciais.
 - (E) Participar de atividades de ensino.
- 31) A principal meta no período pós-operatório imediato consiste em evitar a hipóxia e a hipercapnia. Ambos os sinais podem ocorrer se o paciente apresentar:
- (A) oligúria.
 - (B) obstrução de via aérea.
 - (C) débito cardíaco reduzido.
 - (D) alto risco para alteração na temperatura corporal.
 - (E) disritmias.
- 32) Segundo SCHECHTER (1998), a pneumonia hospitalar é definida como infecção do parênquima pulmonar que ocorre após o período de internação hospitalar superior a:
- (A) 12h
 - (B) 24h
 - (C) 48h
 - (D) 60h
 - (E) 72h
- 33) A abordagem multiprofissional é de fundamental importância no tratamento da hipertensão e na prevenção das complicações crônicas. Dentre as ações comuns à equipe multiprofissional, destacam-se as seguintes, EXCETO:
- (A) ações educativas, com ênfase em mudanças do estilo de vida.
 - (B) implementação de medidas secundárias.
 - (C) encaminhamento a outros profissionais, quando indicado.
 - (D) ações assistências individuais e em grupo.
 - (E) treinamento de profissionais.

34) Os produtos compostos por microorganismos vivos atenuados constituem material biológico infectante, portanto há a necessidade de serem autoclavados, durante 15 minutos, a uma temperatura entre 121°C e 127°C antes de serem desprezados. Os imunobiológicos infectantes que recebem tratamento antes de serem inutilizados são: vacina contra

- (A) a hepatite B e vacina contra o sarampo.
- (B) a febre amarela e vacina contra a tuberculose.
- (C) a tuberculose e vacina contra a hepatite B.
- (D) o tétano e vacina contra a hepatite B.
- (E) o sarampo e vacina contra a febre amarela.

35) Correlacione os fatores de risco da hemorragia às principais complicações que podem levar à evolução desfavorável do período puerperal, e assinale a opção correta.

FATORES DE RISCO	PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES:
HEMORRAGIA:	
I - Multiparidade	() Macrossomia fetal.
II - Gestação Gemelar	() Distúrbios de coagulação.
III- Doença Hipertensiva	() Atonia uterina.
Específica da Gestação	() Retenção placentária.
IV - Diabetes	() Aumento da área de inserção placentária.
V - Parto cesáreo anterior	() Prolapso de cordão umbilical.
(A) (III) (IV) (-) (I) (II) (V)	
(B) (IV) (III) (V) (I) (II) (-)	
(C) (-) (III) (IV) (II) (V) (I)	
(D) (IV) (III) (I) (V) (II) (-)	
(E) (IV) (V) (III) (I) (II) (-)	

36) Assinale a opção que apresenta uma das complicações agudas do diabetes.

- (A) Neuropatia diabética.
- (B) Retinopatia diabética.
- (C) Infarto do miocárdio.
- (D) Síndrome não cetótica hiperosmolar hiperglicêmica.
- (E) Doença renal.

- 37) A reação vacinal com a presença de nódulo local que evolui para pústula, seguida de crosta e úlcera que regride espontaneamente em média entre a quinta e a décima segunda semana, deixando uma pequena cicatriz, é decorrente da vacina contra
- (A) a hepatite B.
 - (B) o sarampo.
 - (C) o haemophilus influenzae do tipo b.
 - (D) a tuberculose.
 - (E) a poliomielite.
- 38) Qual situação caracteriza uma emergência hipertensiva?
- (A) Intoxicação por cocaína ou anfetamina.
 - (B) Angina instável.
 - (C) Pré-eclâmpsia.
 - (D) Edema agudo de pulmão.
 - (E) Transplante renal.
- 39) Segundo WOODS (2005), assinale a opção que apresenta uma complicação precoce após a inserção de marca-passo temporário.
- (A) Hematoma.
 - (B) Pneumotórax.
 - (C) Trombose.
 - (D) Infecção no local de inserção.
 - (E) Endocardite.
- 40) Segundo SCHECHTER (1998), no tratamento do paciente com queimadura, para prevenir a ocorrência de infecção, a balneoterapia deve ser diária. Para esse tratamento que solução deve ser evitada, por inibir a ação da solução de polivinilpirrolidona - iodo e da sulfadiazina de prata?
- (A) Soro fisiológico.
 - (B) Nitrato de prata 0,5%.
 - (C) Acetato de mafenide.
 - (D) Nitrato de cério 4%.
 - (E) Clorexidine degermante.

- 41) Segundo STUART E LARAIA (2002), no cuidado ao paciente psiquiátrico a maior prioridade das intervenções de enfermagem, reside naquelas que protegem o paciente contra o perigo imediato. Baseado nessa afirmativa é correto afirmar que o paciente apresenta um:
- (A) transtorno de personalidade.
 - (B) distúrbio psicótico.
 - (C) transtorno depressivo.
 - (D) comportamento suicida.
 - (E) transtorno bipolar.
- 42) Segundo a Resolução do COFEN 311/2007, assinale a opção que apresenta um princípio fundamental da enfermagem.
- (A) Exercer a profissão com justiça, compromisso, dignidade e competência.
 - (B) Atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde.
 - (C) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito e solidariedade.
 - (D) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais.
 - (E) Proteger a pessoa, a família, a coletividade e seus subordinados.
- 43) A enfermeira que realiza um bom posicionamento do paciente idoso no leito está contribuindo para evitar várias complicações como a contratura em flexão, contratura em extensão e a úlcera de decúbito. A imobilização no leito pode acarretar:
- (A) diminuição da ventilação pulmonar, aumento da osteoporose e diminuição da massa muscular.
 - (B) incontinência urinária, rash cutâneo e diminuição da massa muscular.
 - (C) incontinência fecal, paresia e escara de decúbito.
 - (D) disúria, rash cutâneo e escara de decúbito.
 - (E) nictúria, aumento da osteoporose e paresia.

- 44) Segundo SCHECHTER (1998), em relação à classificação das cirurgias segundo o potencial de contaminação, é correto afirmar que uma cirurgia potencialmente contaminada é aquela onde ocorre:
- (A) procedimento sem trauma penetrante; procedimento limpo com pequena quebra de assepsia; e reoperação em cirurgia limpa.
 - (B) cirurgia com grande quebra de assepsia; bilecultura positiva; e urinocultura positiva.
 - (C) cirurgia com grande quebra de assepsia; cirurgia colorretal e com presença de inflamação sem pus.
 - (D) procedimento envolvendo trauma penetrante, ferida contaminada, e tecido isquêmico.
 - (E) procedimento sem trauma penetrante, sem quebra de assepsia, em condições ideais, e não envolvendo o trato genitourinário.
- 45) Um número crescente e significativo de neoplasias é atribuído, em parte, a fatores relacionados a enfermidades de transmissão sexual. Assinale a opção que apresenta uma dessas neoplasias.
- (A) Síndrome de COWDEN.
 - (B) Carcinoma hepatocelular.
 - (C) Carcinoma de mama.
 - (D) Neurofibromatose do tipo I.
 - (E) Carcinoma colorretal.
- 46) Segundo KAPLAN (2007), o tipo de esquizofrenia que se caracteriza por uma perturbação acentuada da função motora, rigidez, posturas bizarras, estereotípicas e maneirismos é denominado de esquizofrenia
- (A) paranoide.
 - (B) indiferenciada.
 - (C) residual.
 - (D) desorganizada.
 - (E) catatônica.

- 47) Os resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente são classificados como resíduos do grupo:
- (A) B
 - (B) A-3
 - (C) A-4
 - (D) C
 - (E) D
- 48) Segundo BARROS (2002), NÃO é uma prática recomendada para uma amamentação bem sucedida:
- (A) orientar a puérpera a proceder à higiene das mãos, com água e sabão, antes de amamentar.
 - (B) realizar a higiene dos mamilos, com água e sabão, antes e após as mamadas.
 - (C) iniciar a amamentação pela mama que se encontra mais cheia de leite.
 - (D) realizar a prensão correta da região mamilo-areolar objetivando determinar a efetividade da amamentação.
 - (E) espremer o colostro, antes da apojadura, com o objetivo de desobstruir os ductos.
- 49) A resolução ANVISA - RDC 306 de dezembro de 2004, classifica como resíduo do grupo A4 o seguinte material:
- (A) rejeito radioativo.
 - (B) fluido orgânico.
 - (C) material perfuro cortante.
 - (D) bolsa transfusional vazia.
 - (E) peças anatômicas do ser humano.
- 50) O principal fator de risco para desenvolvimento da Doença de Membranas Hialinas é a prematuridade. Outros fatores significantes são:
- (A) diabetes materno e asfixia perinatal.
 - (B) macrossomia fetal e doença hipertensiva específica da gestação.
 - (C) recém-nascido pós-termo e asfixia perinatal.
 - (D) pré-eclâmpsia e macrossomia fetal.
 - (E) doença hemolítica e doença hipertensiva específica da gestação.