

**MARINHA DO BRASIL**  
**DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA**

*(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO  
QUADRO DE APOIO À SAÚDE DO CORPO DE SAÚDE  
DA MARINHA - CP-CSM-S/2018)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**FONOAUDIOLOGIA**

### QUESTÃO 1

Um paciente foi encaminhado pela Clínica de Neurologia, com relato de comprometimento na expressão oral. Na avaliação fonoaudiológica, observou-se ocorrência de estereotipias, parafasias fonéticas, redução e agramatismo na fala espontânea e na repetição, com compreensão preservada. É correto afirmar que esse quadro se refere a um caso de afasia:

- (A) de Broca.
- (B) de condução.
- (C) de *Wernicke*.
- (D) transcortical sensorial.
- (E) anômica.

### QUESTÃO 2

Um paciente do sexo masculino com 54 anos de idade após acidente vascular cerebral (AVC), apresentou lesão no lóbulo parietal superior e no hemisfério direito. Na avaliação fonoaudiológica da linguagem escrita foram encontradas alterações no grafismo na escrita espontânea e no ditado. Essas informações correspondem à agrafia do tipo:

- (A) espacial.
- (B) pura.
- (C) apráxica.
- (D) fonológica.
- (E) jargonográfica.

### QUESTÃO 3

Um paciente de 35 anos, sexo feminino, comparece à avaliação fonoaudiológica com queixa de dificuldade para emitir sons agudos e disfagia, após tireoidectomia. Assinale a opção que apresenta o segmento de inervação responsável pela, sensibilidade laríngea e ativação do músculo cricótireoideo.

- (A) Laríngeo superior.
- (B) Laríngeo inferior.
- (C) Plexo faríngeo.
- (D) Recorrente.
- (E) Junção mioneural.

### QUESTÃO 4

A escuta crítica da voz e da fala, bem como a observação visual do falante, são recursos indispensáveis para uma boa avaliação. Sobre esse assunto, assinale a opção correta.

- (A) Indivíduos com disфония de base funcional comumente apresentam alterações posturais que predispõem ao deslocamento horizontal da caixa torácica na respiração.
- (B) A movimentação respiratória compatível com o padrão costo-diafrágica-abdominal é aquela em que se observa a elevação dos ombros e do esterno durante as tomadas de ar no processo de fala.
- (C) As provas de emissão de vogais sustentadas /a/, /i/ e /u/ e de fonemas /s/ e /z/ objetivam avaliar a capacidade respiratória e o controle inspiratório, tão importantes para a fala.
- (D) A coordenação pneumofônica adequada ocorre pelo controle de saída de ar na fonação sem que haja o uso do ar de reserva.
- (E) Uma articulação ampla da fala contribui para o desequilíbrio da ressonância e das pressões infra e supraglóticas, sendo necessário esforço vocal para obter uma melhor projeção vocal.

### QUESTÃO 5

Com relação à classificação das disfagias, segundo as fases da deglutição, assinale a opção que apresenta o comprometimento na fase preparatória oral, observada durante a avaliação por videofluoroscopia.

- (A) Perda prematura.
- (B) Estase em valécula.
- (C) Redução da elevação laríngea.
- (D) Redução do contato da língua na faringe.
- (E) Deglutições múltiplas.

### QUESTÃO 6

Demência de curso progressivo, com alucinações visuais precoces que podem preceder alterações cognitivas; com parkinsonismo associado, caracterizado por bradicinesia e rigidez plástica, além de marcada flutuação das alterações cognitivas e comportamentais, são alterações clínicas compatíveis com a:

- (A) demência frontotemporal.
- (B) doença de *Alzheimer*.
- (C) demência com corpos de *Lewy*.
- (D) demência vascular.
- (E) demência parietotemporal.

### QUESTÃO 7

Assinale a opção que apresenta as características da perda auditiva mista, na audiometria tonal liminar, segundo Silman e Silverman (1997) in Boéchat et al (2015).

- (A) Limiares de Via Óssea no limite normal e Via Aérea  $\geq$  25dB.
- (B) Limiares de Via Óssea e Aérea abaixo dos limites de normalidade sem *gap* aéreo ósseo.
- (C) Limiares de Via Óssea abaixo do limite normal e de Via Aérea no limite de normalidade.
- (D) Limiares de Via Óssea com *gap* aéreo ósseo até 10 dB.
- (E) Limiares de Via Óssea  $>15$ dBNA e limiares de Via Aérea com *gap* aéreo ósseo  $\geq$  15 dB.

### QUESTÃO 8

Quanto ao diagnóstico diferencial da dislexia, da dificuldade de aprendizagem, e do distúrbio de aprendizagem, é correto afirmar que:

- (A) a dislexia do desenvolvimento está relacionada às alterações nas habilidades cognitivo-linguísticas e pode ser decorrente de condição social, cultural e emocional.
- (B) o distúrbio de aprendizagem se refere às dificuldades com o conteúdo pedagógico além do ambiente físico e social da escola.
- (C) condições como deficiência mental, sensorial ou motora podem resultar em dificuldade de aprendizagem.
- (D) as manifestações motoras de equilíbrio estático e dinâmico, coordenação apendicular e de tronco-membro complementam o processo avaliativo do distúrbio de aprendizagem.
- (E) o distúrbio de aprendizagem refere-se a um grupo homogêneo restrito às dificuldades com as habilidades de leitura e escrita.

### QUESTÃO 9

Correlacione a localização do tumor na região de cabeça e pescoço às consequências na comunicação e, assinale a opção que apresenta a sequência correta.

#### LOCALIZAÇÃO

- I- Rinofaringe
- II- Maxila
- III- Mandíbula
- IV- Lábios
- V- Soalho da boca

#### CONSEQUÊNCIAS

- ( ) Alteração ressonantal, voz hipernasal e pastosa.
- ( ) Trismo, fala imprecisa, travada.
- ( ) Dificuldade ou distorção de sons labiais e das vogais arredondadas.
- ( ) Alterações nos fonemas com ponto articulatório no palato, voz hipernasal.
- ( ) Dificuldade ou distorção nos sons linguodentais.

- (A) (I) (III) (IV) (II) (V)
- (B) (V) (II) (III) (IV) (I)
- (C) (II) (IV) (I) (V) (III)
- (D) (I) (II) (III) (IV) (V)
- (E) (II) (III) (V) (I) (IV)

### QUESTÃO 10

Em relação aos quadros de autismo, autismo de alto funcionamento e síndrome de *Asperger* é correto afirmar que:

- (A) a hiperlexia está presente no autismo de alto funcionamento.
- (B) a exploração não funcional e perseverativa de objetos é mais acentuada no autismo.
- (C) extremo isolamento e ignorância às pistas ambientais são típicos na síndrome de *Asperger*.
- (D) fala pedante com uso de palavras incomuns à idade e ao nível de desenvolvimento são marcantes no autismo de alto funcionamento.
- (E) preservação de rotinas e comportamento ritualístico são características da síndrome de *Asperger*.

### QUESTÃO 11

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da setença abaixo.

O símbolo  $>$  é recomendado para notação gráfica no audiograma dos limiares de Via Óssea na orelha \_\_\_\_\_.

- (A) não mascarada / direita
- (B) não mascarada / esquerda
- (C) mascarada / direita
- (D) mascarada / esquerda
- (E) mascarada na frente / direita

### QUESTÃO 12

Pacientes com queimaduras que atingem áreas corporais como cabeça, pescoço e tórax podem apresentar alterações oromiofuncionais. Sobre a intervenção nesses pacientes, é correto afirmar que:

- (A) o atendimento fonoaudiológico deve ter início após a alta hospitalar, já que as feridas estarão cicatrizadas.
- (B) o tratamento médico prioriza a reconstrução estética, pois não há como prevenir e minimizar as sequelas funcionais.
- (C) as manobras compressivas em tecido cicatricial e massagens em áreas adjacentes podem ser indicadas na fase aguda, ao término da formação do tecido de granulação.
- (D) a articulação da fala é avaliada de acordo com as possibilidades de movimento orofacial, com a preocupação voltada às alterações fonêmicas/fonológicas.
- (E) crianças devem fazer uso de malha de compressão de forma contínua, inclusive durante as refeições devido aos efeitos do crescimento maxilomandibular.

### QUESTÃO 13

Uma criança do sexo feminino com nove anos de idade, atriz mirim, comparece à avaliação fonoaudiológica apresentando queixas relatadas pela mãe de rouquidão com piora da voz após o uso vocal. Na anamnese, a mãe relata que a criança grita muito e fala em intensidade elevada. O exame otorrinolaringológico evidenciou sinais de refluxo gastroesofágico e presença de lesão de massa nas pregas vocais. No caso descrito, a abordagem fonoaudiológica deve enfatizar:

- (A) a indicação de alimentos para evitar piora do refluxo.
- (B) a repetição sistemática de técnicas tradicionais.
- (C) a remissão da lesão e modificação dos ajustes musculares.
- (D) o repouso vocal regular.
- (E) orientações à família para reavaliação otorrinolaringológica.

### QUESTÃO 14

Com relação às disfluências, assinale a opção INCORRETA.

- (A) As rupturas no fluxo verbal são acontecimentos naturais na fala de qualquer falante.
- (B) A gagueira é uma entidade nosológica com característica unidimensional.
- (C) As crianças podem apresentar período de gagueira no desenvolvimento da linguagem.
- (D) Um atraso ou lentificação na fala pode resultar em interrupções.
- (E) A gagueira é um distúrbio temporal da fala.

### QUESTÃO 15

A interface "saúde coletiva e fonoaudiologia" produz informações epidemiológicas acerca dos distúrbios da comunicação humana e possui os seguintes objetivos, EXCETO:

- (A) registrar e analisar a eficiência e efetividade das ações prestadas para decisões de gestão.
- (B) estudos de validação para verificar a acurácia de instrumentos alternativos em comparação com o padrão ouro.
- (C) identificar grupos mais vulneráveis a fatores de risco pela observação de variações de características como idade e sexo.
- (D) mensurar o impacto de intervenções e programas para avaliação e monitoramento das ações e serviços.
- (E) avaliação clínica de alto grau de precisão e custo para uso em larga escala na população.

### QUESTÃO 16

São consideradas tarefas e/ou estratégias de acesso para a avaliação das habilidades metalinguísticas:

- (A) memória direta de dígitos e manipulação silábica.
- (B) identificação de rimas e leitura de palavras.
- (C) nomeação de figuras e repetição de pseudopalavras.
- (D) aliteração e segmentação silábica e fonêmica.
- (E) ritmo e escrita sob ditado de palavras e dígitos.

### QUESTÃO 17

Correlacione a topologia da lesão ao tipo de disartria e, em seguida, assinale a opção correta.

#### TOPOLOGIA

- I- Neurônio motor superior
- II- Neurônio motor inferior
- III- Sistema extrapiramidal com rigidez
- IV- Sistema extrapiramidal com movimentos involuntários
- V- Cerebelo

#### TIPO

- ( ) Hipocinética.
- ( ) Espástica.
- ( ) Hiperkinética.
- ( ) Flácida.
- ( ) Atáxica.

- (A) (V) (III) (IV) (I) (II)
- (B) (III) (I) (IV) (II) (V)
- (C) (III) (IV) (I) (II) (V)
- (D) (IV) (I) (V) (III) (II)
- (E) (V) (III) (I) (II) (IV)

### QUESTÃO 18

Assinale a opção que apresenta o nervo cuja raiz motora transita dentro da glândula parótida, após deixar o forame estilomastoideo divide-se em diversos ramos, suprimindo o músculo estilo-hioideo e o ventre posterior do músculo digástrico.

- (A) Hipoglosso.
- (B) Facial.
- (C) Trigêmio.
- (D) Vestíbulo coclear.
- (E) Glossofaríngeo.

### QUESTÃO 19

Dentre as manobras utilizadas na reabilitação do paciente disfágico, assinale a opção que apresenta a técnica que permite obter melhor movimentação da parede faríngea, maior excursão laríngea e abertura do esfíncter esofágico superior, por meio da deglutição com a língua entre os dentes.

- (A) Mendelsohn.
- (B) Supersupraglótica.
- (C) Masako.
- (D) Valsalva.
- (E) Lee Silverman.

### QUESTÃO 20

Alteração na fala de crianças, com consoantes iniciais menos articuladas do que aquelas em outras posições, performance na fala espontânea prejudicada, dificuldade no posicionamento da musculatura, gravidade variável, causada por lesão cerebral, sem fraqueza ou lentidão dos músculos nos movimentos automáticos, são características do quadro de:

- (A) distúrbio específico de linguagem.
- (B) apraxia.
- (C) disartria.
- (D) transtorno fonológico.
- (E) atraso de linguagem.

### QUESTÃO 21

A criança com atraso de linguagem apresenta:

- (A) cronologia do desenvolvimento lentificada.
- (B) aquisição de comportamentos incomuns à comunicação.
- (C) desvio no processo do desenvolvimento infantil com uso de ecolalia.
- (D) padrão restrito e repetitivo de comportamento.
- (E) expressão verbal superior à compreensão.

### QUESTÃO 22

Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo, com relação aos aspectos do desenvolvimento oromotor e disfagia na infância e, a seguir, assinale a opção que apresenta a sequência correta.

- ( ) Crianças que não se alimentam por via oral no início da vida podem aprender a se alimentar com o copo ou colher sem nunca ter aprendido a sugar.
- ( ) Entre dois e três anos de idade, a laringe situa-se em posição mais alta no pescoço e tornam-se mais evidentes os problemas de aspiração em crianças com habilidades oromotoras limitadas ou com disfunções laríngeas.
- ( ) A incoordenação transitória da deglutição na infância ocorre em lactentes portadores de alteração anatômica congênita ou adquirida, com melhora significativa após correção cirúrgica.
- ( ) Pode-se considerar disfagia cricofaríngea na criança, quando ocorre uma disfunção do esfíncter esofágico superior (ESS), diagnosticada por presença de hipocontratilidade faríngea ou acalasia cricofaríngea.
- ( ) As dificuldades de alimentação no período neonatal, em que há falhas em iniciar a sucção nutritiva ou que a sucção e deglutição são débeis, podem ser um indicativo de possível manifestação de uma doença sistêmica ou alteração anatômica.

- (A) (V) (V) (F) (V) (V)
- (B) (V) (F) (V) (F) (F)
- (C) (V) (F) (F) (V) (V)
- (D) (F) (F) (F) (V) (V)
- (E) (F) (V) (V) (F) (F)

### QUESTÃO 23

Na avaliação auditiva, o efeito de oclusão é definido como:

- (A) uma energia sonora que auxilia na determinação dos limiares durante o mascaramento da orelha não testada.
- (B) a eliminação da resposta da orelha não testada pelo ruído mascarante devido à atenuação interaural.
- (C) um efeito que pode ocorrer em indivíduos com audição normal, perda neurossensorial e perda condutiva.
- (D) um fenômeno capaz de afetar a percepção do som por condução aérea para as frequências agudas.
- (E) um aumento da intensidade do som na cóclea não testada por condução óssea produzida no meato acústico externo.

#### QUESTÃO 24

A presbifonia é uma manifestação fisiológica, e não uma doença, que decorre de um processo natural de envelhecimento. Acerca desse assunto, é correto afirmar que:

- (A) indivíduos que utilizam a voz profissionalmente e realizam treinamento vocal regular podem acelerar o desgaste fisiológico.
- (B) as características vocais apresentadas no envelhecimento são exclusivas da presbifonia.
- (C) não há uma relação direta entre o grau de modificação anatômica e a intensidade do desvio vocal.
- (D) na atrofia muscular laríngea da presbifonia é bastante comum a presença de lesões de massa.
- (E) os formantes das vogais apresentam-se uniformes e há aumento da frequência média do primeiro formante.

#### QUESTÃO 25

O processo de deglutição é um mecanismo anatomofisiológico complexo que exerce a função de transportar o bolo de forma segura da cavidade oral para o estômago. No preparo do alimento na cavidade oral, o músculo responsável pela elevação do osso hióide é o:

- (A) digástrico.
- (B) pterigoideo medial.
- (C) pterigoideo lateral.
- (D) temporal.
- (E) masseter.

#### QUESTÃO 26

Assinale a opção que apresenta uma consequência morfológica esperada em indivíduos respiradores orais.

- (A) Aumento do espaço transversal da maxila.
- (B) Desvio de septo.
- (C) Hipertrofia de tonsilas.
- (D) Eversão do lábio superior.
- (E) Aumento da profundidade do palato.

#### QUESTÃO 27

Com relação ao atendimento fonoaudiológico na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), é correto afirmar que:

- (A) em pacientes com instabilidade clínica, a alimentação por via oral é recomendada e deve-se priorizar a avaliação com dietas pastosas, a fim de propiciar a recuperação nutricional e hídrica.
- (B) a traqueostomia é um fator que maximiza a deglutição segura, uma vez que possibilita a proteção e a manutenção das vias aéreas, além de permitir melhor coordenação e mobilidade laríngea.
- (C) a higienização oral é um dos pré-requisitos mais importantes do programa de reabilitação da disfagia orofaríngea, cuja execução compete exclusivamente ao fonoaudiólogo assistente da equipe.
- (D) nos pacientes submetidos à intubação orotraqueal por mais de 24h, deve-se priorizar a indicação da avaliação clínica fonoaudiológica precoce, ou seja, antes de completar 24h da extubação.
- (E) o treinamento muscular respiratório (TMR), que se baseia na imposição de cargas respiratórias, contribui para a melhora da biomecânica da deglutição, com diminuição inclusive da ocorrência da aspiração.

#### QUESTÃO 28

Indivíduos submetidos à ventilação mecânica, via intubação endolaríngea e/ou traqueostomia, costumam apresentar disfagias orofaríngeas, podendo acarretar alterações dos mais variados graus, EXCETO:

- (A) incoordenação entre deglutição e respiração.
- (B) retardo do disparo de deglutição.
- (C) resíduos na faringe e recessos piriformes.
- (D) sensibilização da faringe e laringe.
- (E) diminuição da pressão aérea subglótica.

#### QUESTÃO 29

O zumbido é uma das queixas mais frequentes na audiológica clínica. Sendo assim, assinale a opção que apresenta o que se deve incluir na avaliação audiológica avançada do indivíduo com zumbido.

- (A) Mascaramento.
- (B) Estímulo contínuo.
- (C) Teste de prótese auditiva.
- (D) Processamento auditivo.
- (E) Potencial auditivo evocado do tronco encefálico.

### QUESTÃO 30

Um dos testes da bateria de avaliação de processamento auditivo central, que avalia o processamento temporal, é o teste:

- (A) de detecção de intervalo aleatório (RGDT).
- (B) de fusão binaural (BFT).
- (C) pediátrico de inteligibilidade de fala com mensagem competitiva (PSI).
- (D) de fala no ruído (SNT).
- (E) limiar diferencial de mascaramento (MLD).

### QUESTÃO 31

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo:

De acordo com a Classificação de Angle (1987), o padrão dentário orienta-se pelo relacionamento antero-posterior da maxila e mandíbula, sendo a \_\_\_\_\_ a má oclusão que se caracteriza por apresentar \_\_\_\_\_ e conformação facial \_\_\_\_\_.

- (A) Classe I / mordida cruzada posterior / curta
- (B) Classe II divisão 1 / sobressaliência aumentada / longa
- (C) Classe II divisão 2 / sobremordida / longa
- (D) Classe III / mordida cruzada anterior / curta
- (E) Classe III / sobressaliência aumentada / longa

### QUESTÃO 32

Emília Ferreira *et al.* (*In*: Queiroga et al, 2015) descrevem as etapas da aquisição da linguagem escrita. Assinale a opção que apresenta corretamente essas etapas.

- (A) Pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética.
- (B) Pré-linguística, linguística, metalinguística e sintática.
- (C) Pré-operacional, operações complexas, vocabular e textual.
- (D) Pré-simbólica, simbólica, logográfica e vocabular.
- (E) Pré-linguística, metafonológica, alfabética e silábica.

### QUESTÃO 33

Assinale a opção que apresenta o músculo intrínseco da laringe, responsável pela adução da glote posterior.

- (A) Cricoaritenóideo lateral.
- (B) Cricoaritenóideo posterior.
- (C) Tireóideo.
- (D) Aritenoideo.
- (E) Cricotireóideo.

### QUESTÃO 34

Assinale a opção que apresenta um distúrbio de movimento, tendo início na infância, quase sempre antes dos quinze anos de idade, que aparece primeiro nos membros inferiores e chega a atingir o segmento crânio-cervical e que pode ocasionar disfagia, disartria e disфонia.

- (A) *Parkinsonismo*.
- (B) Doença de *Huntington*.
- (C) Coreia de *Sydenham*.
- (D) Distonia de *Oppenheim*.
- (E) Esclerose Lateral Amiotrófica.

### QUESTÃO 35

A Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) no Brasil é recomendada:

- (A) às crianças sem indicadores de risco para a deficiência auditiva, exceto as prematuras.
- (B) para identificar as perdas auditivas cocleares maiores ou iguais a 35 dB NA.
- (C) com medidas de imitância acústica para descartar alterações condutivas comuns em bebês.
- (D) com monitoramento audiológico universal por risco de início tardio da perda auditiva.
- (E) aplicando-se as emissões otoacústicas para identificar as perdas retrococleares.

### QUESTÃO 36

Assinale a opção que apresenta um critério impeditivo para a intervenção fonoaudiológica na UTI Neonatal, cujo objetivo é iniciar a transição alimentar para via oral.

- (A) Estabilidade clínica determinada pelo neonatologista.
- (B) Presença de suporte de ventilação com pressão positiva.
- (C) Aceitação da dieta enteral.
- (D) Idade corrigida maior ou igual a 32 semanas.
- (E) Manutenção estável dos padrões cardiorrespiratórios.

### QUESTÃO 37

Na encefalopatia crônica infantil não evolutiva (ECINE) na infância, as manifestações clínicas podem sofrer transformações à medida que a criança cresce, conforme os estímulos recebidos durante o tratamento de reabilitação. Os casos em que a criança apresenta hipotonia, incoordenação estática e cinética, tremores de ação, dismetria, fala disártrica e escandida, caracterizam o quadro de paralisia cerebral:

- (A) atáxica.
- (B) espástica.
- (C) coreoatetósica.
- (D) distônica.
- (E) flácida.

### QUESTÃO 38

Sobre a Síndrome de *Guillain-Barré*, é correto afirmar que:

- (A) possui prognóstico reservado, quadro irreversível.
- (B) apresenta fraqueza muscular assimétrica, lentamente progressiva.
- (C) é caracterizada pela presença de sintomas flutuantes.
- (D) é doença inflamatória desmielinizante das raízes e nervos periféricos.
- (E) acomete o neurônio motor superior.

### QUESTÃO 39

A técnica de vibração sonorizada de língua e lábios pode proporcionar:

- (A) melhor coaptação glótica.
- (B) menor constrição mediana do vértice laríngeo.
- (C) maior elevação laríngea e tensão fonatória.
- (D) aumento do *shimmer* e *jitter*.
- (E) piora da sopro e aspereza.

### QUESTÃO 40

Na reabilitação fonoaudiológica de pacientes submetidos à laringectomia total, deve-se evitar a indicação da eletrolaringe:

- (A) em indivíduos acamados com cirurgias extensas.
- (B) em idosos laringectomizados com perdas de audição.
- (C) na presença de fibrose esofágica pós radioterapia.
- (D) em pacientes com tremores de extremidades.
- (E) no período de aprendizado da voz esofágica.

### QUESTÃO 41

A Síndrome Congênita do vírus Zika (ZIKV) em recém-nascidos infectados com o Zika vírus durante a gravidez pode causar microcefalia, tecido cerebral reduzido com sequelas neurológicas que afetam a visão, audição, deficiências do desenvolvimento e epilepsia. A avaliação audiológica infantil desses bebês deve ser realizada com protocolo de triagem auditiva:

- (A) de baixo risco coclear com emissões otoacústicas e reflexo cócleo-palpebral.
- (B) com emissões otoacústicas e sem potencial evocado auditivo de tronco encefálico.
- (C) de alto risco e acompanhamento mesmo que apresentem audição normal.
- (D) com monitoramento da via óssea quando o bebê completar um ano de idade.
- (E) eletrofisiológica após completar amadurecimento da via auditiva central.

### QUESTÃO 42

Assinale a opção que apresenta a técnica fonoaudiológica utilizada para afastar as estruturas do vértice laríngeo, principalmente as pregas vestibulares, e que consiste em aspirar rapidamente o ar pelo nariz em inspirações curtas e repetidas.

- (A) *Messa di voce*.
- (B) Inspiração fonatória.
- (C) *Sniff*.
- (D) Sopro inspiratório.
- (E) Fonação vestibular.

### QUESTÃO 43

Assinale a opção que apresenta a característica vocal que predomina nas laringectomias horizontais supraglóticas.

- (A) *Pitch* diminuído.
- (B) Ressonância *Cul de Sac*.
- (C) Rouquidão.
- (D) Sopro e aspereza.
- (E) *Jitter* aumentado.

### QUESTÃO 44

Entre os dispositivos eletrônicos de amplificação auditiva, o *Bone-Anchored Hearing Aid* (BAHA) é indicado para:

- (A) perda auditiva neurosensorial bilateral severa a profunda.
- (B) perda auditiva bilateral severa com malformações da orelha externa e média.
- (C) anacusia bilateral.
- (D) perda auditiva neurosensorial unilateral de grau leve.
- (E) perda auditiva neurosensorial bilateral de grau leve a moderado.

### QUESTÃO 45

Na paralisia facial periférica, a lesão do nervo facial pode ser avaliada pelo exame de:

- (A) audiometria tonal liminar.
- (B) pesquisa do reflexo acústico.
- (C) otoemissões acústicas.
- (D) processamento auditivo.
- (E) potencial auditivo de tronco cerebral.



#### QUESTÃO 46

A Portaria nº19 de 09 de abril de 1998 do Ministério do Trabalho, que dispõe sobre a padronização da avaliação auditiva em trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados, aboliu:

- (A) a avaliação audiométrica nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, visto que a perda auditiva induzida por ruído afeta as frequências agudas.
- (B) a avaliação da progressão da perda auditiva ocupacional com base na série audiométrica.
- (C) as avaliações auditivas realizadas no final do turno de trabalho e o audiograma de monitoramento anual.
- (D) a análise do desencadeamento da perda auditiva induzida por ruído utilizando a mudança significativa de limiar.
- (E) os critérios de classificação das perdas auditivas induzidas por níveis de pressão sonora elevados, como *Fowler* e *Merluzzi*.

#### QUESTÃO 47

Correlacione as diversas manifestações observadas no plano da palavra, parafasias, às respectivas frases emitidas pelo paciente no processo avaliativo e, em seguida, assinale a opção que apresenta a sequência correta.

##### PARAFASIAS

- I- Fonêmica
- II- Morfêmica
- III- Formal
- IV- Verbal
- V- Semântica

##### FRASES

- ( ) "Os pregos e o marmelo estão na gaveta" (martelo>marmelo).
- ( ) "Aquele homem calçou a blusa vermelha" (sapato> blusa).
- ( ) "Joaquim caiu do vacalo" (cavalo>vacalo).
- ( ) "O vestido do menino está molhado" (menina>menino).
- ( ) "Estava delicioso o chapéu" (bolo> chapéu).

- (A) (II) (III) (I) (V) (IV)
- (B) (I) (III) (IV) (II) (V)
- (C) (II) (IV) (III) (I) (V)
- (D) (III) (V) (I) (II) (IV)
- (E) (III) (IV) (II) (V) (I)

#### QUESTÃO 48

Assinale a opção que apresenta a condição ideal para realizar o treino de via oral no paciente traqueostomizado.

- (A) Utilizando cânula plástica.
- (B) Mantendo o *Cuff* insuflado.
- (C) Presença de secreção espessa e difícil de expectorar.
- (D) Dependente de ventilação mecânica.
- (E) Permanecendo com a cânula da traqueostomia fechada.

#### QUESTÃO 49

Assinale a opção que apresenta o teste logaudiométrico básico realizado com simples repetições da mesma sílaba sem sentido, dado em dBNA e que deve ser consistente com o melhor limiar de via aérea na região entre 250 e 4000Hz.

- (A) LRF.
- (B) IPRF.
- (C) LDV.
- (D) VUD.
- (E) IVOT.

#### QUESTÃO 50

Na avaliação oromiofuncional das desproporções maxilomandibulares, a função que se destaca como fundamental para um prognóstico adequado e sucesso no tratamento é a:

- (A) fonatória.
- (B) deglutitória.
- (C) mastigatória.
- (D) velofaríngea.
- (E) respiratória.

# RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

**INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO**

- 1- Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2- O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3- Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
- 4- A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo 20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
- 5- Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
  - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
  - fazer uso de banheiro; e
  - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 6- Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 7- Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 8- Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 9- O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
- 10- Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
  - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
  - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
  - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
  - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
  - e) cometer ato grave de indisciplina; e
  - f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 11- Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
  - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
  - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
  - c) assine o seu nome no local indicado;
  - d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e
  - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 12- Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

- 13- Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias (BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEnsM na Internet. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50