

**MARINHA DO BRASIL**  
**DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA**

***(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE  
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR  
DE PRAÇAS DA MARINHA / PS-CAP/2011)***

**É PERMITIDO O USO DE CALCULADORA PADRÃO (NÃO  
CIENTÍFICA) E RÉGUA SIMPLES**

**TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL**

- 1) Assinale a opção que apresenta uma osteomielite do alvéolo dental, sendo a complicação pós-exodôntica mais comum.
- (A) Osteorradionecrose.
  - (B) Tórus.
  - (C) Cisto dentígero.
  - (D) Alveolite.
  - (E) Exostose.
- 2) Segundo LOBAS (2006), não é suficiente estar sentado para que o trabalho ergonômico seja desenvolvido. Em relação ao posicionamento correto de trabalho para o assistente do operador e para o paciente, assinale a afirmativa correta.
- (A) A altura ideal do mocho do assistente deve ser ajustada para que coxas e pernas formem um ângulo de 45° a 60°.
  - (B) Os cotovelos do assistente devem estar elevados, afastados do tronco, de forma que os braços fiquem paralelos ao plano horizontal.
  - (C) O posicionamento ideal para o paciente é que ele esteja sentado na cadeira odontológica, de forma que a cabeça dele esteja bem acima do nível dos pés, o que previne lipotímia.
  - (D) Se o paciente estiver em posição supina e cabeça reclinada, a língua assume uma localização mais posterior na cavidade bucal e proporciona o fechamento da orofaringe.
  - (E) O assistente deve trabalhar com as pernas fechadas, paralelas ao braço esquerdo da cadeira, tendo as plantas dos pés apoiadas no solo.

- 3) Segundo BUISCHI (2000), a promoção de autocuidados é uma das estratégias mais importantes no cuidado primário da saúde, e visa educar o paciente para desempenhar a parte das tarefas que lhe cabe na promoção de saúde, como por exemplo, o controle diário de placa. Sobre os meios e métodos de limpeza utilizados para o controle mecânico da placa realizado pelo paciente, assinale a opção INCORRETA.
- (A) Mais importante que a frequência da escovação é a qualidade da limpeza.
  - (B) A escova elétrica pode oferecer vantagens para certos grupos de pacientes, como crianças, adolescentes com aparelho ortodôntico, idosos e portadores de deficiências.
  - (C) A suplementação da escovação pelo uso de fio/fita dental resulta em maior remoção de placa das superfícies interproximais do que aquela obtida através da simples escovação.
  - (D) Nos espaços interproximais mais amplos, as escovas interdentais são mais apropriadas para a limpeza do que fio/fita ou palito dental.
  - (E) A escovação com dentífrício fluoretado em crianças abaixo de 6 anos não necessita ser supervisionada por um adulto.
- 4) De acordo com DE FREITAS et. al. (2004), que agente restrinvente usado na maioria dos reveladores, evita o velamento?
- (A) Sulfito de Sódio.
  - (B) Hipossulfito de Sódio.
  - (C) Brometo de Potássio.
  - (D) Ácido acético.
  - (E) Alúmen de Potássio.
- 5) Assinale a opção que apresenta um instrumento utilizado no tratamento endodôntico.
- (A) Sindesmótomo
  - (B) Espátula nº 7
  - (C) Pinça-goiva
  - (D) Brunidor
  - (E) Alargador gates glidden

- 6) O equipamento considerado padrão para a esterilização do material endodôntico é:
- (A) Estufa.
  - (B) Autoclave.
  - (C) Câmara escura portátil.
  - (D) Localizador apical.
  - (E) Ultrassom.
- 7) Qual é o fator mais importante para o desenvolvimento do carcinoma espinocelular de lábio?
- (A) Infecção bacteriana.
  - (B) Álcool.
  - (C) Infecção fúngica ou viral.
  - (D) Trauma local.
  - (E) Radiação ultravioleta.
- 8) Segundo BUISCHI (2000), a respeito do papel da equipe odontológica, é correto afirmar que:
- (A) educadores de saúde bucal são os mais valiosos colaboradores em programas de saúde periodontal.
  - (B) higienistas dentais não são necessários para atividades relacionadas à prevenção secundária de doenças periodontais.
  - (C) o tratamento e o cuidado requerido por grande maioria das pessoas com doenças periodontais não podem ser feitos por auxiliares odontológicos.
  - (D) dentistas clínicos são necessários para tratar casos rotineiros de doenças periodontais.
  - (E) dentistas com treinamento avançado em periodontia são necessários para cuidar de todas as pessoas com doenças periodontais severas.
- 9) Como é denominado o distúrbio de desenvolvimento dos dentes que é caracterizado pela união de dois dentes já formados através do cimento?
- (A) Taurodontia.
  - (B) Dilaceração.
  - (C) Dens in dente.
  - (D) Fusão.
  - (E) Concrescência.

- 10) Segundo DE FREITAS et al. (2004), as unidades de medidas de radiações R (rontgen) e RAD medem, respectivamente:
- (A) Mensuração e exposição.
  - (B) Exposição e absorção.
  - (C) Absorção e exposição.
  - (D) Absorção e mensuração.
  - (E) Mensuração e absorção.
- 11) Segundo HUPP et al. (2009), a lâmina de bisturi mais empregada em cirurgia intraoral é a de número:
- (A) 7
  - (B) 10
  - (C) 11
  - (D) 12
  - (E) 15
- 12) Segundo LOBAS et al. (2006), o distúrbio de desenvolvimento dos dentes caracterizado por uma curvatura ou angulação incomum das raízes dentárias, cujo diagnóstico é radiográfico, denomina-se:
- (A) Taurodontia.
  - (B) Concrescência.
  - (C) Anodontia.
  - (D) Dilaceração.
  - (E) Geminação.
- 13) Segundo HUPP et al. (2009), os dentes unirradiculares maxilares são, geralmente, removidos com um fórceps universal maxilar número
- (A) 151
  - (B) 150
  - (C) 87
  - (D) 23
  - (E) 17

- 14) O sangramento à sondagem é um dos sinais mais comumente usados para se avaliar a inflamação dos tecidos gengivais. O instrumento normalmente utilizado para esta manobra pode ser a sonda periodontal. Em relação à sondagem, é correto afirmar que:
- (A) O tipo de sonda, angulação e força utilizada na inserção da sonda não influenciam os resultados obtidos com esse método.
  - (B) A força de inserção da sonda periodontal deve ultrapassar 0,25N para que os resultados sejam confiáveis.
  - (C) O tempo de espera após sondagem não pode alterar os resultados já que todos os sítios sangram imediatamente após sondagem.
  - (D) A ausência contínua de sangramento à sondagem é um dado altamente favorável à saúde periodontal.
  - (E) O sangramento à sondagem em pacientes com bolsas periodontais profundas e perda de inserção não indica aumento da probabilidade de progressão da doença.
- 15) É recomendada para ser utilizada em áreas difíceis de serem atingidas pela escova tradicional, tais como as superfícies vestibulares de molares superiores e linguais de molares inferiores. É também extremamente útil para pacientes portadores de aparelhos ortodônticos e de próteses fixas, facilitando a limpeza em áreas de maior retenção de placa.
- A descrição acima refere-se à
- (A) escova interdental.
  - (B) escova elétrica.
  - (C) escova unitufo.
  - (D) fita dental.
  - (E) taça de borracha.
- 16) Segundo LOBAS et al. (2006), os músculos da cabeça são divididos em três grupos:
- (A) cutâneos, capilares e mímica.
  - (B) cutâneos, mastigação e supra-hióideos.
  - (C) mastigação, maiores e menores.
  - (D) cutâneos, maiores e menores.
  - (E) menores, mastigação e supra-hióideos.

- 17) Segundo LOBAS et al. (2006), anatomicamente, os dentes se dividem em:
- (A) coroa, colo e raiz.
  - (B) coroa, canal e raiz.
  - (C) superior, média e inferior.
  - (D) oclusal, colo e raiz.
  - (E) incisal, canal e raiz.
- 18) Segundo LOBAS (2006), assinale a opção que corresponde à sequência correta para a lavagem e antisepsia das mãos.
- I - Esfregar as pontas dos dedos, sempre com as unhas curtas.
  - II - Esfregar com as pontas dos dedos da mão direita a palma da mão esquerda e vice-versa.
  - III - Esfregar as palmas das mãos uma com a outra.
  - IV - Esfregar a palma de uma das mãos contra o dorso da outra e vice-versa, atingindo os espaços interdigitais.
  - V - Esfregar pulso, antebraço até o cotovelo.
- (A) (V) (III) (IV) (I) (II)
  - (B) (IV) (III) (V) (II) (I)
  - (C) (III) (IV) (I) (II) (V)
  - (D) (I) (II) (III) (IV) (V)
  - (E) (III) (IV) (V) (I) (II)
- 19) À luz dos conhecimentos epidemiológicos e clínicos sobre as doenças periodontais, assinale a opção correta.
- (A) A gengivite é um problema comum que necessariamente evolui para a periodontite.
  - (B) A prevalência de doença periodontal destrutiva é alta e segue aumentando em nível internacional.
  - (C) O biofilme bacteriano dental é, em essência, o fator decisivo na prevenção e tratamento da maioria das doenças periodontais.
  - (D) Doenças periodontais são a causa principal de perdas dentais e de edentulismo no grupo entre 50 e 60 anos.
  - (E) O atual grau de conhecimento científico permite a identificação de indivíduos de alto risco quanto à futura destruição periodontal.

- 20) A Lei que regulamenta o exercício dos profissionais em Técnico em Saúde Bucal e de Auxiliar em Saúde Bucal é:
- (A) Lei nº 10.998, de 24 de dezembro de 1998.
  - (B) Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 1998.
  - (C) Lei nº 11.098, de 24 de dezembro de 2001.
  - (D) Lei nº 13.502, de 24 de dezembro de 2003.
  - (E) Lei nº 15.312, de 24 de dezembro de 2004.
- 21) Segundo CANTISANO (1987), as projeções de esmalte de aspecto linear, observadas na face lingual de incisivos e caninos e oclusal de pré-molares e molares, são denominadas:
- (A) fossas.
  - (B) rebordos proximais ou marginais.
  - (C) sulcos secundários ou acessórios.
  - (D) cúspides.
  - (E) arestas.
- 22) Segundo LOBAS et al. (2006), o osso do crânio que apresenta uma escavação no seu corpo (Sela Túrctica), onde está situada a Hipófise, é o
- (A) temporal.
  - (B) occipital.
  - (C) esferoide.
  - (D) etmoide.
  - (E) parietal.
- 23) Segundo HUPP et al. (2009), na montagem de uma bandeja cirúrgica para exodontia do elemento 36, deve-se incluir o forceps de número:
- (A) 1
  - (B) 17
  - (C) 18L
  - (D) 18R
  - (E) 151
- 24) Assinale a opção que apresenta um músculo cutâneo e um músculo mastigador, respectivamente.
- (A) Masseter e temporal.
  - (B) Risório e masseter.
  - (C) Elevador do lábio superior e bucinador.
  - (D) Pterigóideo medial e Pterigóideo lateral.
  - (E) Temporal e Orbicular das pálpebras.

Prova : Amarela  
Profissão : TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

Concurso : PS-CAP/11



- 25) Quanto aos dentes temporários e à dentição temporária, é INCORRETO afirmar que:
- (A) os dentes temporários são menores que os permanentes, em todas as dimensões.
  - (B) as coroas são de aspecto globoso.
  - (C) a dentição temporária apresenta, no grupo dos molares, uma ordem crescente de volume, enquanto que nos permanentes o primeiro molar é maior que o segundo.
  - (D) nos pré-molares temporários, o aspecto do colo é bem diferenciado por sua nítida constricção, decorrente da forma globosa da coroa e da grande divergência das raízes.
  - (E) os dentes temporários apresentam coloração própria que varia de branco-leitoso à branco-azulado.
- 26) O tratamento expectante é classicamente indicado para casos de dentes com lesões cariosas profundas, a fim de diminuir o risco de exposição pulpar. Neste procedimento, a camada de dentina necrosada é removida na primeira sessão seguida de selamento com material provisório, a fim de promover formação de dentina esclerótica e reacional. Este material provisório pode ser:
- (A) Resina fotopolimerizável.
  - (B) Gutapercha.
  - (C) Amálgama.
  - (D) Cimento de Ionômero de Vidro.
  - (E) Verniz cavitário.
- 27) Os instrumentos endodônticos, em razão de terem contato direto com tecido conjuntivo e sangue, são classificados como:
- (A) Críticos.
  - (B) Semicríticos.
  - (C) Não críticos.
  - (D) Supercríticos.
  - (E) Hipercríticos.

28) Em relação à cárie dentária, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) e depois assinale a opção que apresenta a sequência correta.

- ( ) O consumo de sacarose aumenta a incidência de cárie.
- ( ) O fator mais importante, do ponto de vista da cárie, é a quantidade e não a frequência do consumo do açúcar.
- ( ) A consistência do alimento desempenha um papel relevante na cárie dentária.
- ( ) A saliva desempenha função protetora através da limpeza mecânica de detritos alimentares e de carboidratos derivados dos alimentos, através do efeito tampão, entre outros.
- ( ) A cárie é considerada como um desequilíbrio no processo de desmineralização e remineralização dos tecidos duros do dente.

- (A) (V) (F) (F) (V) (V)
- (B) (V) (V) (F) (V) (V)
- (C) (F) (V) (V) (F) (F)
- (D) (V) (F) (V) (V) (V)
- (E) (V) (V) (V) (V) (F)

29) Assinale a opção que NÃO representa caracteres comuns aos pré-molares.

- (A) Faces proximais com forma quadrangular.
- (B) Face vestibular com leve convergência das bordas proximais, no sentido do colo.
- (C) Face vestibular com contorno cervical côncavo em relação à oclusal.
- (D) Face oclusal em forma de pentágono.
- (E) Face lingual com proeminência de esmalte junto à porção cervical - o cingulo - formada pelo encontro dos rebordos proximais.

- 30) Náusea, hipersalivação e ânsia de vômito são as queixas mais comuns de pacientes que recebem aplicação de géis de flúor-fosfato acidulado. As seguintes medidas podem auxiliar na prevenção da ingestão involuntária de FFA gel pelo paciente, EXCETO:
- (A) sentar em posição ereta com a cabeça ligeiramente inclinada para frente.
  - (B) a quantidade de gel deve ser mínima, não excedendo 2,0ml por moldeira.
  - (C) usar sugador durante a aplicação, verificando a ocorrência de excessos de material nas regiões sublingual e vestíbulo bucal.
  - (D) solicitar ao paciente expectorar diversas vezes após aplicação.
  - (E) o gel deve ser colocado em moldeira de aço inoxidável, preferencialmente.
- 31) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações abaixo sobre o uso de selantes na clínica odontológica, e a seguir assinale a opção que apresenta a resposta correta.
- I - A técnica de aplicação de selantes é simples e direta, contudo, é extremamente sensível à manipulação do material e à contaminação salivar.
  - II - Sempre que possível, deve ser utilizado o isolamento absoluto.
  - III- O ácido mais utilizado para o ataque ácido é o ácido fosfórico a 37%.
  - IV - O dente não precisa ser lavado após o uso do ataque ácido.
  - V - O selante deve ser aplicado em toda a superfície atacada.
- (A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
  - (B) Apenas as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
  - (C) Apenas as afirmativas III e V são verdadeiras.
  - (D) Apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
  - (E) Apenas as afirmativas I e V são verdadeiras.

- 32) É necessário que haja uma grande adequação dos movimentos executados durante o trabalho clínico no intuito de aumentar a produtividade, enquanto há o declínio da fadiga. Assinale a opção que corresponde ao movimento 2, segundo LOBAS (2006):
- (A) Movimento de "punhos e dedos".
  - (B) Movimento de "dedos".
  - (C) Movimento de "antebraço".
  - (D) Movimento de "braço".
  - (E) Movimento de "deslocamento e torções do corpo".
- 33) O cálculo dental ou tártaro usualmente representa a placa bacteriana mineralizada. Quanto ao aspecto clínico, distribuição e diagnóstico do cálculo dental, assinale a opção correta.
- (A) O cálculo supragengival não é dependente da secreção das glândulas salivares.
  - (B) O cálculo supragengival é encontrado predominantemente na face vestibular dos dentes ântero-inferiores.
  - (C) O cálculo subgengival sempre pode ser visto em radiografias dentais.
  - (D) O cálculo subgengival consiste em massas duras de tecido calcificado marrom ou preto, com uma superfície rugosa.
  - (E) O cálculo supragengival não abriga continuamente placa bacteriana viável.

- 34) Correlacione as Estruturas Anatômicas às suas respectivas definições, e, em seguida assinale a opção que apresenta a sequência correta.

ESTRUTURAS ANATÔMICAS

DEFINIÇÕES

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| I - Polpa dental.                 | ( ) É a parede da câmara coronária em proximidade à região cervical.                          |
| II - Corno ou divertículo pulpar. | ( ) É a estrutura basicamente orgânica, que preenche a cavidade pulpar.                       |
| III- Soalho.                      | ( ) Projeção da câmara coronária relacionada com as cúspides, tubérculos e ângulos proximais. |
| IV - Teto                         | ( ) É o orifício natural de acesso à cavidade pulpar, localizado no ápice radicular.          |
| V - Forame Apical.                | ( ) É a parede incisal ou oclusal da câmara coronária.  |

- (A) (III) (I) (II) (V) (IV)  
(B) (IV) (I) (II) (III) (V)  
(C) (IV) (II) (I) (V) (III)  
(D) (III) (II) (I) (IV) (V)  
(E) (IV) (I) (III) (V) (II)

- 35) Segundo LOBAS (2006), há alguns comportamentos que uma auxiliar de consultório dentário (ACD) deve manter diante de sua equipe de trabalho e das pessoas que serão atendidas, EXCETO:

- (A) Pontualidade: esforçar-se para se apresentar à clínica no horário pré-determinado, assim dará impressão de respeito e responsabilidade.  
(B) Fidelidade: é uma das características pessoais mais importantes, pois reflete o caráter de cada um.  
(C) Sigilo: o segredo profissional prescrito no código de ética deve ser respeitado.  
(D) Profissionalismo: a postura profissional deve ser mantida mesmo diante das dificuldades e dos problemas de ordem particular ou profissional.  
(E) Higiene: uma aptidão física adequada é particularmente importante, já que o esforço mental e/ou físico demandado tende a gerar considerável desgaste sobre qualquer indivíduo.

Prova : Amarela  
Profissão : TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

Concurso : PS-CAP/11

- 36) O processo pelo qual ocorre a destruição de todos os micro-organismos existentes, incluindo os esporos, denomina-se
- (A) Desinfecção.
  - (B) Limpeza.
  - (C) Esterilização.
  - (D) Centrifugação.
  - (E) Desnaturação.
- 37) Segundo BUISCHI (2000), em relação à clorexidina, é correto afirmar que:
- (A) tem atividade anti-inflamatória através da inibição de leucotrienos e prostaglandina PGE<sub>2</sub>.
  - (B) sua ação é dose-dependente e as concentrações que mostraram melhores resultados variam entre 10 e 20%.
  - (C) seu tempo de uso deve ultrapassar 4 semanas.
  - (D) seu uso é recomendado em pacientes impossibilitados de realizar o controle mecânico de placa.
  - (E) uma das vantagens do uso da clorexidina é que não causa pigmentação dentária.
- 38) De acordo com o parecer 460 do Conselho Federal de Educação e com a Decisão 26/84 do Conselho Federal de Odontologia, o Técnico em Higiene Dental está definido como um "profissional qualificado que, sob supervisão do Cirurgião-Dentista, executa tarefas auxiliares no tratamento odontológico". Assinale a opção que NÃO é competência do Técnico em Higiene Dental.
- (A) Colaborar na educação em saúde e nos estudos epidemiológicos.
  - (B) Realizar suturas.
  - (C) Instrumentar o Cirurgião-Dentista.
  - (D) Administrar a clínica.
  - (E) Proceder limpeza e antissepsia de campo.

- 39) LINDHE (2010) afirma que a mucosa oral compreende a mucosa especializada, a mucosa de revestimento e a mucosa mastigatória, a qual inclui a gengiva. Sobre a mucosa oral, é correto afirmar que:
- (A) a mucosa especializada recobre o palato.
  - (B) a gengiva livre tem cor rósea, superfície opaca e consistência firme.
  - (C) a gengiva inserida é demarcada apicalmente pela gengiva livre.
  - (D) a gengiva inserida tem textura frouxa e cor vermelha mais escura.
  - (E) a mucosa de revestimento tem cor avermelhada mais escura e consistência firme.
- 40) Segundo LOBAS et al.(2006), qual é o supranumerário mais frequente?
- (A) Quarto molar.
  - (B) Terceiro pré-molar.
  - (C) Transidente.
  - (D) Ultrasdente.
  - (E) Mesiodens.
- 41) "Condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e vegetal, ou o meio ambiente".
- O texto acima refere-se à
- (A) Biossegurança.
  - (B) Desinfecção.
  - (C) Esterilização.
  - (D) Antissepsia.
  - (E) Assepsia.

- 42) Segundo BUISCHI (2000), é um distúrbio da formação dentária, e sua prevenção deve ser dirigida para crianças maiores de 6 anos. Os incisivos, que podem ser severamente afetados, são os dentes que despertam maior preocupação estética. Estima-se que o período de maior risco a esse distúrbio seja, para os incisivos centrais superiores, entre os 15 e 30 meses de idade. O texto diz respeito à:
- (A) Fluorose dentária.
  - (B) Hipoplasia de esmalte.
  - (C) Amelogênese imperfeita.
  - (D) Cárie de mamadeira.
  - (E) Taurodontia.
- 43) Várias condições patológicas não-orais têm sido relacionadas ao mau odor oral, incluindo infecção do trato respiratório superior e inferior, o trato gastrintestinal e algumas doenças metabólicas envolvendo os rins e o fígado. Entretanto, levantamentos clínicos demonstraram que mais de 90% de todo mau odor do hálito têm origem na boca. Acredita-se que a massa bacteriana que produz compostos malcheirosos está localizada principalmente na:
- (A) língua.
  - (B) faringe.
  - (C) saliva.
  - (D) tonsila palatina.
  - (E) gengiva.
- 44) Segundo DE FREITAS et al. (2004), o plano que divide a cabeça em lado esquerdo e direito denomina-se plano
- (A) Bissetriz.
  - (B) Horizontal.
  - (C) Camper.
  - (D) Mediano.
  - (E) de Oclusão.



- 45) Dentre os substitutos dos açúcares, assinale a opção que corresponde a um adoçante que é calórico, tem doçura semelhante à da sacarose, além de produzir um efeito refrescante na boca. Este adoçante também é utilizado em cremes dentais e tem sido considerado não-cariogênico em humanos.
- (A) Sorbitol.
  - (B) Esteviosídeo.
  - (C) Xilitol.
  - (D) Sacarina.
  - (E) Aspartame.
- 46) Segundo CANTISANO (1987), a dentição mista, caracterizada pela presença de dentes temporários e irrupção dos permanentes, situa-se dos:
- (A) 5 aos 10 anos de idade.
  - (B) 4 aos 9 anos de idade.
  - (C) 6 aos 12 anos de idade.
  - (D) 7 aos 15 anos de idade.
  - (E) 5 aos 12 anos de idade.
- 47) Quais são os principais métodos de diagnóstico da cárie dentária?
- (A) Clínico e transiluminação ótica.
  - (B) Radiográfico e medição de resistência elétrica.
  - (C) Clínico e radiográfico.
  - (D) Corantes e transiluminação.
  - (E) Lentes de aumento e corantes.
- 48) Segundo LOBAS et al. (2006), do ponto de vista microbiológico, existem nas mãos dois tipos de populações:
- (A) infectada e desinfectada.
  - (B) livre e agregada.
  - (C) residente e livre.
  - (D) parasitária e transitória.
  - (E) residente e transitória.

- 49) Segundo HUPP et al. (2009), os três principais componentes das alavancas dentais usadas na extração dentária são:
- (A) cabo, haste e lâmina.
  - (B) cabo, pega e articulação.
  - (C) pega, articulação e ponta cortante.
  - (D) cabo, ponta ativa e lâmina.
  - (E) pega, haste e articulação.
- 50) Segundo BUISCHI (2000), a inspeção visual é um dos métodos utilizados para detecção da cárie. Sobre este método, é correto afirmar que:
- (A) para que alcance o máximo de confiabilidade, além de boa iluminação, os dentes devem ser limpos e secos com jatos de ar, antes de serem examinados.
  - (B) é considerado confiável para detecção de cáries oclusais e proximais.
  - (C) a superfície é examinada usando-se uma fonte de luz transmitida e observada pela oclusal.
  - (D) a detecção da cárie dentária se dá através do uso de explorador ou sonda de cárie.
  - (E) para a sua aplicação, não há necessidade de isolar cada quadrante com roletes de algodão.