

MARINHA DO BRASIL
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

***PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AOS
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
(PRM/2024)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ESPECIALIDADES COM ACESSO DIRETO

Anestesiologia	Oftalmologia
Clínica Médica	Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia Geral	Otorrinolaringologia
Infectologia	Patologia
Dermatologia	Pediatria
Ginecologia e Obstetrícia	Psiquiatria
Medicina Nuclear	Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Neurologia	

QUESTÃO 1

Historicamente, a notificação compulsória tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo informação-decisão-ação. Notificação compulsória é definida como a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde:

- (A) feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes.
- (B) feita à autoridade sanitária, exclusivamente por profissionais de saúde, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes.
- (C) que resultem em óbito, feita à autoridade sanitária.
- (D) de natureza infectocontagiosa, feita à autoridade sanitária.
- (E) em situações de castástrofe natural, como forma de mensurar danos.

QUESTÃO 2

Um menino com 7 anos de idade apresenta febre e tosse persistente há 18 dias. A radiografia de tórax evidenciou derrame pleural. Na ultrassonografia de tórax encontra-se derrame pleural estimado de 180 mL de líquido livre, que foi punccionado e enviado ao laboratório. O resultado da análise do líquido pleural foi: 122 células nucleadas, 78% de linfócitos, 20% de neutrófilos, glicose 45, pH 7,2 e desidrogenase láctica (LDH) aumentada. A etiologia mais provável do derrame pleural nesse caso é:

- (A) *Staphylococcus aureus*.
- (B) *Mycoplasma pneumoniae*.
- (C) *Streptococcus pneumoniae*.
- (D) *Mycobacterium tuberculosis*.
- (E) vírus COVID-19.

QUESTÃO 3

Um paciente com 25 anos de idade iniciou sintomas, há 10 dias, de sensação de grandiosidade e humor eufórico. Refere estar dormindo cerca de 3 horas por noite e não se sente cansado. Apresentou aumento da libido e relatou que chegou a ter 10 relações sexuais em um dia, com parceiras diferentes. Sobre o tratamento farmacológico da afecção em questão, é correto afirmar que a medicação mais indicada é:

- (A) o carbonato de Lítio.
- (B) a sertralina.
- (C) a olanzapina.
- (D) a carbamazepina.
- (E) a fluoxetina.

QUESTÃO 4

Uma paciente com 16 anos de idade é levada por sua mãe em uma consulta de primeira vez com ginecologista. Ambas relatam muita preocupação pois a adolescente ainda não menstruou. A paciente nega relações sexuais e dor pélvica. Ao exame físico, apresenta estatura normal e desenvolvimento de caracteres sexuais secundários normais para a idade. Dentre os exames complementares, foi solicitado cariótipo, que se confirmou 46XX. Dentre as opções abaixo, qual a causa mais provável da amenorreia primária dessa paciente?

- (A) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser.
- (B) Síndrome de Kalmann.
- (C) Insensibilidade congênita completa aos androgênios.
- (D) Síndrome de Turner.
- (E) Disgenesia gonadal pura.

QUESTÃO 5

Uma adolescente com 15 anos de idade, vítima de estupro, é levada à emergência acompanhada pelos pais. O fato ocorreu há 6 horas e a paciente está com a vacinação completa. Qual prescrição deve ser realizada após os exames laboratoriais?

- (A) Penicilina benzatina, ceftriaxona, levonorgestrel, imunoglobulina humana anti-hepatite B e prevenção de infecção ao vírus da imunodeficiência humana (HIV).
- (B) Penicilina benzatina, ceftriaxona, azitromicina, levonorgestrel e prevenção de infecção ao vírus da imunodeficiência humana (HIV).
- (C) Ceftriaxona, azitromicina e prevenção de infecção ao vírus da imunodeficiência humana (HIV).
- (D) Penicilina benzatina, azitromicina, levonorgestrel, imunoglobulina anti-hepatite B e prevenção de infecção ao vírus da imunodeficiência humana (HIV).
- (E) Nenhuma, pois deve-se aguardar 72 horas para verificar todos os resultados laboratoriais antes de fazer prescrição.

QUESTÃO 6

O diabetes mellitus gestacional (DMG) é uma condição na qual a intolerância aos carboidratos desenvolve-se na gravidez. Sobre essa condição, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico de diabetes gestacional é descartado nos casos de glicemia de jejum < 95 mg/dl.
- (B) Em caso de glicemia de jejum normal no primeiro trimestre, deve ser solicitado o teste de tolerância oral à glicose entre 24 e 28 semanas, cujo resultado no jejum < 92 mg/dl, 1h < 200 mg/dl e 2h < 158 mg/dl descarta um diagnóstico de DMG.
- (C) Casos de diabetes pré-gestacional podem ser diagnosticados quando há glicemia de jejum > ou = 126 mg/dl na primeira consulta de pré-natal, pela HbA1c > ou = 6,5% ou ainda pela glicemia ao acaso > ou = 200 mg/dl.
- (D) No tratamento do DMG, a dieta mais indicada é composta por um baixo aporte de carboidratos, no máximo 20% do total diário de macronutrientes, dando-se preferência à ingesta em maior quantidade de proteínas.
- (E) A metformina constitui medicamento de primeira linha para o tratamento do DMG.

QUESTÃO 7

Deve-se emitir a Declaração de Óbito, EXCETO:

- (A) em óbitos ocorridos em prontos-socorros.
- (B) em morte natural de indivíduos com mais de 65 anos de idade.
- (C) em caso de óbito por morte violenta.
- (D) no óbito fetal de gestação de 21 semanas.
- (E) no caso de um membro amputado.

QUESTÃO 8

O sangramento pós-menopausa é definido como qualquer sangramento uterino após confirmado o cessamento dos fluxos menstruais por um período de 12 meses consecutivos. Qual é a causa mais comum de sangramento pós-menopausa?

- (A) Terapia de reposição hormonal com estrogênios.
- (B) Pólipos endometriais.
- (C) Câncer de endométrio.
- (D) Hiperplasia do endométrio.
- (E) Atrofia do endométrio.

QUESTÃO 9

Um paciente deu entrada na sala de trauma, vítima de acidente auto *versus* anteparo, com quadro de dispnéia importante além da perna esquerda com fratura exposta. Sinais vitais: pressão arterial (PA) 80x50 mmHg, frequência cardíaca (FC) 110 bpm, saturação de O₂ 90%. No exame físico, foi identificado murmúrio pulmonar abolido em hemitórax direito, desvio de traqueia observada na fúrcula esternal e hipertimpanismo torácico à direita, abdome sem alterações e perna esquerda com exposição óssea e sangramento em babação. A conduta imediata que deve ser tomada é realizar:

- (A) curativo compressivo no ferimento da perna, pois se trata de um choque hipovolêmico.
- (B) toda sequência do atendimento do Treinamento Suporte Avançado de Vida (ATLS), para depois corrigir os danos.
- (C) exame radiológico para confirmação de um pneumotórax hipertensivo.
- (D) descompressão imediata com agulha de grosso calibre ou toracostomia, pois trata-se de um pneumotórax hipertensivo.
- (E) curativo de 3 pontas para evitar que o pneumotórax aumente.

QUESTÃO 10

A respeito da hipertermia maligna, é correto afirmar que:

- (A) ocorre mais em adultos que em jovens e crianças.
- (B) a susceptibilidade é aleatória, não tendo relação com herança genética.
- (C) hipocapnia, acidose e hipoxemia são transtornos associados.
- (D) na suspeita, deve-se interromper os agentes anestésicos inalatórios e succinilcolina.
- (E) a droga de escolha utilizada para reversão é o Naloxona.

QUESTÃO 11

Qual dos exames abaixo confirma o diagnóstico de síndrome falciforme?

- (A) Hemograma completo.
- (B) Tomografia computadorizada de abdome.
- (C) Coagulograma.
- (D) Eletroforese da hemoglobina.
- (E) Biópsia de medula.

QUESTÃO 12

Uma gestante Gesta III / Para I (1 parto vaginal de natimorto há 4 anos) Aborto I (de primeiro trimestre), com idade gestacional de 33 semanas, procura atendimento muito preocupada pois realizou uma ultrassonografia de rotina e não está conseguindo falar com seu obstetra para mostrar o resultado. À ultrassonografia, evidência de feto cefálico, placenta fúndica grau 3, normodramnia, peso fetal estimado de 1.600 g (percentil 2) e biometria fetal compatível com 30 semanas. Doppler de artéria umbilical normal. Qual é a conduta mais apropriada nesse caso?

- (A) Repetir dopplerfluxometria da artéria umbilical semanalmente e interrupção da gestação com 37 semanas.
- (B) Interromper imediatamente a gestação.
- (C) Administrar corticoide para maturação pulmonar fetal e interrupção da gestação após 48 horas.
- (D) Repetir dopplerfluxometria a cada 48 horas e interromper a gestação com 34 semanas.
- (E) Repetir dopplerfluxometria semanal e induzir o trabalho de parto com 40 semanas.

QUESTÃO 13

Uma paciente com 48 anos de idade, diagnosticada com esquizofrenia há 20 anos, faz uso de haloperidol 15 mg/dia desde o diagnóstico. Há cerca de 1 ano, iniciou movimentos repetitivos involuntários em lábios, língua e membros superiores. Sobre esse caso clínico, é correto afirmar que provavelmente trata-se de:

- (A) acatisia.
- (B) distonia aguda.
- (C) Síndrome Neuroléptica Maligna.
- (D) discinesia tardia.
- (E) necessário aumento da dose do Haloperidol.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que apresenta a enfermidade psiquiátrica mais prevalente na comunidade geral.

- (A) Esquizofrenia.
- (B) Transtornos do humor.
- (C) Transtornos dissociativos.
- (D) Transtornos alimentares.
- (E) Transtornos de ansiedade.

QUESTÃO 15

Durante atendimento no pronto-socorro, um paciente encontra-se com dor abdominal em quadrante superior direito, icterícia, relato de um episódio de febre alta, sem instabilidade hemodinâmica, interagindo com examinador. Esses achados são compatíveis com:

- (A) Colelitíase e correspondem à tríade de Charcot.
- (B) Colelitíase e correspondem à tríade de Beck.
- (C) Coledocolitíase e correspondem à pêntrade de Reynolds.
- (D) Coledocolitíase e correspondem à tríade de Reynolds.
- (E) Coledocolitíase e correspondem à tríade de Charcot.

QUESTÃO 16

Sobre a agorafobia, é correto afirmar que:

- (A) caracteriza-se como medo irracional de permanecer no meio de multidões.
- (B) caracteriza-se como medo irracional de permanecer em locais onde possa se sentir preso ou incapaz de sair.
- (C) caracteriza-se como medo irracional de permanecer em locais fechados.
- (D) geralmente acontece associada a Transtorno Obsessivo Compulsivo.
- (E) geralmente acontece associada a Transtorno de Ansiedade generalizada.

QUESTÃO 17

Qual dos itens abaixo NÃO é um critério para diagnóstico de morte encefálica?

- (A) Irresponsividade de todos os estímulos.
- (B) Apneia total.
- (C) Perda dos reflexos aquileu e patelar.
- (D) Ausência de reflexos corneanos.
- (E) Perda dos reflexos oculovestibulares.

QUESTÃO 18

As medidas de morbidade são essenciais à prevenção e ao controle dos agravos à saúde/doença. Elas podem subsidiar o planejamento de ações específicas e monitorá-las, permitindo a sua correção em tempo hábil, além de avaliá-las ao final do período proposto. Nesse sentido, a medida de incidência é definida por:

- (A) casos novos de um agravo à saúde/doença em uma dada população em um determinado período de tempo.
- (B) totalidade de casos de um agravo à saúde/doença em um determinado local e período de tempo.
- (C) totalidade de casos em um ponto específico no tempo (dia ou mês).
- (D) agravos à saúde que resultaram no óbito dos pacientes contabilizados.
- (E) agravos à saúde/doença entre os contatos - pessoas que convivem no trabalho ou domicílio - do primeiro caso identificado, denominado de caso índice.

QUESTÃO 19

A realização de campanhas de combate ao mosquito *Aedes Aegypti* (transmissor da dengue) no município do Rio de Janeiro representa uma estratégia de prevenção:

- (A) primordial.
- (B) secundária.
- (C) terciária.
- (D) primária.
- (E) inválida.

QUESTÃO 20

Uma criança com 4 meses de idade é trazida pelos pais ao pronto-socorro com coriza, espirro, obstrução nasal e febre baixa há 2 dias. Há 24 horas apresenta recusa alimentar, tosse e taquidispneia. Após atendimento inicial e internação, recebeu diagnóstico de bronquiolite viral aguda. O principal agente etiológico nesse caso é:

- (A) Vírus Influenza.
- (B) *Streptococcus pneumoniae*.
- (C) Vírus Sincicial Respiratório.
- (D) Vírus Covid-19.
- (E) Enterovírus.

QUESTÃO 21

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma síndrome que afeta o neurodesenvolvimento. Sobre o TEA, é correto afirmar que:

- (A) o seu diagnóstico é clínico.
- (B) existe biomarcador para o seu diagnóstico.
- (C) apenas 15% dos pacientes com esse diagnóstico apresentam comorbidade associada.
- (D) o diagnóstico poderá ser feito a partir dos 3 anos de idade.
- (E) ainda não existem critérios complementares e relevantes para auxílio no seu diagnóstico.

QUESTÃO 22

Um paciente com 45 anos de idade vivenciou desastre natural há 4 meses, no qual sua cidade sofreu uma grande enchente devido às chuvas torrenciais, sendo ele o único sobrevivente de sua família. Após o incidente, iniciou sintomas de humor triste, sentindo medo todos os dias, além de sonhar com o desastre todas as noites e apresentar sono agitado. Relata não conseguir se recordar do momento no qual foi resgatado e evita falar do que se lembra, apresentando, por vezes, surtos de raiva quando o examinador insiste. Sobre o caso clínico, é correto afirmar que o:

- (A) uso de benzodiazepínicos logo após o evento é imprescindível.
- (B) diagnóstico mais provável é transtorno de estresse pós-traumático.
- (C) diagnóstico mais provável é transtorno de estresse agudo.
- (D) diagnóstico mais provável é transtorno de adaptação.
- (E) uso de inibidores seletivos da recaptção de serotonina não é indicado.

QUESTÃO 23

Quando uma doença põe a vida do paciente em risco, a comunicação empática é de suma importância. Um procedimento estruturado em sete etapas pode ser usado para transmitir notícias difíceis (Escala SPIKES). Qual das etapas abaixo NÃO faz parte desse procedimento?

- (A) Empatia.
- (B) Preparação.
- (C) Conhecimento sobre o problema.
- (D) Cogitação.
- (E) Ambiente adequado.

QUESTÃO 24

Qual das opções abaixo NÃO é contraindicação para a ventilação não invasiva?

- (A) Parada cardíaca e/ou respiratória.
- (B) Baixo risco de broncoaspiração.
- (C) Angina instável.
- (D) Traumatismo facial.
- (E) Hemorragia digestiva grave.

QUESTÃO 25

Os tumores estromais gastrointestinais (GIST) são os tumores sarcomatosos mais comuns do trato gastrointestinal. A respeito do GIST gástrico, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Muito frequentemente estão associados a síndromes familiares.
- (B) A aspiração com agulha fina guiada por Ultrassom Endoscópico (EUS) tem melhor sensibilidade diagnóstica que a biópsia convencional por Endoscopia Digestiva Alta (EDA).
- (C) O princípio do tratamento é a ressecção cirúrgica completa.
- (D) A ressecção anatômica de acordo com as cadeias linfonodais não é necessária.
- (E) Tomografia computadorizada de abdome e pelve com contraste venoso é o método utilizado para avaliar doença metastática.

QUESTÃO 26

Uma paciente com 25 anos de idade dá entrada em unidade de urgência queixando-se de dor abdominal baixa, corrimento amarelado com odor desagradável e febre não aferida de início há 5 dias. Ao exame físico, paciente com temperatura axilar 38,2 °C, frequência cardíaca 102 bpm, pressão arterial 114 x 75 mmHg, frequência respiratória 19 irpm, saturação de oxigênio 98%, abdome plano, peristáltico, timpânico, doloroso principalmente em andar inferior e descompressão dolorosa. Ao toque vaginal, presença de dor à mobilização do colo uterino e palpação bimanual de anexos, além da ausência de massas palpáveis em cavidade pélvica. Diante da hipótese diagnóstica provável, qual é o tratamento mais indicado para essa paciente?

- (A) Tratamento ambulatorial com ceftriaxona 250 mg, via intramuscular, associada à azitromicina 1 g, via oral, ambas em dose única.
- (B) Internação hospitalar com administração de cefoxitina 2 g, via endovenosa, a cada 6 horas, associada à doxiciclina 100 mg, via oral, a cada 12 horas.
- (C) Tratamento ambulatorial com ceftriaxona 250 mg, via intramuscular, em dose única, associada à doxiciclina 100 mg, via oral, 2 vezes ao dia, por 14 dias.
- (D) Prescrição de sintomáticos, analgésicos e antitérmicos, e orientação de retorno em 48 horas para reavaliação do quadro.
- (E) Internação hospitalar para realização de esquema antibiótico endovenoso e drenagem cirúrgica imediata.

QUESTÃO 27

Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta sobre as lesões polipoides da vesícula biliar.

- (A) Os adenomas são proliferações benignas da parede da vesícula, que podem ser fáceis de diferenciar de um adenocarcinoma no pré-operatório.
- (B) Tamanho menor que 10 mm é um fator de risco para adenocarcinoma.
- (C) Pólipos de colesterol se apresentam como lesões ecogênicas sésseis da vesícula biliar e frequentemente únicos.
- (D) Adenomiomatose é observada como uma lesão pediculada localizada comumente no infundíbulo.
- (E) O tratamento de toda lesão polipoide sintomática da vesícula biliar é a colecistectomia.

QUESTÃO 28

O medicamento de escolha no tratamento de pediculose em um pré-escolar com 2 anos de idade, previamente saudável, é:

- (A) peróxido de benzofila.
- (B) albendazol.
- (C) tiabendazol.
- (D) nitazoxamida.
- (E) permetrina.

QUESTÃO 29

Uma paciente com 49 anos de idade foi encaminhada da unidade básica de saúde para o hospital de referência devido à alteração em colposcitológico. Após colposcopia e biópsia, foi diagnosticado carcinoma de colo uterino e realizado estadiamento. Foi evidenciado tumor em colo uterino medindo 2,6 cm de diâmetro, sem acometimento de vagina ou paramétrios e sem evidência de acometimento linfonodal ou metástases à distância. Assinale a opção correta em relação ao estágio da doença e ao tratamento mais indicado para o caso, respectivamente.

- (A) IB1 e traquelectomia radical modificada.
- (B) IB2 e histerectomia radical associada à linfadenectomia pélvica.
- (C) IA1 e conização cirúrgica.
- (D) IIA1 e quimiorradioterapia.
- (E) IIB e histerectomia radical modificada com biópsia de linfonodo sentinela.

QUESTÃO 30

Um paciente, vítima de atropelamento, deu entrada no pronto-socorro com dor lombar intensa, estável hemodinamicamente, saturação 98%. Realizada tomografia computadorizada de abdome, identificou-se hematoma em retroperitônio, com possível lesão renal. Quanto ao trauma do retroperitônio, é correto afirmar que:

- (A) hematomas renais são encontrados na zona 2 do retroperitônio e comumente são autolimitados, não necessitando de intervenção cirúrgica.
- (B) na zona 3 do retroperitônio podemos encontrar a aorta abdominal.
- (C) lesões retroperitoneais na zona 1 nunca devem ser exploradas.
- (D) para explorar um hematoma renal à direita é necessário realizar a manobra de Mattox.
- (E) os traumas renais requerem tratamento cirúrgico em sua maioria, pois normalmente não são autolimitados.

QUESTÃO 31

No manejo agudo pós-parada cardíaca recomenda-se:

- (A) hipotermia com temperatura-alvo < 32 °C.
- (B) manutenção de pressão arterial sistólica > 90 mmHg.
- (C) pressão arterial média > 55 mmHg.
- (D) administração de corticosteroides.
- (E) manutenção de hipocalcemia.

QUESTÃO 32

Um menino com 8 anos de idade, sem relato de doenças crônicas ou alergias, encontra-se afebril com 3 lesões em membro superior direito, caracterizadas por pápulas arredondadas e firmes de 2 a 5 mm, da cor da pele, com superfícies brilhantes e umbilicação central. Sobre essa patologia, é correto afirmar que:

- (A) o paciente necessita de tratamento imediatamente, com afastamento das atividades escolares.
- (B) seu crescimento é estimulado pelo Papiloma vírus (HPV).
- (C) as lesões são autolimitadas e a necessidade de tratamento é controversa.
- (D) a confirmação diagnóstica se dá por sorologia.
- (E) o tratamento medicamentoso é feito através do aciclovir oral.

QUESTÃO 33

A avaliação de uma queixa relacionada com as mamas inclui anamnese e exame físico completos, frequentemente acompanhados de exames complementares de imagem e, em alguns casos, biópsia e exame de anatomia patológica. Assinale a alternativa correta em relação às doenças da mama.

- (A) Os tumores filoides são os tumores benignos mais comuns da mama e raramente são bilaterais.
- (B) O fibroadenoma está associado ao aumento do risco de câncer de mama.
- (C) A inversão adquirida da papila mamária não constitui uma indicação para investigação cuidadosa das mamas com exames de imagem.
- (D) A doença de Mondor consiste em tromboflebite da veia axilar, que se manifesta como dor e eritema da mama e necessita de tratamento imediato com anticoagulação.
- (E) Descarga papilar unilateral sanguinolenta crônica constitui uma indicação para ressecção dos ductos acometidos.

QUESTÃO 34

O câncer de mama é responsável por aproximadamente 30% de todos os novos cânceres em mulheres, perdendo somente para o câncer de pulmão como a principal causa de morte por câncer entre as mulheres. Assinale a afirmação correta em relação aos tipos histológicos e prognóstico do câncer de mama.

- (A) O número de linfonodos positivos envolvidos e a presença de invasão extracapsular são importantes indicadores de bom prognóstico.
- (B) O carcinoma medular parece ter um crescimento mais rápido e mais agressivo do que outras formas de carcinoma.
- (C) Pacientes com tumores bem diferenciados tendem a ter resultados mais desfavoráveis do que aqueles com tumores pouco diferenciados.
- (D) O carcinoma tubular frequentemente metastatiza para os linfonodos axilares e tende a ter um prognóstico pior do que o carcinoma ductal infiltrante.
- (E) O carcinoma lobular infiltrante com frequência é bilateral ou multicêntrico e tem características clínicas mais favoráveis (grau inferior, positividade para receptores de estrogênio).

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo.

Entende-se sentença por valor preditivo positivo a probabilidade de um indivíduo avaliado e com resultado _____ ser realmente _____.

- (A) positivo / doente
- (B) negativo / normal
- (C) positivo / normal
- (D) negativo / doente
- (E) indefinido / doente

QUESTÃO 36

Uma mãe, em aleitamento exclusivo da filha com 2 meses de idade, deseja atualizar seu próprio cartão vacinal. A mãe deverá ser orientada a aguardar a filha atingir os 6 meses de idade ou suspender o aleitamento temporariamente por 10 dias para receber qual das vacinas abaixo?

- (A) Triplice Viral.
- (B) Triplice Bacteriana.
- (C) Hepatite B.
- (D) Influenza.
- (E) Febre amarela.

QUESTÃO 37

O princípio do Sistema Único de Saúde que possibilita o atendimento a povoados indígenas isolados na região norte do Brasil é:

- (A) equidade.
- (B) controle social.
- (C) universalidade.
- (D) integralidade.
- (E) hierarquização.

QUESTÃO 38

Quais são os quatro principais tipos de choque?

- (A) Cardiogênico, séptico, hipovolêmico e distributivo.
- (B) Distributivo, cardiogênico, hipovolêmico e obstrutivo.
- (C) Séptico, hipovolêmico, cardiogênico e neurogênico.
- (D) Neurogênico, anafilático, distributivo e hipovolêmico.
- (E) Hipovolêmico, distributivo, cardiogênico e neurogênico.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa que apresenta a definição correta de letalidade.

- (A) Não é uma medida híbrida, pois emprega somente dados de morbidade para seu cálculo e não os de mortalidade.
- (B) Indica a gravidade de um agravo à saúde/doença, por demonstrar a proporção de óbitos dentre o total de pessoas por ele acometidas.
- (C) É a probabilidade de evoluir a óbito por uma causa específica em determinado local e período de tempo a cada 100.000 pessoas.
- (D) Indica o percentual de óbitos por uma determinada causa, dentre o total de óbitos em dado local e período de tempo.
- (E) Indica o risco, na população geral, de evoluir a óbito por qualquer causa, em determinado lugar e período de tempo.

QUESTÃO 40

Assinale a opção que apresenta a uma das causas de sangramento vaginal no terceiro trimestre de gestação, que está associada à inserção velamentosa do cordão umbilical ou a uma placenta suscenturiada/bilobulada, e cujo sangramento de apenas 100 ml pode ser suficiente para determinar choque e morte do feto.

- (A) Placenta Acreta.
- (B) Descolamento prematuro da placenta.
- (C) Vasa prévia.
- (D) Placenta prévia.
- (E) Pólipo endocervical.

QUESTÃO 41

Uma jovem com 18 anos de idade, atualmente trabalhando como modelo fotográfica, relata que nunca está satisfeita com seu corpo, sempre se achando acima do peso quando se olha no espelho, e já recorreu a diversos tipos de dieta buscando emagrecimento. Por vezes, apresenta episódios de compulsão alimentar seguida de vômitos autoinduzidos. Apresenta Índice de Massa Corporal (IMC) atual de 15 kg/m². O diagnóstico mais provável desta afecção é:

- (A) Bulimia Nervosa.
- (B) Transtorno de Compulsão Alimentar.
- (C) Anorexia Nervosa.
- (D) Transtorno de Ruminação.
- (E) Transtorno Alimentar Restritivo/Evitativo.

QUESTÃO 42

Uma criança com 10 anos de idade é trazida pelos pais ao pronto socorro com queixa de dor abdominal, vômitos e glicemia capilar de 430 mg/dL. Após anamnese, exame físico e exames laboratoriais, recebeu o diagnóstico de cetoacidose diabética. Sobre o diagnóstico, é correto afirmar que:

- (A) a complicação mais temida da cetoacidose diabética em crianças e adolescentes é a presença de hipertensão arterial grave na admissão do paciente ao serviço de urgência.
- (B) as principais causas de cetoacidose diabética são infecções (virais ou bacterianas), falta de aderência ao tratamento e estresse emocional.
- (C) os principais sintomas da cetoacidose diabética são agitação e ganho de peso.
- (D) na cetoacidose diabética o potássio corporal total encontra-se geralmente aumentado.
- (E) o tratamento da cetoacidose diabética visa ao restabelecimento das condições gerais do paciente com restrição de líquidos na terapia inicial.

QUESTÃO 43

Na classificação da *American Society of Anesthesiology* (ASA) de avaliação do estado clínico para risco cirúrgico, o paciente que apresenta doença sistêmica grave que resulta em debilidade funcional não incapacitante corresponde ao tipo:

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV
- (E) V

QUESTÃO 44

O teste da oximetria (ou teste do coraçãozinho) é um exame de triagem neonatal realizado dentro das maternidades. Sobre esse teste, é correto afirmar que:

- (A) deve ser realizado ao nascer, na sala de parto.
- (B) o sensor deve ser colocado na mão esquerda e no membro inferior direito.
- (C) quando o teste for alterado, deve-se aguardar 24 horas para repeti-lo.
- (D) medidas da saturação de oxigênio menores que 95%, ou diferença de 3% ou mais entre as medidas do membro superior direito e membro inferior, são consideradas como resultado anormal.
- (E) caso o teste tenha resultado alterado em duas aferições, o melhor exame para investigação é o eletrocardiograma.

QUESTÃO 45

Uma criança com 18 meses de idade é trazida pelos pais após apresentar pico febril de 38,5 °C e movimentos tônicos-clônicos generalizados, que se iniciaram há 3 minutos. Assinale a opção que apresenta a sequência mais indicada para a abordagem inicial em crise, na sala de emergência.

- (A) Cabeça retificada com o pescoço, verificação da permeabilidade das vias aéreas, oxigenioterapia por máscara ou cateter nasal, acesso venoso e monitorização contínua.
- (B) Acesso venoso, cabeça retificada com o pescoço, verificação da permeabilidade de vias aéreas e oxigenioterapia por máscara ou cateter nasal.
- (C) Acesso venoso, rotina laboratorial completa e radiografia de tórax.
- (D) Acesso venoso, dipirona, oxigenioterapia por máscara ou cateter nasal e cabeça retificada com o pescoço.
- (E) Exames e monitorização, cabeça retificada com o pescoço e oxigenioterapia por máscara ou cateter nasal.

QUESTÃO 46

O divertículo de Meckel é a anomalia congênita mais encontrada no intestino delgado. Sobre ele, é correto afirmar que:

- (A) é encontrado na borda mesentérica do íleo, de 45 a 60 cm proximal à válvula ileocecal.
- (B) o tecido heterotópico mais comum encontrado dentro do divertículo é o gástrico.
- (C) o tratamento de um divertículo de Meckel sintomático pode ser conservador.
- (D) a apresentação clínica mais comum é o quadro de obstrução intestinal.
- (E) o diagnóstico pode ser feito por Endoscopia Digestiva Alta (EDA).

QUESTÃO 47

Qual a causa mais comum de Hemorragia Subaracnoidea, excluindo-se o traumatismo intracraniano?

- (A) Malformação arteriovenosa.
- (B) Fístula arteriovenosa dural.
- (C) Ruptura de aneurisma sacular.
- (D) Causa idiopática.
- (E) Fístula arteriovenosa subdural.

QUESTÃO 48

Uma paciente com 22 anos de idade, após o término de um relacionamento amoroso há 2 meses, iniciou sintomas de humor predominantemente triste ao longo do dia. Relata que não aprecia mais sair de casa para encontrar seus amigos. Apresenta insônia e sensação de cansaço diário, além de marcada dificuldade para se concentrar em tarefas do cotidiano. Pode-se afirmar que o diagnóstico mais provável seja:

- (A) distimia.
- (B) transtorno de estresse agudo.
- (C) luto patológico.
- (D) episódio depressivo maior.
- (E) transtorno de pânico

QUESTÃO 49

Sobre as hérnias inguinais, é correto afirmar que:

- (A) as hérnias indiretas ocorrem no triângulo de Hesselbach.
- (B) o ramo femoral do nervo genitofemoral inerva o músculo cremaster.
- (C) as fibras do músculo cremastérico se originam do músculo oblíquo externo.
- (D) os vasos epigástricos superiores servem de referencial para se definirem os tipos de hérnia inguinal.
- (E) os vasos epigástricos inferiores são ramos dos vasos ilíacos externos.


QUESTÃO 50

Um paciente com 36 anos de idade apresentou sintomas de redução da necessidade do sono, sensação de grandiosidade, aumento da libido e aceleração dos pensamentos. Apresentou tais sintomas por 10 dias consecutivos, 5 vezes no último ano. Sobre a afecção desse paciente, é correto afirmar que se trata de provável diagnóstico de:

- (A) Ciclotimia.
- (B) Distimia.
- (C) Transtorno Afetivo Bipolar, sendo a medicação mais indicada a Lamotrigina.
- (D) Transtorno Afetivo Bipolar, sendo a medicação indicada o Ácido Valproico.
- (E) Esquizofrenia, sendo a medicação mais indicada a Clozapina.

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas: o caderno é composto por uma prova escrita objetiva com 50 questões de múltipla escolha. Escreva e assine corretamente seu nome, coloque seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de **3 (três) horas**, incluindo o tempo necessário à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo sua execução quando determinado;
- 4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela Marinha do Brasil;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova; em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 6 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 7 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de **90 minutos**.
- 8 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e suas provas não serão levadas em consideração o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; e
 - e) cometer ato grave de indisciplina.
- 9 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta de material transparente;
 - b) escreva seu nome em letra legível no local indicado;
 - c) assine seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas, sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que a corrigirá; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 10 - Preencha a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:



Diretoria de Ensino da Marinha

Nome: **ROBERTO SILVA**

Assinatura: **Roberto Silva**

PREENCHIMENTO DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO

5	7	0	2	0	7
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
2	3	4	5	6	7
8	9	0	1		