

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AOS
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
PRM/2017***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ESPECIALIDADES COM ACESSO DIRETO

Anestesiologia	Oftalmologia
Cirurgia Geral	Ortopedia e Traumatologia
Clínica Médica	Otorrinolaringologia
Ginecologia e Obstetrícia	Patologia
Infectologia	Pediatria
Medicina Nuclear	Psiquiatria
Neurologia	Radiologia e Diagnóstico por Imagem

QUESTÃO 1

Em relação aos contraceptivos orais combinados, pode-se afirmar que aumentam

- (A) o risco de câncer de endométrio.
- (B) o risco de câncer de ovário.
- (C) os níveis basais de FSH e LH.
- (D) o risco de trombose venosa.
- (E) o risco de gravidez ectópica.

QUESTÃO 2

Qual a causa mais frequente de hemorragia gastrointestinal alta?

- (A) Lacerações de Mallory-Weiss.
- (B) Doença péptica ulcerosa.
- (C) Varizes esofágicas.
- (D) Lesões maligna.
- (E) Esôfago de Barrett.

QUESTÃO 3

A localização do divertículo de Zenker é

- (A) faringoesofágica.
- (B) parabrônquio
- (C) supradiafragmática
- (D) esôfago médio
- (E) epifrênica.

QUESTÃO 4

O tratamento adequado do espasmo esofágico difuso consiste em

- (A) esofagomiotomia a Heller.
- (B) fundoplicatura de Toupet.
- (C) fundoplicatura a dor.
- (D) intervenções farmacológicas ou endoscópicas.
- (E) esofagectomia com transposição de tubo gástrico.

QUESTÃO 5

O suprimento sanguíneo arterial da glândula tireoide é efetuado por quatro artérias principais. A origem mais comum da artéria tireoidea inferior é

- (A) artéria carótida externa.
- (B) artéria carótida interna.
- (C) artéria intervertebral.
- (D) artéria inominada.
- (E) tronco tirocervical.

QUESTÃO 6

O exame ideal para diagnosticar acalásia em seus estágios iniciais é

- (A) endoscopia digestiva alta.
- (B) ph metria esôfago-gástrica.
- (C) manometria esôfago gástrica.
- (D) biópsia esofágica.
- (E) reação de Machado Guerreiro.

QUESTÃO 7

Paciente jovem, 34 anos, militar da ativa, previamente saudável, admitido na enfermaria do seu quartel com febre 39 graus e sonolência. No caminho para emergência apresentou crise convulsiva tônico clônica generalizada. Após tomografia computadorizada de crânio sem alterações, foi submetido à punção de líquido cefalorraquidiano com pressão de abertura elevada. Qual esquema antimicrobiano mais indicado nesse caso?

- (A) Ampicilina 4 g intravenoso a cada 24 horas.
- (B) Cefepime 2g intravenoso de 8 em 8 horas.
- (C) Vancomicina 2g intravenoso de 12 em 12 horas.
- (D) Ciprofloxacino 400 mg intravenoso de 12 em 12 horas.
- (E) Ceftriaxona 2g intravenoso de 12 em 12 horas.

QUESTÃO 8

A principal queixa das mulheres na perimenopausa é

- (A) fogacho.
- (B) ressecamento vaginal.
- (C) labilidade emocional.
- (D) ganho de peso.
- (E) fadiga.

QUESTÃO 9

A melhor conduta para uma criança de três anos com hérnia umbilical encarcerada e cerca de 2,5cm de diâmetro de anel herniário é

- (A) reparo cirúrgico da falha aponeurótica.
- (B) reparo cirúrgico com tela inabsorvível.
- (C) reparo cirúrgico com tela absorvível.
- (D) observação até a criança completar 6 anos.
- (E) observação até a criança completar 10 anos.

QUESTÃO 10

A síndrome de Patau é uma trissomia cromossômica do par

- (A) 8
- (B) 12
- (C) 13
- (D) 18
- (E) 21

QUESTÃO 11

Sobre Tromboembolismo Pulmonar, marque a opção INCORRETA.

- (A) O dímero D é altamente sensível.
- (B) A dispneia é o sinal clínico mais comum.
- (C) Taquicardia sinusal é a alteração eletrocardiográfica mais comum encontrada.
- (D) Pode cursar com hemoptise.
- (E) A Ecografia não é um exame de imagem diagnóstico confiável para embolia pulmonar aguda.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que relaciona corretamente o princípio constitucional do SUS e sua descrição.

- (A) Universalidade - Tratar as diferenças em busca da igualdade.
- (B) Integralidade - Todas as necessidades de saúde do indivíduo devem ser atendidas.
- (C) Universalidade - Todas as necessidades de saúde do indivíduo devem ser atendidas.
- (D) Integralidade - Todos os indivíduos tem direito ao acesso.
- (E) Equidade - Todos os indivíduos tem direito ao acesso.

QUESTÃO 13

A mãe de adolescentes gêmeares de 8 anos foi ao consultório levando Gabriela e Rafael com questionamento sobre os primeiros sinais da puberdade dos filhos. O primeiro sinal encontrado nos sexos feminino e masculino, respectivamente, são:

- (A) crescimento do broto mamário e aumento de testículo.
- (B) aparecimento de pelos pubianos e aumento da glândula.
- (C) estirão estatural e aumento do pênis.
- (D) aparecimento de pelos pubianos e voz grave.
- (E) menarca e voz grave.

QUESTÃO 14

Segundo determinação do Ministério da Saúde, nenhum RN deverá receber alta da Maternidade sem receber as seguintes vacinas:

- (A) BCG e Hepatite B.
- (B) Sabin e BCG.
- (C) Tetravalente e Hepatite B.
- (D) Febre Amarela e BCG.
- (E) HPV e Tetravalente.

QUESTÃO 15

A Asbestose é uma doença ocupacional que acomete principalmente trabalhadores da construção marítima, sobre essa doença, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É menos frequente nos países desenvolvidos.
- (B) Trata-se de doença fibrosante intersticial difusa dos pulmões.
- (C) O período de latência mínima entre a exposição e o aparecimento de câncer de pulmão é de aproximadamente 15-19 anos.
- (D) Estes pacientes costumam ser mais acometidos por Mesotelioma do que por câncer de pulmão.
- (E) Não há tratamento específico.

QUESTÃO 16

A frequência da infecção urinária é maior no sexo masculino

- (A) no primeiro ano de vida.
- (B) na criança em idade pré-escolar.
- (C) na criança em idade escolar.
- (D) na adolescência.
- (E) até a retirada da fralda.

QUESTÃO 17

Paciente 28 anos chega no consultório queixando-se de dor em região anterior do pescoço iniciada há cerca de 15 dias após episódio gripal. No exame físico você observa aumento da tireoide de forma assimétrica e bastante dolorida à palpação. Seus exames laboratoriais evidenciaram hormônios tireoidianos elevados e TSH baixo. A captação de iodo radioativo também foi baixa. Qual o diagnóstico mais provável para esse paciente?

- (A) Tireoidite de Riedel.
- (B) Bócio multinodular atóxico.
- (C) Tireoidite de De Quervain.
- (D) Tireoidite de Hashimoto.
- (E) Adenoma hipofisário.

QUESTÃO 18

Um lactente de 6 meses foi atendido no pronto socorro com história de febre, coriza e tosse há 7 dias, tendo sido feito diagnóstico de pneumonia e medicado com amoxicilina. Após 48 horas, na revisão agendada, não apresentou melhora e foi encaminhado para internação. Exame físico: regular estado geral, acianótico, dispneico, FR = 52irpm e com tiragem subcostal. Radiografia de tórax: condensação em base de lobo inferior direito e derrame pleural à direita. O agente etiológico mais provável é

- (A) *Staphylococcus aureus*.
- (B) *Streptococcus pneumoniae*.
- (C) *Mycoplasma pneumoniae*.
- (D) *Haemophilus influenzae* tipo B.
- (E) *Chlamydia pneumoniae*.

QUESTÃO 19

A desnutrição proteica é a complicação mais significativa e específica de qual técnica de cirurgia bariátrica?

- (A) Gastrectomia tipo Sleeve.
- (B) By-pass gástrico.
- (C) Desvio biliopancreático.
- (D) Banda gástrica ajustável laparoscópica.
- (E) Desvio biliopancreático com derivação duodenal.

QUESTÃO 20

É considerado método de eleição para avaliação do grau de anemia fetal em gestações complicada por doença hemolítica perinatal

- (A) Cordocentese.
- (B) Cardiotocografia.
- (C) Ultrassonografia obstétrica.
- (D) Doppler da artéria cerebral média.
- (E) Espectrofotometria do líquido amniótico.

QUESTÃO 21

Uma menina com 8 anos de idade recebe diagnóstico de escarlatina. A causa das manifestações cutâneas observadas na doença e seu tratamento, respectivamente, são:

- (A) endotoxina pirogênica do estreptococo do grupo B e amoxicilina durante 10 dias.
- (B) toxina eritrogênica do estreptococo do grupo A e eritromicina durante 7 dias.
- (C) endotoxina pirogênica do estreptococo do grupo B e amoxicilina durante 7 dias.
- (D) toxina eritrogênica do estreptococo do grupo A e amoxicilina durante 10 dias.
- (E) endotoxina pirogênica do estreptococo do grupo B e eritromicina durante 7 dias.

QUESTÃO 22

Uma criança de 9 anos, com diagnóstico de asma, tem apresentado, nos últimos 3 meses, crises noturnas 2 vezes por semana. Geralmente, são sibilos expiratórios, tosse e dor no peito. Faz uso de broncodilatador de alívio, mas ultimamente tem ido à Emergência para alívio da crise, o que tem ocasionado ausências escolares. Esse quadro pode ser classificado, quanto à gravidade, como

- (A) intermitente.
- (B) persistente leve.
- (C) persistente moderada.
- (D) persistente grave.
- (E) contínua.

QUESTÃO 23

Idoso 62 anos, saudável, morador da Capital de São Paulo, procura posto de saúde dizendo querer atualizar seu cartão de vacinação. Ao apresentá-lo, as últimas vacinas aplicadas nos últimos 10 anos foram Febre Amarela há 3 anos e Influenza há 2 meses. Qual vacinação você sugeriria de acordo com o calendário nacional de vacinação de 2015?

- (A) Reforço contra dupla bacteriana.
- (B) Tetra viral.
- (C) Uma dose da tríplice viral.
- (D) Reforço contra febre amarela.
- (E) Reforço contra hepatite B.

QUESTÃO 24

O molusco contagioso é uma afecção da pele que acomete preferencialmente crianças. Quais são a sua etiologia e a principal forma de tratamento?

- (A) Viral e curetagem.
- (B) Viral e excisão.
- (C) Bacteriana e curetagem.
- (D) Bacteriana e drenagem.
- (E) Fúngica e excisão.

QUESTÃO 25

Paciente de 40 anos, procurou o ambulatório de ginecologia, queixando-se de episódios de sangramento transvaginal irregular e dor lombar à direita. Realizou biópsia de tumoração no colo uterino com diagnóstico de carcinoma de células escamosas. Exame de imagem revelou estenose ureteral e hidronefrose à direita. O correto estadiamento para o caso descrito é

- (A) Ib2.
- (B) Iib.
- (C) IIIa.
- (D) IIIb.
- (E) IVa.

QUESTÃO 26

O melhor período para realizar o tratamento cirúrgico da distopia testicular é

- (A) nos primeiros dias de vida.
- (B) próximo aos 6 meses de vida.
- (C) em torno de 1 ano de idade.
- (D) em torno de 5 anos de idade.
- (E) em torno de 10 anos de idade.

QUESTÃO 27

Em relação à candidíase vulvovaginal, é correto afirmar que

- (A) é frequente a associação com vaginose bacteriana.
- (B) a microscopia da secreção vaginal revela células indicadoras (clue cells).
- (C) o teste das aminas é positivo.
- (D) a secreção vaginal é acinzentada com "odor de peixe".
- (E) o pH da vagina é normal (menor que 4,5).

QUESTÃO 28

A hemorragia indolor durante a gestação, sem relação com esforço físico ou traumatismo, é o sinal mais importante de placenta prévia. A confirmação do diagnóstico de placenta prévia deve ser realizado por meio de

- (A) ultrassonografia transvaginal
- (B) ultrassonografia abdominal.
- (C) toque vaginal.
- (D) exame especular.
- (E) cardiotocografia.

QUESTÃO 29

Uma senhora, 57 anos, diagnosticada com Síndrome de Sjögren há 5 anos. Foi orientada por um amigo médico sobre o seu risco aumentado (maior que o da população geral) de apresentar neoplasias, principalmente quando se trata de

- (A) câncer de pulmão.
- (B) câncer de boca.
- (C) linfoma.
- (D) mesotelioma.
- (E) câncer de reto.

QUESTÃO 30

Paciente no décimo dia após histerectomia total abdominal, por miomatose uterina, procurou atendimento referindo perda involuntária de urina pela vagina que foi confirmada ao exame especular. Foi colocado um tampão vaginal e realizado teste de azul de metileno através de cateter transuretral. O tampão foi retirado e encontrava-se molhado de urina azul. Trata-se de um quadro de fístula

- (A) vesicouterina.
- (B) uretrovaginal.
- (C) ureterovaginal.
- (D) retovaginal.
- (E) vesicovaginal.

QUESTÃO 31

Em uma cirurgia de urgência de hernioplastia inguinal o cirurgião diagnosticou uma hérnia estrangulada, sendo necessária ressecção de um segmento de cerca de 5cm de intestino delgado. Optou por ressecção do segmento desvitalizado e anastomose primária. O reparo contraindicado nesse caso é

- (A) Rives-Stoppa.
- (B) Trato ileopúbico.
- (C) Shouldice.
- (D) Bassini.
- (E) McVay.

QUESTÃO 32

A sífilis é uma doença infectocontagiosa passível de transmissão vertical. Durante o pré natal, uma gestante apresentou VDRL positivo e FTA-Abs negativo. A correta interpretação sorológica deste resultado, em relação ao diagnóstico de sífilis, é

- (A) falso positivo.
- (B) falso negativo.
- (C) sífilis primária.
- (D) sífilis latente.
- (E) sífilis tardia.

QUESTÃO 33

Paciente do sexo feminino, 20 anos, sexualmente ativa, foi admitida na emergência com quadro agudo de dor em andar inferior do abdômen, hipotensão arterial e taquicardia. Estava afebril e durante o exame físico evoluiu para choque hipovolêmico. A principal hipótese diagnóstica para o caso é

- (A) endometrite.
- (B) gravidez tubária rota.
- (C) torção de cisto anexial.
- (D) miomatose uterina.
- (E) adenomiose.

QUESTÃO 34

Considerando o tratamento farmacológico dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca associada à hiperpotassemia ou a insuficiência renal, marque a alternativa que contém a melhor opção terapêutica.

- (A) Inibidor de ECA.
- (B) Bloqueador de receptores de angiotensina.
- (C) Antagonista da aldosterona.
- (D) Associação hidralazida com nitrato oral.
- (E) Apenas orientar dieta e exercício físico.

QUESTÃO 35

Os dois critérios maiores de Jones para febre reumática são:

- (A) artralgia e nódulos subcutâneos.
- (B) nódulos subcutâneos e eritema marginado.
- (C) poliartrite migratória e febre.
- (D) elevação dos reagentes de fase aguda e cardite.
- (E) intervalo PR prolongado e artralgia.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que indica o agente viral mais frequentemente envolvido na gênese da cistite hemorrágica aguda.

- (A) Herpes-zóster.
- (B) Parvovírus B19.
- (C) Coxsackie.
- (D) Adenovírus.
- (E) Rinovírus.

QUESTÃO 37

Os principais agentes etiológicos da endocardite bacteriana entre pacientes pediátricos são:

- (A) Haemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae.
- (B) Pseudomonas aeruginosa e Serratia marcescens.
- (C) Streptococcus viridans e Staphylococcus aureus.
- (D) Streptococcus pneumoniae e Staphylococcus aureus.
- (E) Pseudomonas aeruginosa e Haemophilus influenzae.

QUESTÃO 38

Em relação ao tratamento da crise de asma grave aguda, marque a opção correta.

- (A) Sulfato de magnésio deve ser usado de rotina por seu efeito relaxante de musculatura lisa.
- (B) A aminofilina, apesar de muito utilizada, passou a ser proscrita mesmo nos casos de asma grave.
- (C) Em pacientes muito graves pode-se administrar Agonistas beta-dois-adrenérgico na forma intravenosa.
- (D) O fluxo de oxigênio inalatório, oferecido por máscara facial, nunca deve ultrapassar 3 litros por minuto.
- (E) Os Agonistas beta-dois-adrenérgicos inalatórios somente entram no contexto caso não haja resposta inicial aos anticolinérgicos inalatórios.

QUESTÃO 39

A bacteriúria assintomática deve ser tratada rotineiramente apenas em casos especiais, EXCETO em pacientes

- (A) grávidas.
- (B) submetidos a procedimentos urológicos.
- (C) receptores de transplante renal.
- (D) neutropênicos.
- (E) usuários crônicos de cateter vesical de demora.

QUESTÃO 40

Na abordagem de um paciente com derivação ventricular externa e cateter de monitorização contínua de Pressão Intracraniana, cujo valor está se mantendo acima de 25 mmHg, qual medida NÃO ajuda na preservação da perfusão cerebral?

- (A) Drenagem de líquor pela DVE.
- (B) Infusão de solução hipotônica.
- (C) Aumentar sedação do paciente.
- (D) Hiperventilação.
- (E) Administração intravenosa de agentes inotrópicos.

QUESTÃO 41

Lactente de 1 ano e 6 meses é levado ao serviço de saúde com história de lesões de pele que apareceram há um dia. Mãe refere que há quatro dias a criança começou a apresentar febre alta (39,5°C) e contínua. Exceto pela irritabilidade e inapetência, não apresentava, na ocasião, qualquer outro sintoma. Procurou atendimento médico no segundo dia de febre, sendo orientada observação e administração de antitérmico quando necessário. Há um dia a febre cessou abruptamente e surgiram lesões, inicialmente no tronco, que se disseminaram para a cabeça e extremidades. Ao exame físico o lactente encontra-se em bom estado geral, afebril, com exantema maculopapular rosado em tronco, cabeça e extremidades. Restante do exame físico sem alterações. Qual o mais provável agente etiológico responsável pelo quadro clínico descrito?

- (A) Parvovírus humano B19.
- (B) Vírus Epstein-Barr.
- (C) Herpes vírus humano 6 e 7.
- (D) Coxsackie B.
- (E) Togavírus.

QUESTÃO 42

Gestante na trigésima quinta semana é admitida com quadro de dor abdominal, hipertonia uterina, sangramento vaginal de média intensidade e taquicardia fetal ao sonar. O toque vaginal revela dilatação cervical de 3 cm. A conduta obstétrica a ser adotada é

- (A) acelerar o parto vaginal com ocitócitos.
- (B) realizar cesariana.
- (C) monitorar o feto com cardiotocografia.
- (D) realizar amniotomia.
- (E) iniciar tocolíticos.

QUESTÃO 43

A conduta a ser realizada em um recém-nascido cuja mãe é positiva para o HBsAg durante a gestação é

- (A) administração da imunoglobulina anti-hepatite B nas primeiras 12 horas.
- (B) administração da vacina anti-hepatite B nas primeiras 12 horas.
- (C) administração da imunoglobulina anti-hepatite B nas primeiras 48 horas.
- (D) administração da vacina anti-hepatite B e imunoglobulina anti-hepatite B nas primeiras 12 horas.
- (E) aguardar 1 mês e fazer a sorologia do RN.

QUESTÃO 44

A classificação de Clark para melanoma invasivo foi proposta em 1969 e relaciona a extensão da invasão tumoral com as camadas anatômicas da pele. Os tumores que estendem-se para dentro da derme papilar e também apresentam um excelente prognóstico são classificados como Clark de nível

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

QUESTÃO 45

Jovem, 26 anos, vítima de acidente por queda da moto, apresenta esmagamento de membro inferior esquerdo. Admitido na emergência, apresentando agitação, taquicardia, desorientação, oligoanúria, e urina acastanhada. Sua perna esquerda apresentava-se edemaciada e pálida. Seus primeiros exames laboratoriais evidenciaram Creatinofosfoquinase de 34.000 U/L; Ureia 187 mg/dL e Creatinina = 2,8 mg/dL. Qual a principal suspeita clínica diagnóstica?

- (A) Sepses.
- (B) Doença de Lyme
- (C) Acidente Vascular Encefálico.
- (D) Rabdomiólise.
- (E) Glomerulonefrite.

QUESTÃO 46

As condições fetais abaixo relacionadas estão associadas à oligodramnia, EXCETO:

- (A) crescimento intrauterino restrito.
- (B) atresia de esôfago.
- (C) doença renal.
- (D) pós maturidade.
- (E) amniorrexe prematura.

QUESTÃO 47

Na doença de Kawasaki, a complicação clássica é o aneurisma coronariano. Para evitar sua ocorrência, deve-se instituir uma terapêutica baseada no uso combinado de

- (A) antibiótico e gamaglobulina humana.
- (B) ácido acetilsalicílico e gamaglobulina humana.
- (C) ácido acetilsalicílico e corticóide.
- (D) ciclofosfamida e gamaglobulina humana.
- (E) ciclofosfamida e plasmaferese.

QUESTÃO 48

Paciente 70 anos, portadora de cirrose hepática pelo vírus C, admitida na enfermaria de clínica Médica por encefalopatia hepática inicial. Na anamnese e exame físico você descobre que, apesar de apresentar ascite, ela nunca precisou de paracentese de alívio. Seus exames evidenciaram: bilirrubinas totais de 2,3 mg/dL, INR de 1,6 e albumina de 2,5 g/dL. Marque a alternativa que fornece a correta classificação de Child-Pugh desta paciente, e quanto à indicação ou não de transplante hepático:

- (A) Child-Pugh A, sem indicação de transplante.
- (B) Child-Pugh B, sem indicação de transplante.
- (C) Child-Pugh B, com indicação de transplante.
- (D) Child-Pugh C, sem indicação de transplante.
- (E) Child-Pugh C, com indicação de transplante.

QUESTÃO 49

Sobre a Doença de Hodgkin, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e assinale a opção correta.

- () Adenopatia hilar pode levar a tosse.
- () Os paciente com sintomas tipo B costumam fazer um ciclo completo de quimioterapia.
- () Apresenta-se geralmente por aumento assintomático de linfonodo.
- () A cura aproxima-se de 60% em paciente com doença localizada.
- () Os sintomas tipo B incluem: febre, sudorese noturna e emagrecimento.

- (A) (V) (F) (F) (F) (V)
- (B) (V) (V) (V) (F) (V)
- (C) (F) (F) (V) (V) (V)
- (D) (F) (V) (F) (F) (F)
- (E) (V) (V) (V) (F) (F)


QUESTÃO 50

Paciente homem, 65 anos, trazido ao consultório por sua filha que relata que nos últimos meses ele vem apresentando momentos de desorientação, esquecimentos, não consegue mais realizar as tarefas diárias sozinho. Como é a primeira consulta, você solicita exames investigando causas reversíveis de demência, dentre elas:

- (A) infecção crônica, tumor cerebral e hipotireoidismo.
- (B) deficiência de tiamina, hematoma subdural e demência frontotemporal.
- (C) hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12 e leucoencefalopatas.
- (D) infecção crônica, hidrocefalia normobárica e Alzheimer.
- (E) hipotireoidismo, tumor cerebral e Doença de Huntington.

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
- 4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 6 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 7 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 8 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 90 minutos.
- 9 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
 - e) cometer ato grave de indisciplina; e
 - f) comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 10 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assine o seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:



Nome: ROBERTO SILVA

Assinatura: Roberto Silva

Instruções de Preenchimento

- * Não rasure esta folha.
- * Não rabique nas áreas de respostas.
- * Faça marcas sólidas nos círculos.
- * Não use canetas que borrem o papel.

ERRADO: CORRETO:

PREENCHIMENTO DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO						DV	P	G
5	7	0	2	0	7	0	2	4
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8	9	0	1
2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8

02 (A) (B) (C) (D) (E)	27 (A) (B) (C) (D) (E)
03 (A) (B) (C) (D) (E)	28 (A) (B) (C) (D) (E)
04 (A) (B) (C) (D) (E)	29 (A) (B) (C) (D) (E)
05 (A) (B) (C) (D) (E)	30 (A) (B) (C) (D) (E)
06 (A) (B) (C) (D) (E)	31 (A) (B) (C) (D) (E)
07 (A) (B) (C) (D) (E)	32 (A) (B) (C) (D) (E)
08 (A) (B) (C) (D) (E)	33 (A) (B) (C) (D) (E)
09 (A) (B) (C) (D) (E)	34 (A) (B) (C) (D) (E)
10 (A) (B) (C) (D) (E)	35 (A) (B) (C) (D) (E)
11 (A) (B) (C) (D) (E)	36 (A) (B) (C) (D) (E)
12 (A) (B) (C) (D) (E)	37 (A) (B) (C) (D) (E)
13 (A) (B) (C) (D) (E)	38 (A) (B) (C) (D) (E)
14 (A) (B) (C) (D) (E)	39 (A) (B) (C) (D) (E)
15 (A) (B) (C) (D) (E)	40 (A) (B) (C) (D) (E)
16 (A) (B) (C) (D) (E)	41 (A) (B) (C) (D) (E)
17 (A) (B) (C) (D) (E)	42 (A) (B) (C) (D) (E)
18 (A) (B) (C) (D) (E)	43 (A) (B) (C) (D) (E)
19 (A) (B) (C) (D) (E)	44 (A) (B) (C) (D) (E)
20 (A) (B) (C) (D) (E)	45 (A) (B) (C) (D) (E)
21 (A) (B) (C) (D) (E)	46 (A) (B) (C) (D) (E)
22 (A) (B) (C) (D) (E)	47 (A) (B) (C) (D) (E)
23 (A) (B) (C) (D) (E)	48 (A) (B) (C) (D) (E)
24 (A) (B) (C) (D) (E)	49 (A) (B) (C) (D) (E)
25 (A) (B) (C) (D) (E)	50 (A) (B) (C) (D) (E)

T
A
R
J
A

- 12 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50