

**MARINHA DO BRASIL**  
**SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA**

***PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO,  
SOB A FORMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO  
PARA ENFERMEIROS, NOS MOLDES DE  
RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL  
NAVAL MARCÍLIO DIAS  
C-EENF/2022***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**ENFERMAGEM**

### QUESTÃO 1

Segundo a resolução COFEN nº 564/2017, Capítulo V, que dispõe sobre a aplicação das penalidades, o profissional de enfermagem que promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa, está sujeito a quais penalidades?

- (A) Advertência verbal, multa, censura e suspensão.
- (B) Advertência verbal, censura, suspensão e demissão.
- (C) Multa, censura, suspensão e cassação.
- (D) Advertência verbal, multa, suspensão e demissão
- (E) Advertência verbal, censura, suspensão e cassação.

### QUESTÃO 2

A Resolução, RDC Nº 36, de 25 de julho de 2013 tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Quanto ao capítulo II, das Condições organizacionais, seção I, assinale a alternativa que aborda um dos princípios e diretrizes do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP).

- (A) Desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional no serviço de saúde.
- (B) Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde.
- (C) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco.
- (D) Recursos humanos, financeiros, equipamentos, insumos e materiais.
- (E) Um profissional responsável pelo NSP com participação nas instâncias deliberativas do serviço de saúde.

### QUESTÃO 3

O uso das Teorias de Enfermagem oferece estrutura e organização ao conhecimento de enfermagem, proporcionando um meio sistemático de coletar dados para se descrever, explicar e prever a prática de enfermagem. As teorias devem direcionar as ações dos enfermeiros, de modo a que possa responsabilizá-los pelos cuidados a serem prestados aos pacientes, não mais executados de maneira empírica, tendo em sua estrutura os seguintes componentes:

- (A) conteúdo, processo e ambiente.
- (B) contexto, conteúdo e processo.
- (C) processo, saúde e conteúdo.
- (D) contexto, pessoa e ambiente.
- (E) saúde, processo e pessoa.

### QUESTÃO 4

Conforme Potter e Perry (2018), a natureza e extensão da cirurgia de um paciente e estado físico atual influenciam o tipo de anestesia administrada durante a cirurgia. O enfermeiro deve conhecer as complicações para antecipar o pós-cirúrgico para cada tipo. Assinale a alternativa que corresponde às complicações da anestesia geral.

- (A) Nefrotoxicidade, urticária e lesão da medula espinhal.
- (B) Dor de cabeça da coluna vertebral, hipotermia e depressão respiratória.
- (C) Hipertermia maligna, laringoespasmo e diminuição do débito cardíaco.
- (D) Diminuição do débito cardíaco, nefrotoxicidade e erupção cutânea
- (E) Hipóxia, hipertermia maligna e urticária.

### QUESTÃO 5

As infecções da corrente sanguínea (ICS) associadas a cateteres centrais estão relacionadas a importantes desfechos desfavoráveis em saúde. No Período de Janela da Infecção Primária de Corrente Sanguínea Laboratorialmente Confirmada (IPCSL) são identificados todos os elementos (sinais, sintomas, resultados de exames de imagens e/ou laboratoriais) necessários para a definição da infecção. Para a identificação do período de janela da IPCSL deve-se considerar:

- (A) um dia antes e um dia depois da data da primeira hemocultura positiva.
- (B) dois dias antes e dois dias depois da data da primeira hemocultura positiva.
- (C) três dias antes e três dias depois da data da primeira hemocultura positiva.
- (D) quatro dias antes e quatro dias depois da data da primeira hemocultura positiva.
- (E) cinco dias antes e cinco dias depois da data da primeira hemocultura positiva.

### QUESTÃO 6

A denominação clássica para transtorno amnésico persistente induzido por álcool é composta por Encefalopatia de Wernicke (um conjunto de sintomas agudos) e Síndrome de Korsakoff (uma condição crônica). Enquanto a encefalopatia de Wernicke é totalmente reversível com tratamento, apenas 20% dos pacientes com síndrome de Korsakoff se recuperam. A conexão fisiopatológica entre as duas síndromes causada por maus hábitos nutricionais ou por problemas de absorção se caracteriza pela deficiência de:

- (A) tiamina (vitamina B1).
- (B) riboflavina (vitamina B2).
- (C) niacina (vitamina B3).
- (D) ácido pantotênico (vitamina B5).
- (E) piridoxina (Vitamina B6).

### QUESTÃO 7

Conforme o Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Higienização das Mãos (2009), é correto afirmar, sobre o álcool, que:

- (A) os alcóois têm alta atividade contra os esporos e oocistos de protozoários.
- (B) etanol a 70% é menos efetivo que o sabonete comum contra os rotavírus.
- (C) os alcóois têm longa ação microbicida quando aplicados à pele, mas não têm atividade residual apreciável.
- (D) as preparações alcoólicas são apropriadas quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com material protéico.
- (E) os alcóois também são efetivos na antisepsia cirúrgica ou no preparo pré-operatório das mãos dos integrantes das equipes cirúrgicas.

### QUESTÃO 8

De acordo com Meltzer (2001), o propranolol é um bloqueador dos beta-receptores cardíacos, inibindo assim a secreção de catecolamina ao nível dos receptores celulares. Qual é a contraindicação quanto ao uso do propranolol?

- (A) Taquiarritmias supraventriculares.
- (B) Extrassístoles ventriculares.
- (C) Taquiarritmias por intoxicação digitalica.
- (D) Asma brônquica e broncoespasmos.
- (E) Profilaxia de enxaqueca.

### QUESTÃO 9

Segundo Araújo e Reis (2021), qual a patologia mais frequente no período neonatal?

- (A) Comunicação interatrial.
- (B) Anemia neonatal.
- (C) Policitemia.
- (D) Hiperbilirrubinemia Neonatal.
- (E) Fenda palatina e labial.

### QUESTÃO 10

Segundo Brunner e Suddarth (2015), as complicações locais da terapia IV incluem infiltração e extravasamento, flebite, tromboflebite, hematoma e coagulação da agulha. A flebite que pode ser causada por um medicamento ou uma solução irritante, velocidades de infusão rápidas e incompatibilidades medicamentosas, é caracterizada como:

- (A) mecânica.
- (B) física.
- (C) bacteriana.
- (D) biológica.
- (E) química.

### QUESTÃO 11

A Norma Regulamentadora, NR 32, tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Segundo esta, deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra:

- (A) tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
- (B) febre amarela, hepatite B, tétano e rubéola.
- (C) difteria, tuberculose, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
- (D) varicela, hepatite B, tétano e febre amarela.
- (E) tétano, difteria, varicela e os estabelecidos no PCMSO.

### QUESTÃO 12

Na avaliação física do recém-nascido são potenciais sinais de preocupação ou anormalidades maiores:

- (A) nevo flâmeco.
- (B) cefalematoma.
- (C) estrabismo.
- (D) mília.
- (E) sinus pré-auricular.

### QUESTÃO 13

Meltzer (2001) classifica como pequenas arritmias, EXCETO:

- (A) taquicardia sinusal.
- (B) extrassístoles juncionais.
- (C) marcapasso migratório.
- (D) taquicardia atrial.
- (E) bradicardia sinusal.

### QUESTÃO 14

Segundo Araújo e Reis (2021), assinale a alternativa correta sobre a síndrome do coração esquerdo hipoplásico.

- (A) Trata-se de uma cardiopatia congênita acianótica.
- (B) O sangue do átrio esquerdo se mistura com o átrio direito através do forame oval, fluindo para o ventrículo direito e artéria pulmonar.
- (C) O sangue de ambos os ventrículos se misturam na grande artéria comum.
- (D) Ocorre aumento do fluxo de sangue pulmonar.
- (E) Ocorre obstrução do fluxo sanguíneo a partir dos ventrículos.

### QUESTÃO 15

De acordo com Kurgant (2016), no processo do trabalho gerencial em enfermagem, a função do planejamento costuma figurar como uma das atividades desenvolvidas privativamente pelos enfermeiros, em virtude da divisão social e técnica do trabalho, estando associado ao planejamento da assistência de enfermagem ou ao gerenciamento do serviço.

Qual é a fase do planejamento normativo ou tradicional que engloba a execução do programa, sua aprovação pelas instâncias superiores e sua concretização, além da ação e da coordenação?

- (A) Desenvolvimento.
- (B) Seleção dos recursos disponíveis
- (C) Diagnóstico.
- (D) Aperfeiçoamento.
- (E) Estabelecimento de prioridades.

### QUESTÃO 16

De acordo com Carmagnani (2017), em relação ao banho pré-operatório, é correto afirmar que:

- (A) o banho pré-operatório deve ser realizado apenas em paciente que serão submetidos à cirurgia de médio e grande porte.
- (B) deve ser realizado até 2 h antes do procedimento cirúrgico.
- (C) deve envolver todo o corpo, exceto o couro cabeludo e as unhas.
- (D) em cirurgia na cavidade oral, deverá ser realizada a higiene oral com solução antisséptica de gliconato de clorexidina 0,12% (sem álcool).
- (E) todos os curativos e fixações devem ser retirados e mantidos abertos após o término do banho conforme prescrição de enfermagem.

### QUESTÃO 17

Segundo o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (2017), qual das alternativas constitui uma estratégia especial de prevenção de ITU (infecção do trato urinário) associado a um cateter urinário?

- (A) Utilizar rotineiramente cateter impregnado com prata ou outro antimicrobiano.
- (B) Monitorar rotineiramente bacteriúria assintomática em pacientes com cateter.
- (C) Tratar bacteriúria assintomática, exceto antes de procedimento urológico invasivo.
- (D) Realizar rotineiramente irrigação do cateter.
- (E) Desenvolver e implantar política de revisão contínua, diária, da necessidade de manutenção do cateter.

### QUESTÃO 18

Segundo Meltzer (2001), sobre o medicamento lidocaína, assinale a alternativa ERRADA.

- (A) Indicado para tratamento de extra-sístoles e taquicardias ventriculares.
- (B) Em doses normais, sua administração não altera o débito cardíaco e a pressão arterial sistêmica.
- (C) A lidocaína é administrada quase que exclusivamente por via venosa, exceto, em raras ocasiões, quando é administrada por via intramuscular.
- (D) Pacientes com conhecida hipersensibilidade a anestésicos locais não devem receber esta droga.
- (E) Controla as arritmias ventriculares através do efeito depressivo sobre a automaticidade do sistema do nodo sinusal, elevando o limiar de excitação dos ventrículos.

### QUESTÃO 19

Segundo Carmagnani *et al* (2017), medicamentos que não podem ser absorvidos diretamente pela mucosa gástrica são administrados por via intramuscular (IM). Sobre esta via é correto afirmar que:

- (A) o medicamento administrado via IM pode ser misturado com qualquer outro medicamento na mesma seringa.
- (B) a administração intramuscular é contraindicada em pacientes com próteses, na região da prótese (por exemplo, prótese de glúteo).
- (C) os locais de aplicação (músculos) não devem ser alternados durante o tratamento.
- (D) a reconstituição de medicamentos apresentados em forma de pó ou liofilizado deve ser realizada utilizando-se o diluente recomendado pelo médico.
- (E) se o volume a ser administrado ultrapassar a capacidade do músculo (3 ml para indivíduos adultos), a dose deve ser fracionada e aplicada em mais de um local.

### QUESTÃO 20

Segundo Viana e Torre (2017), assinale a alternativa correta quanto às principais complicações decorrentes do uso do balão intra-aórtico.

- (A) Hemorragia no local de inserção, choque cardiogênico e infecção decorrente de falha na prática de técnica asséptica durante a inserção.
- (B) Disfunção aórtica, perfuração da membrana do balão e obstrução local por coleta de exames laboratoriais.
- (C) Perfuração da membrana do balão, hemorragia no local de inserção, dissecação aórtica durante a inserção do cateter.
- (D) Dissecação aórtica durante a inserção do cateter, choque cardiogênico e disfunção aórtica.
- (E) Hemorragia no local de inserção, infecção decorrente de falha na prática de técnica asséptica durante a inserção e obstrução local por coleta de exames laboratoriais.

### QUESTÃO 21

Segundo Viana e Torre (2017), o antiarrítmico utilizado em arritmias supraventriculares e ventriculares, para controle de frequência em arritmias atriais em pacientes com comprometimento da função do ventrículo esquerdo que com o extravasamento em acesso venoso, pode provocar flebite é:

- (A) adrenalina.
- (B) amiodarona.
- (C) lidocaína.
- (D) atropina.
- (E) vasopressina.

### QUESTÃO 22

São manifestações clínicas da glomerulonefrite Pós-estreptocócica aguda na criança, EXCETO:

- (A) febre.
- (B) palidez.
- (C) edema facial mais proeminente pela manhã.
- (D) irritabilidade.
- (E) letargia.

### QUESTÃO 23

Conforme a RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018, órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para príons, de casos suspeitos ou confirmados, bem como quaisquer materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, suspeitos ou confirmados, e que tiveram contato com órgãos, tecidos e fluidos de alta infectividade para príons, são classificados como subgrupo:

- (A) A1.
- (B) A2.
- (C) A3.
- (D) A4.
- (E) A5.

### QUESTÃO 24

Segundo Reis (2013), um paciente que apresenta fraqueza, mal-estar, câimbras, vômitos intensos e diarreia, e no eletrocardiograma depressão do segmento ST e da onda T e aumento do intervalo QT e da onda U apresenta qual condição clínica?

- (A) Pericardite.
- (B) Repolarização precoce.
- (C) Espasmo coronário.
- (D) Hipopotassemia.
- (E) Dissecação de aorta.

## QUESTÃO 25

Uma emergência psiquiátrica é qualquer tipo de perturbação em pensamentos, sentimentos ou ações para os quais se faz necessária intervenção terapêutica imediata. Correlacione os tipos de síndromes às respectivas manifestações de emergências e assinale a opção correta.

### SÍNDROMES

- I- Abstinência do álcool.
- II- Esquizofrenia.
- III- Síndrome neuroléptica maligna.
- IV- Transtorno da personalidade borderline.
- V- Fobias.

### MANIFESTAÇÕES DE EMERGÊNCIAS

- ( ) Pânico, ansiedade e medo.
- ( ) Autonegligência extrema; paranoia grave; ideação suicida ou agressividade e sintomas psicóticos extremos.
- ( ) Hipertermia; rigidez muscular; instabilidade autonômica; sintomas parkinsonianos; estupor catatônico; sinais neurológicos; creatina fosfoquinase (CPK) elevada.
- ( ) Irritabilidade, náusea, vômitos, insônia, mal-estar, hiperatividade autonômica e tremores.
- ( ) Ideação e gestos suicidas; ideações e gestos homicidas; abuso de substância; episódios micropsicóticos; queimaduras e marcas de cortes no corpo.

- (A) (V) (I) (III) (IV) (II)
- (B) (V) (II) (III) (I) (IV)
- (C) (II) (I) (IV) (V) (III)
- (D) (V) (IV) (III) (I) (II)
- (E) (V) (II) (IV) (I) (III)

## QUESTÃO 26

Segundo Kurcgant (2016), as organizações constituem área propícia para o surgimento de conflitos individuais ou grupais, pois os trabalhadores disputam recursos limitados e lutam por reconhecimento e progresso na carreira, bem como por outras formas de recompensa que possam ser proporcionadas pela empresa. Assim como existem diferentes paradigmas para a visualização dos conflitos, há também diversas maneiras de administrá-los. A estratégia de administração dos conflitos a qual se identificam as considerações básicas ou subjacentes às partes envolvidas e buscam-se alternativas considerando as consequências para ambas às partes, escolhendo-se a mais favorável, é caracterizada como:

- (A) solução integrativa de problemas.
- (B) acomodação.
- (C) dominação.
- (D) barganha/compromisso.
- (E) separação.

## QUESTÃO 27

Segundo Brunner e Suddarth (2015), a biopsia do rim é utilizada no diagnóstico e magnitude da doença renal. Dentre as afirmativas abaixo, marque a opção que contraindica a realização deste procedimento.

- (A) Obesidade mórbida.
- (B) Rejeição de transplante.
- (C) Glomerulopatias.
- (D) Proteinúria persistente.
- (E) Insuficiência renal aguda inexplicada.

## QUESTÃO 28

De acordo com a RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018, das Etapas do manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), analise as afirmativas abaixo:

- I- Os RSS do Grupo A que não precisam ser obrigatoriamente tratados e os RSS após o tratamento são considerados rejeitos e devem ser acondicionados em saco branco leitoso.
- II- Sempre que não houver indicação específica, o tratamento do RSS pode ser realizado dentro ou fora da unidade geradora.
- III- Após o tratamento, o símbolo de identificação relativo ao risco do resíduo tratado deve ser retirado.
- IV- Os sacos que acondicionam os RSS do Grupo D não precisam ser identificados.
- V- O coletor utilizado para transporte interno deve ser constituído de material liso, rígido, lavável, permeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas a afirmativa V é verdadeira.
- (B) Apenas as afirmativas II e V são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- (E) Apenas a afirmativa II é verdadeira.

### QUESTÃO 29

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo em relação à prova tuberculínica - PT, assinalando a seguir a opção correta.

- ( ) No Brasil, a tuberculina usada é o PPD-RT 26.
- ( ) O resultado da PT deve ser registrado em milímetros.
- ( ) A solução da tuberculina deve ser conservada em temperatura entre 2°C e 8°C e não deve ser exposta a luz solar direta.
- ( ) Aplicada por via intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço direito, na dose de 0,1ml.
- ( ) A leitura deve ser realizada 48 a 72 horas após a aplicação, não podendo ser estendida.

- (A) (F) (V) (V) (F) (F)
- (B) (V) (V) (V) (V) (F)
- (C) (F) (V) (V) (F) (V)
- (D) (V) (F) (V) (V) (V)
- (E) (F) (F) (V) (V) (V)

### QUESTÃO 30

É um cuidado imediato com o RN exposto ao HIV, na sala de parto e pós-parto imediato, segundo o Ministério da Saúde (2019):

- (A) o clampeamento tardio do cordão umbilical.
- (B) iniciar a primeira dose do AZT intravenoso (preferencialmente ainda na sala de parto), logo após os cuidados imediatos ou nas primeiras 4 horas após o nascimento.
- (C) quando indicado administrar Nevirapina (NVP), o mais precocemente possível, antes das primeiras 48hs de vida.
- (D) não aspirar o conteúdo gástrico.
- (E) uso de leite humano com pasteurização domiciliar ou aleitamento cruzado.

### QUESTÃO 31

Segundo Meltzer (2001), sobre a condução do impulso cardíaco, é INCORRETO afirmar que:

- (A) o impulso origina-se no nódulo sinoatrial.
- (B) quando as células miocárdicas de Purkinje são estimuladas, ocorre a repolarização.
- (C) o impulso gerado no nódulo sinoatrial espalha-se para os músculos atriais através dos feixes internodais.
- (D) no nódulo atrioventricular, ocorre um retardo momentâneo do impulso elétrico.
- (E) após a passagem pelo nódulo atroventricular, o estímulo desce através do feixe de His, alcança os ramos direito e esquerdo e alcança as fibras de Purkinje.

### QUESTÃO 32

Segundo Brunner e Suddarth (2015), a triagem genética está se tornando cada vez mais uma rotina na avaliação de distúrbios endócrinos. Sendo utilizada para determinar a presença de uma mutação gênica passível de predispor o indivíduo a uma determinada condição. Quais distúrbios metabólicos e endócrinos são influenciados por fatores genéticos?

- (A) Síndrome de Von Hippel-Lindau, feocromocitoma e doença de graves.
- (B) Hipotireoidismo, déficit de alfa1-antitripsina e tireoidite de Hashimoto.
- (C) Síndrome de Von Hippel-Lindau, fibrose cística e diabetes melito tipo 1 e tipo 2.
- (D) Fibrose cística, hipertireoidismo e déficit de alfa1-antitripsina.
- (E) Neoplasia endócrina múltipla tipo I e tipo II, hemocromatose hereditária e feocromocitoma.

### QUESTÃO 33

Segundo Meltzer (2001), as cinco grandes complicações que ameaçam a vida de qualquer paciente que tenha sofrido um infarto agudo do miocárdio são:

- (A) acidente vascular encefálico, arritmias, choque cardiogênico, insuficiência ventricular esquerda aguda, tromboembolismo.
- (B) arritmias, insuficiência ventricular esquerda aguda, choque cardiogênico, tromboembolismo e ruptura de ventrículo esquerdo.
- (C) insuficiência biventricular aguda, arritmias, choque cardiogênico, ruptura do ventrículo esquerdo, tromboembolismo.
- (D) insuficiência respiratória aguda, arritmias, ruptura do ventrículo direito, tromboembolismo, acidente vascular encefálico.
- (E) insuficiência respiratória aguda, arritmias, ruptura do ventrículo direito, tromboembolismo, insuficiência biventricular aguda.

### QUESTÃO 34

Saúde pública é a ciência e a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física e mental e a eficiência para o saneamento do meio ambiente, o controle de infecções na comunidade, a organização de serviços médicos e paramédicos para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo de doenças. São medidas de prevenção primária, EXCETO:

- (A) saneamento básico.
- (B) controle dos vetores e reservatórios.
- (C) exames periódicos, individuais, para detecção precoce de casos.
- (D) escolas.
- (E) uso de preservativos e seringas descartáveis.

### QUESTÃO 35

A vacina tríplice viral protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. É indicada para vacinação de usuários a partir de 12 meses de idade. Quanto à via de administração e dose, assinale a alternativa correta.

- (A) Intradérmica; dose 0,5ml.
- (B) Subcutânea; dose 0,5ml.
- (C) Intramuscular; dose 0,5ml.
- (D) Subcutânea; dose 1ml.
- (E) Intramuscular; dose 1ml.

### QUESTÃO 36

De acordo com Meltzer (2001), no traçado eletrocardiográfico, a onda T representa:

- (A) período entre o término da despolarização e início da repolarização.
- (B) duração total das fases de despolarização e repolarização dos ventrículos.
- (C) impulso gerado no nódulo sinoatrial e sua passagem através dos átrios.
- (D) despolarização do músculo ventricular.
- (E) a maior parte da fase de recuperação ventricular.

### QUESTÃO 37

Segundo Campos et al (2016), o termo exsudato refere-se à saída de líquidos orgânicos através das paredes e das membranas celulares. A avaliação correta do teor do exsudato presente no leito da lesão servirá como suporte norteador para a escolha do curativo ideal. Sendo assim, o exsudato de coloração esbranquiçada, amarelada e esverdeada com consistência espessa e/ou viscosa que indica um processo infeccioso, é denominado:

- (A) Sero-hemático.
- (B) Hemático.
- (C) Purulento.
- (D) Pio-hemático.
- (E) Seroso.

### QUESTÃO 38

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo em relação ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (RESOLUÇÃO COFEN Nº 564/2017), assinalando a seguir, a opção correta.

- ( ) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- ( ) É dever dos profissionais de enfermagem atuar com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico.
- ( ) São consideradas infrações graves as que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa.
- ( ) É direito do profissional de enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- ( ) A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético-Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Regional de Enfermagem.

- (A) (F) (V) (V) (V) (V)
- (B) (V) (F) (F) (V) (F)
- (C) (V) (F) (V) (V) (V)
- (D) (V) (V) (V) (V) (V)
- (E) (F) (V) (V) (F) (F)

### QUESTÃO 39

De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (2014), qual a orientação correta a ser dada pelo enfermeiro na sala de vacinação, sobre a lesão vacinal da BCG (bacilo de Calmette e Guérin)?

- (A) Cobrir a úlcera, que resulta da evolução normal da lesão vacinal.
- (B) Fazer uso de compressa local.
- (C) Limpeza do local somente uma vez ao dia.
- (D) Não é necessário colocar qualquer medicamento.
- (E) Massagear o braço onde procedeu a aplicação sempre que houver dor.



#### QUESTÃO 40

Segundo o Ministério da Saúde (2019), a gestante deve ser orientada sobre a importância da testagem para HIV, no pré-natal e os benefícios do diagnóstico precoce, tanto para o controle da infecção materna quanto para a prevenção da transmissão vertical. A testagem para HIV deve ser realizada:

- (A) no primeiro trimestre, idealmente na primeira consulta do pré-natal, e no início do terceiro trimestre de gestação.
- (B) exclusivamente após o terceiro trimestre, para obtenção de um resultado fidedigno.
- (C) após o terceiro trimestre somente nos casos onde haja exposição de risco ou violência sexual.
- (D) no segundo trimestre e ao final do terceiro trimestre de gestação somente nos casos onde haja exposição de risco ou violência sexual.
- (E) durante a admissão da gestante na maternidade somente nos casos onde haja exposição de risco ou violência sexual.

#### QUESTÃO 41

Segundo o Ministério da Saúde (2021), são consideradas modalidades de supervisão no tratamento diretamente observado (TDO), EXCETO:

- (A) domiciliar.
- (B) laboral.
- (C) na unidade de saúde.
- (D) prisional.
- (E) compartilhada.

#### QUESTÃO 42

De acordo com Meltzer (2001), as mais importantes manifestações do choque cardiogênico são:

- (A) sudorese, acidose metabólica, turgência jugular, alterações mentais e oligúria.
- (B) hipotensão, turgência jugular, bulhas hipofonéticas, oligúria, alterações mentais.
- (C) pele úmida e fria, hipotensão, acidose metabólica, bulhas hipofonéticas, oligúria.
- (D) hipotensão, alterações mentais, oligúria, pele úmida e fria e acidose metabólica.
- (E) arritmias, bulhas hipofonéticas, pele úmida e fria, alterações mentais e acidose metabólica.

#### QUESTÃO 43

As hepatites virais estão incluídas na lista de doenças de notificação compulsória e, portanto, os profissionais de saúde têm papel relevante na notificação e no acompanhamento das pessoas portadoras, sintomáticas ou não. Em relação aos marcadores sorológicos para a Hepatite B, qual caracteriza a fase de replicação viral e, quando reagente, indica alta infecciosidade?

- (A) HbsAg.
- (B) Anti-HbcIgG.
- (C) Anti-Hbe.
- (D) HbeAg.
- (E) Anti-HBs.

#### QUESTÃO 44

De acordo com Potter (2018), a preparação no dia da cirurgia contempla vários procedimentos de rotina antes de liberar os pacientes para a cirurgia. Qual das opções abaixo é um preparo correto antes da cirurgia?

- (A) Oferecer enxaguante bucal e pasta de dente ao paciente, podendo tomar pequena quantidade de água para a boca não ficar seca, devido ao jejum.
- (B) O enfermeiro posiciona a cabeça do paciente para colocar um tubo endotraqueal na via aérea.
- (C) Não há necessidade de remover apliques de cabelo ou perucas.
- (D) O paciente pode vestir roupa de dormir pessoal na sala de cirurgia, para oferecer maior conforto para ele.
- (E) Os pacientes podem trançar os cabelos longos e usar toucas descartáveis para conter o cabelo antes de entrar na sala de cirurgia.

#### QUESTÃO 45

Segundo Campos et al (2016), na infecção da ferida crônica ocorre um processo resultante da formação de comunidades bacterianas complexas de múltiplas espécies, revestidas por uma matriz extracelular composta de açúcares, proteínas e glicoproteínas fortemente aderida ao leito da ferida que apresenta aspecto gelatinoso com coloração de transparente a levemente amarelada, caracterizado como:

- (A) coagulação.
- (B) fibrina.
- (C) liquefação.
- (D) colonização.
- (E) biofilme.

#### QUESTÃO 46

Segurança do Paciente corresponde à redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Dentre os principais conceitos acerca desse contexto existe o "incidente que não atingiu o paciente", classificado como:

- (A) incidente sem dano.
- (B) detecção.
- (C) erro.
- (D) incidente com dano.
- (E) Near miss.

#### QUESTÃO 47

Segundo Brunner e Suddarth (2015), utilizando a regra dos nove para calcular a área de superfície corporal queimada, qual a extensão da queimadura em um indivíduo adulto que sofreu queimadura na cabeça, braços, perna esquerda e genitália?

- (A) 29%.
- (B) 36%.
- (C) 46%.
- (D) 47%.
- (E) 55%.

#### QUESTÃO 48

Segundo Viana e Torre (2017), a avaliação do nível de consciência é de fundamental importância para o paciente neurológico. Com o intuito de padronizar a avaliação em pacientes graves, vários instrumentos foram desenvolvidos em forma de escala. Conforme a escala de FOUR, o paciente com uma pupila dilatada e fixa apresenta a seguinte pontuação:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

#### QUESTÃO 49

Segundo Reis (2013), o potencial de ação é dividido em cinco fases, de acordo com a ativação de canais iônicos específicos, o fluxo iônico e a consequente polaridade transmembrana. Qual é a fase ascendente rápida, quando ocorre a despolarização pela entrada rápida de  $\text{Na}^+$  na célula?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4


#### QUESTÃO 50

Segundo Meltzer (2001), classifica-se como arritmia letal:

- (A) bloqueio átrio-ventricular completo.
- (B) flutter atrial.
- (C) taquicardia paroxística juncional.
- (D) bloqueio ou parada sino-atrial.
- (E) fibrilação ventricular.

**INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO**

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assinete corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
- 4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
  - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
  - fazer uso de banheiro; e
  - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 6 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 7 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 8 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 90 minutos.
- 9 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
  - a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;
  - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
  - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;
  - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
  - e) cometer ato grave de indisciplina; e
  - f) comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 10 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
  - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
  - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
  - c) assine o seu nome no local indicado;
  - d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica; e
  - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:



Nome: ROBERTO SILVA

Assinatura: Roberto Silva

**Instruções de Preenchimento**

- \* Não rasure esta folha.
- \* Não rabisque nas áreas de respostas.
- \* Faça marcas sólidas nos círculos.
- \* Não use canetas que borrem o papel.

ERRADO: CORRETO:

**PREENCHIMENTO DO CANDIDATO**

**INSCRIÇÃO**

5	7	0	2	0	7
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

**DV**

0
○
○
○
○
○
○
○
○
○

**P G**

2	4
○	○
○	○
○	○
○	○

01	○	○	○	○
02	○	○	○	○
03	○	○	○	○
04	○	○	○	○
05	○	○	○	○
06	○	○	○	○
07	○	○	○	○
08	○	○	○	○
09	○	○	○	○
10	○	○	○	○
11	○	○	○	○
12	○	○	○	○
13	○	○	○	○
14	○	○	○	○
15	○	○	○	○
16	○	○	○	○
17	○	○	○	○
18	○	○	○	○
19	○	○	○	○
20	○	○	○	○
21	○	○	○	○
22	○	○	○	○
23	○	○	○	○
24	○	○	○	○
25	○	○	○	○
26	○	○	○	○
27	○	○	○	○
28	○	○	○	○
29	○	○	○	○
30	○	○	○	○
31	○	○	○	○
32	○	○	○	○
33	○	○	○	○
34	○	○	○	○
35	○	○	○	○
36	○	○	○	○
37	○	○	○	○
38	○	○	○	○
39	○	○	○	○
40	○	○	○	○
41	○	○	○	○
42	○	○	○	○
43	○	○	○	○
44	○	○	○	○
45	○	○	○	○
46	○	○	○	○
47	○	○	○	○
48	○	○	○	○
49	○	○	○	○
50	○	○	○	○

T  
A  
R  
J  
A

12 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO											PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	