

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO,
SOB A FORMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO
PARA ENFERMEIROS, NOS MOLDES DE
RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL
NAVAL MARCÍLIO DIAS
C-EENF/2016***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ENFERMAGEM

QUESTÃO 1

De acordo com o manual de normas e procedimentos para vacinação, NÃO é contraindicada a vacinação a usuários

- (A) com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave que podem receber vacinas de agentes vivos atenuados.
- (B) em uso de dose imunossupressora de corticoide.
- (C) em uso de imunoglobulina, sangue ou hemoderivados.
- (D) em uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e antiviral.
- (E) adultos que fazem uso de imunossupressor com dose acima de 20 mg/kg/dia por tempo superior a 14 dias.

QUESTÃO 2

Um profissional de enfermagem, após administrar a vacina tetra viral (atenuada), deve orientar o paciente por precaução a evitar por seis semanas ingestão de

- (A) salicilatos (AAS).
- (B) benzodiazepínicos (BZDs).
- (C) insulina (NPH).
- (D) cefuroxima(CXM).
- (E) vancomicina(VAN).

QUESTÃO 3

Uma das formas de fazer o diagnóstico da tuberculose é o exame bacteriológico, que consiste na coleta do escarro em que a qualidade e a quantidade são fundamentais. É uma boa amostra de escarro aquela que

- (A) é obtida da faringe. O volume ideal é de 5 ml.
- (B) provém da árvore brônquica, obtida após esforço de tosse. O volume ideal é de 5 ml a 10 ml.
- (C) obtém somente saliva com bacilos dispersos. O volume ideal é de 15 ml.
- (D) contém grande quantidade de saliva obtida sem o esforço da tosse. O volume ideal é de 15 ml a 20ml.
- (E) é obtida de aspirações de secreções nasais. O volume ideal é de 15 ml a 25 ml.

QUESTÃO 4

Durante uma consulta de Enfermagem, na anamnese obstétrica, uma mulher apresenta um exame Beta HCG positivo. Informa que a data de sua última menstruação foi 15/06/2016. Calcule a data provável do parto.

- (A) 20/02/2017
- (B) 02/03/2017
- (C) 15/03/2017
- (D) 22/03/2017
- (E) 05/04/2017

QUESTÃO 5

A hipertemia maligna é uma complicação possível do intraoperatório. Assinale a manifestação clínica considerada como sinal tardio.

- (A) Elevação da temperatura.
- (B) Hipotensão.
- (C) Taquicardia.
- (D) Oligúria.
- (E) Arritmia ventricular.

QUESTÃO 6

Analise as afirmativas abaixo, com relação à placenta prévia, e assinale a seguir a opção correta.

- I- O exame de urina é normal.
- II- O exame de urina apresenta proteinúria.
- III- Seu início é tempestuoso, com instalação frequentemente subitânea.
- IV- A hemorragia é indolor, exceto durante as contrações uterinas do trabalho de parto.

- (A) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (E) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

QUESTÃO 7

A reação transfusional que tem seus sinais e sintomas relacionados à presença de anticorpos antileucocitários do receptor que reagem contra os leucócitos do doador é denominada reação

- (A) hemolítica aguda.
- (B) alérgica.
- (C) febril hemolítica.
- (D) febril não hemolítica.
- (E) hemolítica tardia.

QUESTÃO 8

Um importante cuidado de enfermagem na realização de uma paracentese é monitorar rigorosamente o paciente quanto aos sinais de colapso vascular. São eles:

- (A) rubor, frequência de pulso diminuída ou pressão arterial aumentada.
- (B) palidez, frequência de pulso aumentada ou pressão arterial diminuída.
- (C) hemorragia, pulso alternante e desorientação.
- (D) epistaxe, torpor e hematêmese intensa.
- (E) palidez, frequência de pulso diminuída ou pressão arterial oscilante.

QUESTÃO 9

Em publicação do Ministério da Saúde, segundo o "Documento de consenso do câncer de mama" de 2004, é definido como grupo populacional com risco muito elevado para o desenvolvimento do câncer de mama aquele que apresenta

- (A) história familiar, nuliparidade e menopausa tardia.
- (B) exposição a radiações ionizantes em idade inferior a 40 anos.
- (C) história familiar com diagnóstico acima de 50 anos de idade.
- (D) história familiar de câncer de mama masculino.
- (E) menarca precoce e ingestão regular de álcool.

QUESTÃO 10

Conforme o manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, a tuberculose continua sendo mundialmente um importante problema de saúde, exigindo o desenvolvimento de estratégias para o seu controle, considerando aspectos humanitários, econômicos e de saúde pública. Com relação à tuberculose, é correto afirmar que

- (A) a busca ativa de assintomáticos respiratórios tem como objetivo identificar precocemente os casos bacilíferos, interromper a cadeia de transmissão e reduzir a incidência da doença a longo prazo.
- (B) devem-se orientar os sintomáticos respiratórios para a coleta do exame de escarro, sendo duas amostras no momento da identificação.
- (C) a tuberculose pulmonar pós-primária é mais comum em crianças. O paciente apresenta-se irritado, com febre baixa, sudorese noturna e inapetência.
- (D) a prova tuberculínica consiste na inoculação intradérmica de um derivado protéico do M. Tuberculosis, sendo feita a leitura do resultado em: não reator, reator fraco, reator forte.
- (E) o paciente que retorna ao sistema após o abandono deve imediatamente recomeçar o tratamento, sem haver a necessidade de nova investigação diagnóstica.

QUESTÃO 11

Quais os tipos de tumores cerebrais mais frequentes em adultos de meia-idade, que são encapsulados benignos comuns das células aracnoides nas meninges?

- (A) Gliomas.
- (B) Euromas acústicos.
- (C) Meningiomas.
- (D) Adenomas hipofisários.
- (E) Angiomas.

QUESTÃO 12

O uso de cateter venoso central de inserção periférica é indicado no caso de

- (A) vigência de bacteremia.
- (B) infusão de soluções hipertônicas.
- (C) mastectomia prévia no membro a ser cateterizado.
- (D) fístula arteriovenosa no membro a ser cateterizado.
- (E) rede venosa esclerosada.

QUESTÃO 13

A principal meta do tratamento do diabetes é normalizar a atividade da insulina e os níveis glicêmicos para reduzir o desenvolvimento de complicações vasculares e neuropáticas. Que complicação o uso da terapia com insulina pode apresentar?

- (A) Reações alérgicas sistêmicas.
- (B) Hiperglicemia noturna.
- (C) Glaucoma.
- (D) Polifagia.
- (E) Infarto agudo do miocárdio.

QUESTÃO 14

A diarreia caracteriza-se por uma frequência aumentada de eliminações fecais, em uma quantidade aumentada e consistência alterada. Com relação à diarreia é INCORRETO afirmar que

- (A) suas complicações incluem o potencial para as arritmias cardíacas.
- (B) a eliminação de fezes volumosas e oleosas sugere a má absorção intestinal.
- (C) a secreta geralmente é de alto volume, sendo provocada pela produção e secreção aumentadas de água e eletrólitos pela mucosa intestinal.
- (D) a síndrome do intestino irritável e a intolerância à lactose são, com frequência, processos patológicos que causam a diarreia.
- (E) as fezes aquosas são características dos distúrbios do intestino grosso, enquanto fezes pastosas estão mais associadas aos distúrbios do intestino delgado.

QUESTÃO 15

A embolia pulmonar refere-se à obstrução da artéria pulmonar ou de um de seus ramos por um trombo. É correto afirmar que

- (A) os trombos responsáveis pela embolia pulmonar se originam, restritamente, nas veias profundas dos membros inferiores.
- (B) a imobilização prolongada no pós-operatório não é tida como fator de risco, pois faz-se necessário durante esse período.
- (C) o teste do D-dímero é utilizado para excluir a embolia pulmonar, mas não como método diagnóstico.
- (D) ocorre o aumento do débito cardíaco e um aumento da pressão arterial como consequências hemodinâmicas.
- (E) obesidade, gravidez e roupas apertadas são erroneamente tidas como condições predisponentes para a embolia pulmonar.

QUESTÃO 16

Substância tóxica é toda e qualquer substância que lesa o corpo por sua ação química quando ingerida, inalada, absorvida, aplicada à pele ou produzida no corpo em quantidade relativamente pequena. Sendo assim, assinale a opção correta.

- (A) Deve-se induzir o vômito após a ingestão de substâncias cáusticas ou destiladas de petróleo.
- (B) Intoxicações alimentares ocorrem depois da ingestão de alimentos sólidos ou líquidos contaminados. Há grande perda de eletrólitos e água por vômitos e diarreia, produzindo, respectivamente, acidose e alcalose.
- (C) Em casos de queimaduras químicas por soda cáustica e fósforo branco, a pele deve ser lavada imediatamente com água corrente.
- (D) Na intoxicação por opióides, como heroína, é administrado um antagonista narcótico para reverter a depressão respiratória grave e o coma.
- (E) Intoxicação por dose excessiva de cocaína pode gerar diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial por ser uma substância depressora do sistema nervoso central.

QUESTÃO 17

A angina do peito é uma síndrome clínica comumente caracterizada por episódio ou paroxismos de dor ou pressão na região anterior do tórax. Em relação à angina é correto afirmar que

- (A) a refratária caracteriza-se por dor previsível e consistente que ocorre sob esforço e é aliviada pelo repouso.
- (B) os nitratos são usados no tratamento para aumentar o consumo miocárdico de oxigênio.
- (C) os beta-bloqueadores reduzem o consumo miocárdico de oxigênio por meio do bloqueio da estimulação simpática beta adrenérgica para o coração.
- (D) pacientes que fazem uso de nitroglicerina devem ser orientados a fazer uso do medicamento após a qualquer atividade física, como subir escadas ou relação sexual.
- (E) os agentes bloqueadores dos canais de cálcio de primeira geração são recomendados largamente às pessoas com insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 18

As puérperas portadoras de algumas doenças infecciosas recebem orientação de não amamentar. A amamentação está contraindicada em puérperas com

- (A) dengue.
- (B) caxumba.
- (C) rubéola.
- (D) sarampo.
- (E) HTLV 1 e 2.

QUESTÃO 19

De acordo com o Manual Técnico Pré-natal e Puerpério: Atenção Qualificada e Humanizada, a ausculta dos batimentos cardíofetais deve ser realizada com sonar após qual semana de gestação?

- (A) Quarta.
- (B) Sexta.
- (C) Oitava.
- (D) Décima segunda.
- (E) Vigésima.

QUESTÃO 20

A patologia que se caracteriza por ser autossômica recessiva, multissistêmica, e que tem os sintomas respiratórios como principais manifestações, sendo diagnosticada na fase de lactente ou no início da infância, porém podendo ser diagnosticada mais tarde na vida é denominada

- (A) fibrose cística.
- (B) asma.
- (C) bronquiectasia.
- (D) enfisema.
- (E) bronquite crônica.

QUESTÃO 21

A ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF) faz parte da consulta de pré-natal. É considerada normal a frequência cardíaca fetal com batimentos entre

- (A) 50 e 70
- (B) 60 e 80
- (C) 90 e 120
- (D) 120 e 160
- (E) 161 e 200

QUESTÃO 22

Assinale o procedimento de enfermagem INCORRETO para o controle da hipertensão intracraniana.

- (A) Manter temperatura corporal menor que 37,7° C.
- (B) Manter cabeceira elevada entre 30 e 45 graus.
- (C) Manter alinhamento céfalo-caudal.
- (D) Manter PIC > 20 mmHg e PPC > 70 mmHg.
- (E) Evitar hipotensão arterial.

QUESTÃO 23

O uso das teorias de Enfermagem oferece estrutura e organização ao conhecimento de Enfermagem e proporciona um meio sistemático de coletar dados para descrever, explicar e prever a prática. Qual a teoria que consiste basicamente na ideia de que os indivíduos, quando capazes, devem promover o auto cuidado, e quando existir a incapacidade, entra o trabalho do enfermeiro no processo do cuidar?

- (A) Hildegard Peplau.
- (B) Virgínia Henderson.
- (C) Martha Rogers.
- (D) Sister Callista Roy.
- (E) Dorothea Orem.

QUESTÃO 24

Qual distúrbio tem como tratamento a inserção imediata de um cateter marcapasso transvenoso temporário?

- (A) Bloqueio atrioventricular completo.
- (B) Fibrilação ventricular.
- (C) Taquicardia atrial paroxística.
- (D) Fibrilação atrial.
- (E) Flutter atrial.

QUESTÃO 25

A quetiapina é um fármaco antipsicótico eficaz no tratamento da esquizofrenia. Os principais efeitos adversos da medicação são

- (A) congestão nasal / azotemia / taquicardia.
- (B) taquicardia / ganho de peso / agitação.
- (C) agranulocitose / taquicardia / risco alto para convulsão.
- (D) constipação / hipotensão postural / perda de peso.
- (E) hipertensão / perda acentuada de peso / sedação.

QUESTÃO 26

Qual patologia é causada pela inflamação unilateral do sétimo nervo craniano que acarreta fraqueza ou paralisia dos músculos faciais do lado afetado?

- (A) Neuralgia do trigêmio.
- (B) Miastenia grave.
- (C) Esclerose múltipla.
- (D) Paralisia de Bell.
- (E) Guillain-Barré.

QUESTÃO 27

Coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, com relação aos casos de dengue, assinalando a seguir a opção correta.

- () A definição de caso confirmado de dengue clássico acontece quando o caso suspeito é confirmado laboratorialmente. Durante uma epidemia, a confirmação pode ser feita pelo critério clínico-epidemiológico, exceto nos primeiros casos da área, os quais deverão ter confirmação laboratorial.
- () Quando a prova do laço é positiva ou há manifestação hemorrágica espontânea, ausência de sinais de alarme e hemorragia normal têm-se como conduta a hidratação oral supervisionada ou parenteral.
- () A febre hemorrágica da dengue é classificada em Grau II quando há colapso circulatório com pulso fraco e rápido, estreitamento da pressão arterial, pele pegajosa e fria e inquietação.
- () O diagnóstico laboratorial específico deve ser realizado até o quinto dia do início dos sintomas, tendo por objetivo identificar o patógeno e monitorar o sorotipo viral circulante.

- (A) (V) (V) (F) (F)
- (B) (V) (F) (V) (F)
- (C) (F) (V) (F) (V)
- (D) (V) (F) (V) (V)
- (E) (V) (F) (F) (V)

QUESTÃO 28

A cardioversão elétrica é um procedimento utilizado na reversão de algumas arritmias. Assinale a opção em que a cardioversão elétrica NÃO está indicada.

- (A) Fibrilação atrial.
- (B) Flutter atrial.
- (C) Taquicardia atrial multifocal.
- (D) Taquicardia ventricular.
- (E) Taquicardia supraventricular.

QUESTÃO 29

A Hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo *Mycobacterium leprae*. A classificação operacional do caso de Hanseníase, visando ao tratamento com poliquimioterapia, é baseada no número de lesões cutâneas. O caso de Hanseníase que apresenta 4 lesões na pele é classificado como

- (A) paucibacilar.
- (B) unobacilar.
- (C) tetrabacilar.
- (D) multibacilar.
- (E) nulíbacilar.

QUESTÃO 30

De acordo com o Ministério da Saúde, qual o primeiro indicador nacional, instituído pela ANVISA, em relação a eventos adversos decorrentes do cuidado em saúde no Brasil?

- (A) Densidade de incidência de infecção primária de corrente sanguínea associada a cateter central.
- (B) Corpo estranho deixado no corpo do paciente durante o procedimento cirúrgico.
- (C) O índice de quedas.
- (D) A perda de sonda nasogástrica.
- (E) A taxa de úlcera por pressão.

QUESTÃO 31

Os pacientes oncológicos podem apresentar quadros clínicos que são classificados como emergências oncológicas. Assinale a opção que NÃO é considerada uma emergência oncológica.

- (A) Compressão da medula Espinhal.
- (B) Hipercalemia (nível sérico superior a 11m/dl).
- (C) Síndrome da lise tumoral.
- (D) Hipocalcemia (nível sérico superior a 3,5mEq/l).
- (E) Tamponamento cardíaco.

QUESTÃO 32

Qual o transtorno neurodegenerativo que apresenta tremor, rigidez, instabilidade postural e bradicinesia como manifestações clínicas?

- (A) Doença de Parkinson.
- (B) Doença de Huntington.
- (C) Doença degenerativa de discos.
- (D) Esclerose lateral amiotrófica.
- (E) Doença de Alzheimer.

QUESTÃO 33

Os três aspectos clínicos principais da cetoacidose diabética são:

- (A) hipoglicemia, alcalose e hipotensão.
- (B) desidratação, hipoglicemia e acidose.
- (C) hiperglicemia, desidratação e acidose.
- (D) acidose, hipertensão e desidratação.
- (E) hiperglicemia, alcalose e hipertensão.

QUESTÃO 34

A diálise peritoneal não se faz sem complicações. Assinale a opção que corresponde a uma complicação aguda da diálise peritoneal.

- (A) Hiperglicemia.
- (B) Sangramento.
- (C) Anorexia.
- (D) Hipertrigliceridemia.
- (E) Hérnia Abdominal.

QUESTÃO 35

Uma unidade de sangue é conectada ao paciente de forma errada, mas o erro é detectado antes do início da transfusão. Como esta situação é denominada de acordo com a classificação internacional de Segurança do Paciente criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)?

- (A) Incidente sem dano.
- (B) Incidente provável.
- (C) Near Miss.
- (D) Incidente com dano.
- (E) Incidente improvável.

QUESTÃO 36

A respeito do cateter arterial como método invasivo de monitoração da pressão arterial, é correto afirmar que

- (A) a artéria de primeira escolha é a braquial.
- (B) é indicado em infusão contínua de drogas vasoativas.
- (C) é contraindicado em caso de politraumatismo.
- (D) no teste de Allen modificado com enchimento ulnar adequado, a artéria radial não deve ser puncionada.
- (E) não há necessidade de verificação prévia do coagulograma para a retirada do cateter arterial.

QUESTÃO 37

A fratura é uma interrupção na continuidade de um osso, sendo definida de acordo com seu tipo e extensão. Qual tipo caracteriza-se por uma fratura em que o osso se divide em vários fragmentos?

- (A) Compressiva.
- (B) Impactada.
- (C) Em galho verde.
- (D) Composta.
- (E) Cominutiva.

QUESTÃO 38

Foi prescrito para um paciente o seguinte: 20 UI de insulina NPH. No posto de Enfermagem tem frasco de 100 UI/ML e seringas de 3 ML. Quantos ML de insulina deve-se aspirar para administrar no paciente?

- (A) 3
- (B) 0,6
- (C) 0,4
- (D) 0,3
- (E) 0,2

QUESTÃO 39

O isoproterenol é um fármaco que tem como uma de suas funções tratar bloqueios cardíacos. O enfermeiro deve ficar na cabeceira do paciente durante todo tempo em que o isoproterenol estiver sendo infundido, pois o mesmo pode ocasionar

- (A) taquicardia ou fibrilação ventricular.
- (B) elevação da pressão intraocular.
- (C) retenção urinária importante.
- (D) acentuada resistência ao fluxo do ar.
- (E) sonolência e desorientação por toxicidade.

QUESTÃO 40

A ventilação não invasiva é uma técnica de ventilação mecânica em que não é empregado qualquer tipo de prótese traqueal. Seu uso é indicado em

- (A) inabilidade em eliminar secreções e deglutir.
- (B) trauma facial.
- (C) edema pulmonar cardiogênico.
- (D) hemorragia gastrointestinal.
- (E) obstrução mecânica das vias aéreas.

QUESTÃO 41

A nutrição parenteral consiste na administração de nutrientes necessários para sobrevivência por outras vias que não o trato gastrointestinal. Assinale a complicação metabólica relacionada à administração da terapia nutricional parenteral.

- (A) Colestase.
- (B) Hiponatremia.
- (C) Fígado gorduroso.
- (D) Atrofia do trato gastrointestinal.
- (E) Embolia Pulmonar.

QUESTÃO 42

Os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos implicam algumas complicações graves. Qual das complicações pode ser evitada com o uso de bloqueadores dos canais de cálcio?

- (A) Vasoespasmo.
- (B) Hiponatremia.
- (C) Hidrocefalia.
- (D) Convulsão.
- (E) Hipocalcemia.

QUESTÃO 43

O teste do reflexo vermelho é um rastreamento que deve ser realizado em todos os recém nascidos(RN). Qual o período ideal em que o exame deve ser realizado?

- (A) Até os primeiros 3 meses.
- (B) Na primeira hora de vida.
- (C) Até o 28º dia de vida.
- (D) Ao completar 1 ano.
- (E) Na primeira semana de vida.

QUESTÃO 44

O Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, do Ministério da Saúde, destaca que a vacina para prevenir contra febre amarela está indicada em residentes ou viajantes que se deslocam para as áreas com recomendação de vacinação. Em relação a essa vacina é correto afirmar que

- (A) não está contraindicada para indivíduos com doenças autoimunes.
- (B) é administrada por via intramuscular.
- (C) o esquema vacinal corresponde à administração de uma dose a partir dos 6 meses.
- (D) não está indicada para gestantes e lactentes.
- (E) é indicada para indivíduos com 60 anos ou mais que serão vacinados pela primeira vez.

QUESTÃO 45

O choque é uma das alterações mais comuns nos grandes queimados. Uma das prioridades na assistência de enfermagem a esses pacientes é observar os sinais vitais, em particular a pressão arterial e o débito urinário que, em adultos, deve ser mantido entre quantos ml/h?

- (A) 10 e 20
- (B) 20 e 30
- (C) 50 e 70
- (D) 80 e 90
- (E) 100 e 150

QUESTÃO 46

Uma importante fase do pré-natal é avaliar a situação vacinal referente ao tétano. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo, assinalando a seguir a opção que apresenta a sequência correta.

- () A vacinação da gestante é realizada para prevenção contra o tétano, apenas para proteção da gestante.
- () A última dose ou dose de reforço da vacina dT (dupla adulto) deve ser administrada pelo menos cinco dias antes da data provável do parto.
- () A vacina dT pode ser administrada a partir da comprovação da gravidez em qualquer período gestacional.
- () Nas gestantes, a vacina dT deverá ser administrada considerando o histórico vacinal para difteria e tétano.

- (A) (V) (F) (V) (F)
- (B) (V) (V) (F) (F)
- (C) (F) (F) (V) (V)
- (D) (F) (V) (F) (V)
- (E) (V) (V) (V) (F)

QUESTÃO 47

Após recebimento das doses da vacina anti-hepatite, o profissional de saúde deverá realizar teste sorológico para saber se ocorreu a soroconversão. Um profissional de saúde sem infecção por vírus da hepatite B e com resposta vacinal contra a hepatite B deverá apresentar HbsAg

- (A) positivo e Anti-HBc negativo.
- (B) positivo e Anti-HBs positivo.
- (C) negativo e Anti-HBs positivo.
- (D) positivo e Anti-HBs negativo.
- (E) positivo e Anti-HBc positivo.

QUESTÃO 48

Deixar de comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional é considerado uma infração, de acordo com o código de ética dos profissionais de Enfermagem, resolução 311/2007. Qual penalidade a ser aplicada?

- (A) Multa.
- (B) Cassação do direito ao exercício profissional.
- (C) Censura.
- (D) Advertência verbal.
- (E) Suspensão do exercício profissional.

QUESTÃO 49

Tendo em vista o capítulo II do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que trata do sigilo profissional, assinale a opção que apresenta um direito do profissional de enfermagem.

- (A) Revelar, quando necessário à prestação da assistência, o fato sigiloso em atividade multiprofissional.
- (B) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigados ao sigilo.
- (C) Permanecer em sigilo mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.
- (D) Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o sigilo profissional.
- (E) Divulgar, quando autorizado, casos ou situações pertinentes ao cotidiano das atividades.

QUESTÃO 50

O que indica uma restauração adequada no caso de um choque hipovolêmico?

- (A) Aumento da frequência cardíaca, pressão arterial média e diurese.
- (B) Diminuição da pressão venosa central.
- (C) Diminuição dos níveis de lactato.
- (D) Diminuição do débito cardíaco.
- (E) Saturação venosa de oxigênio abaixo de 65%.