

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

*(CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO DE
MÉDICOS NO CORPO DE SAÚDE DA MARINHA
/ CP-CSM-MD/2016)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

QUADRO DE MÉDICOS

- 1) Nas meninas, a puberdade inicia-se com
- (A) pelos axilares.
 - (B) menarca.
 - (C) pubarca.
 - (D) telarca.
 - (E) pelos pubianos.
- 2) As características hormonais da fase folicular do ciclo menstrual incluem:
- (A) pulsos de GnRH raros, progesterona alta e estrogênio decrescente.
 - (B) pulsos de GnRH frequentes, progesterona alta e estrogênio decrescente.
 - (C) pulsos de GnRH raros, progesterona baixa e estrogênio crescente.
 - (D) pulsos de GnRH frequentes, progesterona baixa e estrogênio crescente.
 - (E) pulsos de GnRH frequentes, progesterona alta e estrogênio alto.
- 3) A pneumonia é uma complicação comum entre os pacientes que necessitam de respiração artificial. Nesses casos, é correto afirmar que
- (A) a colonização da orofaringe por microrganismos não influencia sua patogenia.
 - (B) a frequência depende da duração da respiração artificial.
 - (C) a alimentação enteral pós-pilórica não é uma medida profilática eficaz.
 - (D) para sua prevenção, recomenda-se a utilização das maiores doses possíveis de sedativos.
 - (E) a presença do tubo endotraqueal evita a microaspiração.
- 4) Na fratura do úmero proximal, qual parâmetro é considerado para avaliação dos desvios dos fragmentos segundo a classificação de Neer?
- (A) 1cm
 - (B) 2cm
 - (C) 3cm
 - (D) 30 graus de angulação
 - (E) 50 graus de angulação

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/16

- 5) Qual a neoplasia maligna da tireoide mais agressiva?
- (A) Carcinoma papilífero.
 - (B) Carcinoma medular.
 - (C) Carcinoma folicular.
 - (D) Câncer Anaplásico.
 - (E) Linfoma primário de Tireóide.
- 6) Com relação às doenças inflamatórias intestinais, pode-se afirmar que
- (A) A doença de Crohn acomete, habitualmente, o reto e estende-se proximalmente até atingir parte do cólon.
 - (B) As lesões mais tardias da doença de Crohn são as úlceras aftoides.
 - (C) Os principais sintomas da retocolite ulcerativa são a diarreia, sangramento retal, tenesmo e dor abdominal.
 - (D) Os portadores de doença de Crohn não apresentam granulomas no mesentério, fígado e pâncreas.
 - (E) A doença de Crohn ocorre em continuidade, sem qualquer área de mucosa preservada no meio do intestino doente.
- 7) Paciente em trabalho de parto, após a realização de amniotomia, apresenta colapso cardiovascular súbito associado à coagulação intravascular disseminada e atonia uterina. Tal quadro clínico sugere, primordialmente:
- (A) Embolia gordurosa.
 - (B) Vasa prévia.
 - (C) Embolia gasosa.
 - (D) Prolapso de cordão.
 - (E) Embolia por líquido amniótico.
- 8) Uma criança que apresenta mais de 2 crises diurnas de broncoespasmo por semana e 4 episódios noturnos de broncoespasmo ao mês é classificada como portadora de asma do tipo
- (A) persistente leve.
 - (B) persistente moderada.
 - (C) persistente grave.
 - (D) intermitente.
 - (E) contínua.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/16

- 9) Paciente primigesta, 39 semanas, em trabalho de parto. Ao exame: 3 contrações fortes em 10 minutos e desaceleração dos batimentos cardíacos fetais próximo às contrações. Ao toque: 7 cm de dilatação e apresentação cefálica em occipto esquerda anterior. A cardiocotografia demonstrou linha de base de 150 bpm e quedas simétricas da frequência para 130 bpm, com nadir cerca de 30 segundos após cada uma das contrações e posterior retorno à linha de base. Sobre esse resultado, é correto afirmar que trata-se de desacelerações
- (A) precoces ou DIP 1. Indicam compressão do polo cefálico durante as contrações e não refletem hipóxia fetal.
 - (B) precoces ou DIP 1. São observadas em todos os trabalhos de parto nessa fase da dilatação.
 - (C) tardias ou DIP 2. Indicam aumento da probabilidade de hipóxia e acidose metabólica fetal.
 - (D) tardias ou DIP 2. Indicam compressão do cordão umbilical e raramente se relacionam à hipóxia fetal.
 - (E) variáveis ou DIP umbilical. Indicam compressão do cordão umbilical e raramente se relacionam à hipóxia fetal.
- 10) Um dos primeiros sistemas de estratificação dos riscos de anestesia foi a classificação da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA). Segundo essa classificação, assinale a opção correta.
- (A) ASA I não possui comorbidades.
 - (B) ASA II possui doença sistêmica grave.
 - (C) ASA IV pode ser operado em regime de cirurgia ambulatorial.
 - (D) ASA V possui grande benefício com a cirurgia.
 - (E) Paciente idoso pode ser classificado com ASA III.

- 11) Os níveis circulantes dos peptídeos natriuréticos, BNP e pró-BNP, são ferramentas úteis no diagnóstico dos pacientes com insuficiência cardíaca. Com relação a esses marcadores, é correto afirmar que
- (A) sua dosagem seriada é recomendada para o direcionamento do tratamento da insuficiência cardíaca.
 - (B) não se elevam nos pacientes portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.
 - (C) os níveis séricos são mais baixos nas mulheres.
 - (D) só aumentam na insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica.
 - (E) os níveis séricos aumentam com a idade e com a disfunção renal.
- 12) Paciente de 3 anos, sexo feminino, dá entrada no Pronto-Socorro com história de tosse seca há 5 dias, que evoluiu para tosse produtiva há 4 dias. Apresentou febre (39°C) no terceiro dia do quadro, além de taquipneia, dispneia e inapetência. Foi realizado raio X de tórax com infiltrado heterogêneo bilateral compatível com Broncopneumonia. Sendo assim, qual o agente etiológico mais provável?
- (A) Vírus.
 - (B) *Streptococcus pneumoniae*.
 - (C) *Mycoplasma pneumoniae*.
 - (D) *Haemophilus influenzae*.
 - (E) *Staphylococcus aureus*.

- 13) Com relação às preocupações perioperatórias e recomendações para medicamentos herbáceos, assinale a opção que correlaciona corretamente o nome da erva com a preocupação perioperatória e à recomendação pré-operatória, respectivamente.
- (A) Alho - reações alérgicas- sem dados.
 - (B) Valeriana - potencial de aumentar o risco de sangramento - descontinuar 7 dias antes da cirurgia.
 - (C) Ginko - potencial de aumentar o risco de sangramento - descontinuar pelo menos 36 horas antes da operação.
 - (D) Erva de São João - risco de isquemia do miocárdio- sem dados.
 - (E) Ginsen - potencial para aumentar as necessidades anestésicas com uso ao longo prazo - descontinuar por, pelo menos, 24 horas antes da operação.
- 14) Paciente vítima de acidente automobilístico, dá entrada na emergência com quadro de hipovolêmia importante, com choque hipovolêmico grau II. Após reposição volêmica e estabilidade hemodinâmica, é encaminhado para a radiologia para realização de tomografia computadorizada de abdome. Evidenciou-se lesão esplênica grau III, sendo assim, o quadro apresentado sugere
- (A) baço completamente destruído com lesão vascular hilar.
 - (B) hematoma subcapsular com mais de 50% da área de superfície ou em expansão, laceração maior que 3 cm de profundidade parenquimatosa ou envolvendo vasos trabeculares.
 - (C) hematoma subcapsular menor que 10% de área de superfície, laceração capsular menor que 1 cm de profundidade no parênquima.
 - (D) hematoma subcapsular de 10 a 50% de área de superfície, intraparenquimatoso, menor que 5 cm, laceração capsular de 1 a 3 cm de profundidade, não envolve um vaso trabecular.
 - (E) laceração envolvendo vasos segmentares ou hilares, produzindo importante desvascularização (maior que 25% do baço).

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/16

- 15) O carcinoma hepatocelular (CHC) é um dos cânceres mais comuns no mundo. Assinale a opção correta com relação a essa neoplasia.
- (A) A distribuição geográfica não está relacionada à incidência da infecção do vírus da hepatite B.
 - (B) A maior incidência da doença é encontrada na Europa e no norte da Ásia.
 - (C) A evidência epidemiológica está extremamente relacionada com a fatores ambientais.
 - (D) O CHC é 2 a 8 vezes mais comum em mulheres.
 - (E) Não tem relação com consumo de álcool, fumo e doenças metabólicas genéticas.
- 16) Qual é o exame de escolha para o diagnóstico de Estenose Hipertrófica do Píloro, quando a oliva não pode ser palpada?
- (A) Estudo Contrastado do trato gastrointestinal superior (EED).
 - (B) Tomografia Computadorizada do abdome com contraste oral.
 - (C) Ultrassonografia abdominal.
 - (D) Clister opaco.
 - (E) Endoscopia digestiva.
- 17) A indução da produção de hemoglobina fetal no tratamento da anemia falciforme é feita
- (A) pelo folato.
 - (B) pela hidroxureia.
 - (C) pela vitamina B12.
 - (D) pela imunoglobulina.
 - (E) pelo acetaminofen.
- 18) Delirium, termo utilizado para descrever um estado de confusão aguda, é uma causa importante de morbidade e mortalidade. Sobre essa condição, pode-se afirmar que a sua principal característica clínica é o comprometimento da
- (A) tarefas visuoespaciais.
 - (B) memória.
 - (C) função executiva.
 - (D) atenção.
 - (E) linguagem.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/16

- 19) Qual é o fator de risco mais forte para Demência?
- (A) Idade avançada.
 - (B) Deficiência de vitamina B12.
 - (C) Traumatismo craniano.
 - (D) Hipotireoidismo.
 - (E) Neurosífilis.
- 20) O carcinoma da tireóide é a malignidade mais comum do sistema endócrino. Sendo assim, assinale a opção que apresenta um fator de risco relacionado à malignidade do nódulo tiroideano.
- (A) Tamanho pequeno do nódulo (< 2,0 cm).
 - (B) Etilismo.
 - (C) Sexo masculino.
 - (D) Doença unilateral.
 - (E) Idade > 20 e < 45 anos.
- 21) Com relação à Doença de Hirschsprung, pode-se afirmar que
- (A) a alteração de inervação é acompanhada de espasmo muscular do colón distal e esfíncter anal, resultando numa causa de obstrução mecânica do recém nascido.
 - (B) o intestino doente é o segmento dilatado, por isso chamado de megacólon congênito.
 - (C) a agangliose envolve sempre o reto distal e em 75% dos casos o retosigmóide é afetado.
 - (D) não há correlação de história familiar e outras mal formações associadas.
 - (E) caracteriza-se pela ausência de células ganglionares no plexo mioentérico de Auerbach, não envolvendo o plexo submucoso de Meissner.
- 22) Qual o tipo histológico de carcinoma da tiroide mais frequente em crianças, ocorrendo em 80% dos casos?
- (A) Linfoma.
 - (B) Medular.
 - (C) Papilífero.
 - (D) Folicular.
 - (E) Diferenciado Misto.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/16

- 23) Segundo Gustillo e Anderson, uma ferida com extensão maior do que 1cm de comprimento, com moderado grau de comprometimento, pequena lesão das partes moles e esmagamento, é característica de que tipo de fratura exposta?
- (A) I
 - (B) II
 - (C) IIIA
 - (D) IIIB
 - (E) IIIC
- 24) Com relação à hepatite B crônica, é correto afirmar que
- (A) a progressão para cirrose é mais provável na hepatite B crônica grave do que nas formas leve ou moderada.
 - (B) o tratamento não deve ser direcionado a suprimir a replicação viral.
 - (C) a infecção viral, por ocasião do nascimento, está associada a uma infecção aguda clinicamente silenciosa e a baixas probabilidades de infecção crônica.
 - (D) entre os adultos, as características histológicas não têm importância prognóstica.
 - (E) a hipoalbuminemia é severa mesmo nas formas mais brandas da doença.
- 25) Os agentes etiológicos de infecção do trato urinário em meninas, por ordem de prevalência são
- (A) *E. coli*, *Klebsiella* e *Proteus*.
 - (B) Adenovírus, *E. coli* e *Proteus*.
 - (C) *Proteus*, *Enterococcus* e *Staphylococcus*.
 - (D) *Klebsiella*, *E. coli* e *Enterococcus*.
 - (E) *Staphylococcus*, *Klebsiella* e *Enterococcus*.
- 26) Uma criança, em condições normais de saúde, senta-se sozinha e por tempo indefinido, sem apoio, com as costas retas, aproximadamente aos
- (A) 3 meses.
 - (B) 4 meses.
 - (C) 6 meses.
 - (D) 7 meses.
 - (E) 10 meses.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/16

- 27) Paciente de 23 anos, primigesta, usuária de cocaína (fez uso inalatório há uma hora), sem pré-natal, vem ao pronto-socorro com perda vaginal de líquido sanguinolento em grande quantidade e dor abdominal intensa e constante. Ao exame: agitação psicomotora, PA 150/100 mmHg. Altura uterina de 34 cm. Feto único com BCF de 146 bpm e útero com hipertonia mantida. Sendo assim, assinale a opção que apresenta o diagnóstico e a conduta que deverá ser observada nesse caso.
- (A) Corioamniorrexe prematura e trabalho de parto na fase ativa/ conduta conservadora
 - (B) Descolamento prematuro da placenta/ realizar o parto imediatamente.
 - (C) Descolamento prematuro da placenta/ solicitar ultrassonografia, exames de coagulação e cardiotocografia.
 - (D) Placenta prévia total/ evitar toque vaginal e iniciar tocólise.
 - (E) Urgência hipertensiva/ iniciar hidralazina e tocólise.
- 28) Assinale a opção que apresenta exemplos de critérios diagnósticos para o Lúpus Eritematoso Sistêmico.
- (A) Úlceras orais e mialgia.
 - (B) Anticorpos antinucleares e leucocitose.
 - (C) Pleurite e dispneia.
 - (D) Proteinúria > 0,5g/dia e pericardite.
 - (E) Psicose e Nistagmo.
- 29) Assinale a opção que apresenta 2 critérios maiores de Jones para a febre reumática.
- (A) Artralgia e nódulos subcutâneos.
 - (B) Nódulos subcutâneos e eritema marginado.
 - (C) Poliartrite migratória e febre.
 - (D) Elevação dos reagentes de fase aguda e cardite.
 - (E) Poliartrite e intervalo PR prolongado.
- 30) Os distúrbios clínicos associados mais comumente à azotemia pré-renal são:
- (A) fármacos nefrotóxicos e anomalias congênitas.
 - (B) obstrução das vias urinárias e hipovolemia.
 - (C) hipovolemia e redução do débito cardíaco.
 - (D) malformações vasculares e aminoglicosídeos.
 - (E) câncer de próstata e analgésicos.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/16

- 31) O tubérculo maior do úmero proximal serve de inserção para os seguintes tendões:
- (A) redondo maior , supraespinhal e infraespinhal.
 - (B) peitoral maior , subescapular e infraespinhal.
 - (C) subescapular , supraespinhal e redondo menor.
 - (D) supraespinhal , redondo menor e infraespinhal.
 - (E) deltoide , peitoral maior e subescapular.
- 32) Na bronquiolite aguda, o agente etiológico principal é denominado
- (A) Adenovírus.
 - (B) Parainfluenza.
 - (C) *Mycoplasma pneumoniae*.
 - (D) Vírus Sincicial Respiratório.
 - (E) Rhinovírus.
- 33) A confirmação anatomopatológica de um diagnóstico de endometriose é feita por meio da identificação de implantes extragenitais que apresentam
- (A) fibrose.
 - (B) estroma decidualizado.
 - (C) hipertrofia muscular.
 - (D) glândulas endometriais e estroma.
 - (E) hemorragia.
- 34) A acanthosis nigricans, observada em pacientes portadoras da síndrome dos ovários policísticos, é um marcador confiável de
- (A) hiperprolactinemia.
 - (B) hiperestrogenismo.
 - (C) hipoandrogenismo.
 - (D) hiperandrogenismo.
 - (E) resistência periférica à insulina.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/16

- 35) A Bulimia Nervosa caracteriza-se por episódios recorrentes de exageros alimentares, seguidos por comportamentos compensatórios anormais. Sobre essas condições, é INCORRETA afirmar que
- (A) e geral, o distúrbio começa no final da adolescência ou no início da vida adulta, sendo a etiologia provavelmente multifatorial.
 - (B) ocorrência simultânea de compulsão alimentar e comportamento compensatório impróprio estão presentes, pelo menos, duas vezes na semana, por cerca de três meses.
 - (C) anormalidades laboratoriais são frequentes.
 - (D) a oligomenorreia e a amenorreia são mais frequentes nas mulheres sem transtornos alimentares.
 - (E) laceração do esôfago e ruptura de estômago podem constituir eventos potencialmente fatais.
- 36) É característica das luxações posteriores tipo V, subdivisão III, de Pipkin a fratura
- (A) da cabeça abaixo da fôvea.
 - (B) da cabeça acima da fôvea.
 - (C) concomitante do colo femoral.
 - (D) concomitante do rebordo acetabular.
 - (E) concomitante com a sínfese púbica.
- 37) Assinale a opção que apresenta o principal mecanismo das fraturas de úmero proximal.
- (A) Trauma direto no ombro.
 - (B) Rotação excessiva do braço em um osso osteoporótico.
 - (C) Queda da própria altura com a mão estendida.
 - (D) Traumas de alta energia.
 - (E) Rotação interna do braço em um osso osteoporótico.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/16

- 38) Com relação à asma na gestação, assinale a opção correta.
- (A) Ao engravidar, a paciente asmática deve, imediatamente, suspender seus tratamentos prévios.
 - (B) A gestante, em caso de crise asmática, deve ser orientada a evitar o uso de b2-agonista de curta duração, como o salbutamol, mesmo em doses habituais, pelo risco de taquicardia.
 - (C) Os corticoides inalatórios são contraindicados no período gestacional.
 - (D) O tratamento da crise asmática segue as mesmas medidas e medicações dadas a pacientes não gestantes.
 - (E) O trabalho de parto é importante causa desencadeadora da crise asmática.
- 39) Os dois principais métodos de diagnóstico de úlceras pépticas são:
- (A) tomografia computadorizada do abdome com contraste oral e clister opaco com duplo contraste.
 - (B) radiografias do trato gastrointestinal superior e endoscopia fibroscópica.
 - (C) dosagem do nível de gastrina sérica e endoscopia fibroscópica
 - (D) tomografia computadorizada do abdome com contraste oral e radiografias do trato gastrointestinal superior.
 - (E) clister opaco com duplo contraste e dosagem do nível de gastrina sérico.
- 40) Segundo Berek (2014), o uso de contraceptivos orais hormonais aumenta o risco de
- (A) doença fibrocística da mama.
 - (B) câncer ovariano.
 - (C) salpingite.
 - (D) câncer endometrial.
 - (E) adenoma hepático.

- 41) Qual é o nervo mais comumente lesado nas fraturas do úmero proximal?
- (A) Axilar.
 - (B) Subescapular.
 - (C) Radial.
 - (D) Supraescapular.
 - (E) Sural.
- 42) Na terminologia BI-RADS (American College of Radiology Breast Imaging Reporting and Data System), a designação 0 (zero) quer dizer:
- (A) mamografia normal.
 - (B) lesão benigna.
 - (C) suspeita de malignidade.
 - (D) lesão provavelmente benigna.
 - (E) necessita de avaliação adicional.
- 43) Com o advento da profilaxia da transmissão vertical do HIV, a incidência de infecção congênita por esse vírus caiu drasticamente. Sobre a profilaxia da transmissão vertical do vírus HIV, assinale a opção correta.
- (A) Apenas as gestantes com carga viral elevada ou imunodeprimidas devem receber a zidovudina venosa.
 - (B) Todas as gestantes devem receber zidovudina venosa desde o início do trabalho de parto até o clampeamento do cordão, em todos os tipos de parto, inclusive cesárea eletiva.
 - (C) As gestantes devem receber zidovudina venosa desde o início do trabalho de parto até o clampeamento do cordão, apenas quando forem submetidas a parto vaginal.
 - (D) As gestantes devem receber zidovudina venosa apenas no caso de ruptura das membranas, seja a evolução para parto vaginal ou cesárea.
 - (E) As gestantes só devem receber zidovudina venosa após o clampeamento do cordão.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/16

- 44) A clássica radiografia simples de abdome da Atresia Duodenal evidencia
- (A) sinal da dupla bolha.
 - (B) deformidade em casca de maçã.
 - (C) sinal do bico de pássaro.
 - (D) sinal da maçã mordida.
 - (E) empilhamento de moeda.
- 45) Paciente com queixa de dor abdominal em cólica, náuseas, vômitos, distensão abdominal e incapacidade de eliminar flatos e fezes. A radiografia simples do abdome evidenciou alças dilatadas, com múltiplos níveis de ar-líquido dispostos em um padrão do tipo degraus de escada, sem evidências de gás colônico. Sendo assim, o provável diagnóstico desse quadro é
- (A) obstrução de cólon ascendente com válvula ileocecal competente.
 - (B) doença de Crohn.
 - (C) ileíte aguda.
 - (D) obstrução de cólon descendente.
 - (E) obstrução do intestino delgado.
- 46) Os eventos habituais que ocorrem no desenvolvimento puberal normal, em ordem de surgimento, são:
- (A) velocidade máxima de crescimento, surgimento de pelos pubianos, brotamento mamário e menarca.
 - (B) surgimento de pelos pubianos, velocidade máxima de crescimento, brotamento mamário e menarca.
 - (C) brotamento mamário, surgimento de pelos pubianos, velocidade máxima de crescimento e menarca.
 - (D) brotamento mamário, menarca, surgimento de pelos pubianos e velocidade máxima de crescimento.
 - (E) surgimento de pelos pubianos, brotamento mamário, menarca e velocidade máxima de crescimento.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/16

- 47) A invaginação intestinal é a causa mais comum de obstrução intestinal na primeira infância. Assim, é INCORRETO afirmar que
- (A) na maioria das invaginações, a causa da "cabeça" da invaginação é tumor ou pólipos intestinal.
 - (B) A redução hidrostática (não cirúrgica) é bem sucedida em 80 % dos casos.
 - (C) O índice de recidiva é muito baixo após a redução cirúrgica
 - (D) O quadro clínico clássico são fortes cólicas, vômitos e evacuações em "geleia de morango".
 - (E) O achado ultrassonográfico característico é a imagem em alvo das camadas invaginadas do intestino nos cortes transversais.
- 48) Um paciente pré-escolar, do sexo feminino, receberá alta hospitalar após quadro de meningite. Durante a internação, recebeu tratamento adequado e evoluiu de maneira satisfatória. Dentre as possíveis sequelas relacionadas ao quadro descrito, a seqüela neurológica mais frequente é denominado
- (A) epilepsia.
 - (B) hidrocefalia.
 - (C) perda auditiva.
 - (D) paralisia facial.
 - (E) ataxia.
- 49) As infecções na ferida operatória continuam sendo um problema significativo para os cirurgiões nos tempos atuais. Com relação aos patógenos associados à infecção pós-operatória na ferida cirúrgica, qual a bactéria mais comumente encontrada?
- (A) *Streptococcus alfa hemolítico*.
 - (B) *Estafilococcus coagulase negativa*.
 - (C) *Enterococo*.
 - (D) *Estafilococcus aureus*.
 - (E) *Escherichia coli*.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/16

50) Assinale a opção que apresenta uma situação na qual a cesárea é indicada que, o parto vaginal ou a fórceps é contraindicado.

- (A) Apresentação cefálica defletida de segundo grau ou de frente.
- (B) Placenta prévia marginal.
- (C) Líquido amniótico com mecônio fluido.
- (D) Apresentação cefálica em ODT (occipito direita transversa).
- (E) História de cesárea há 3 anos.

Prova : Amarela
Profissão : QUADRO DE MÉDICOS

Concurso : CSM-MD/16