

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

***(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AOS
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
PRM/2020)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ESPECIALIDADES COM ACESSO DIRETO

Clínica Médica	Oftalmologia
Dermatologia	Ortopedia e Traumatologia
Ginecologia e Obstetrícia	Otorrinolaringologia
Radiologia e Diagnóstico por Imagem	Patologia
Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica	Pediatria
Neurologia	Psiquiatria

QUESTÃO 1

Gestante em período expulsivo, apresenta o sinal da tartaruga com consequente dificuldade para a extração fetal. Considerando esse contexto, qual a primeira manobra a ser realizada nesta distócia?

- (A) Deventer- Muller.
- (B) Zavanelli.
- (C) McRoberts.
- (D) Mauriceau.
- (E) Bracht.

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa que contém todas as alterações descritas na síndrome NEM2a (neoplasia endócrina múltipla tipo 2^a).

- (A) Hiperparatireoidismo primário, lesões pancreáticas e da hipófise.
- (B) Feocromocitoma, hiperparatireoidismo secundário e lesões da hipófise.
- (C) Lesões pancreáticas, câncer medular de tireóide e feocromocitoma.
- (D) Hiperparatireoidismo secundário, lesões pancreáticas e câncer medular de tireóide.
- (E) Câncer medular de tireóide, feocromocitoma e hiperparatireoidismo primário.

QUESTÃO 3

O esôfago passa por alterações características com o envelhecimento que podem resultar no aparecimento de divertículos de *Zenker*. Dentre as abaixo, qual a alternativa correta sobre esta condição?

- (A) Divertículos de *Zenker* são também denominados divertículos epifrênicos.
- (B) É encontrado especificamente herniando no triângulo de *Killian*.
- (C) São categorizados como divertículos verdadeiros.
- (D) O divertículo de *Zenker* é raramente encontrado.
- (E) O diagnóstico do divertículo de *Zenker* é feito por endoscopia digestiva alta.

QUESTÃO 4

A respiração oral é um sintoma comum na infância, em geral, consequente à obstrução nasal crônica. Os respiradores orais, na faixa etária pediátrica, com distúrbios respiratórios do sono geralmente apresentam os seguintes sintomas, EXCETO:

- (A) comportamento rebelde.
- (B) sonolência diurna.
- (C) hiperatividade.
- (D) problemas de aprendizado e atenção.
- (E) isolamento social.

QUESTÃO 5

O carcinoma de endométrio é a oitava maior causa de morte por neoplasia maligna em mulheres; em geral, em torno de 2 a 3% das mulheres têm câncer de endométrio ao longo da vida. Sobre essa patologia é correto afirmar que:

- (A) a taxa de sobrevida global em 5 anos é de aproximadamente 50%.
- (B) o câncer de endométrio tipo I ocorre em mulheres sem estimulação estrogênica do endométrio e o tipo II ocorre em mulheres jovens, na perimenopausa, com história de exposição ao estrogênio, sem oposição a progesterona.
- (C) o risco de transformação da hiperplasia do endométrio em carcinoma de endométrio está relacionado com a existência e intensidade da atipia citológica.
- (D) o exame papanicolau de rotina é adequado e a citologia endometrial é sensível e útil no rastreamento do câncer endometrial em uma população de alto risco.
- (E) menos de 5% das mulheres com diagnóstico de câncer de endométrio é sintomática.

QUESTÃO 6

É causa de hipotireoidismo secundário:

- (A) deficiência de iodo.
- (B) tireoidite de Hashimoto.
- (C) tratamento com lítio.
- (D) cirurgia ou irradiação da hipófise.
- (E) tireoidectomia subtotal ou total.

QUESTÃO 7

O baço é um órgão intra-abdominal muito comumente lesado no trauma abdominal fechado. Na Escala de Lesão Esplênica da *American Association for the Surgery of Trauma*, uma laceração envolvendo vasos segmentares ou hilares produzindo desvascularização do baço maior que 25% é uma lesão nível:

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV
- (E) V

QUESTÃO 8

São instâncias responsáveis pelo sistema de regulação da incorporação de tecnologias em saúde, EXCETO:

- (A) regulação da entrada e comercialização de tecnologias no mercado brasileiro.
- (B) incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) avaliação tecnológica para o SUS.
- (D) assistência suplementar à saúde.
- (E) protocolização e diretrizes clínicas.

QUESTÃO 9

Qual técnica abaixo relacionada NÃO é utilizada para a correção da hemorragia puerperal na atonia uterina?

- (A) Cateter- balão de *Bakri*.
- (B) Manobra de *Taxe*.
- (C) Sutura uterina *B-Lynch*.
- (D) Ligadura bilateral da artéria uterina.
- (E) Manobra de *Hamilton*.

QUESTÃO 10

A monossomia do X, gerando um cariótipo 45,X, caracteriza a síndrome genética de:

- (A) *Down*.
- (B) *Turner*.
- (C) *Klinefelter*.
- (D) *Patau*.
- (E) *Edwards*.

QUESTÃO 11

A crise epilética é um evento paroxístico causado por uma atividade neuronal anormal, excessiva ou sincrônica no cérebro, que pode ter várias manifestações. Sobre as crises epiléticas, as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:

- (A) o eletroencefalograma interictal de rotina em pacientes com crises epiléticas focais está frequentemente anormal.
- (B) as crises focais com manifestações discognitivas podem manifestar-se com alterações na sensibilidade somática, no equilíbrio ou na função autonômica.
- (C) as crises de ausência típicas estão associadas a um grupo de epilepsias geneticamente determinadas que começam em geral na infância ou início da adolescência.
- (D) as crises tônico-clônicas de início generalizado são o tipo mais comum de crise epilética nos distúrbios metabólicos.
- (E) as crises focais sem manifestações discognitivas podem causar sintomas motores, sensoriais, autonômicos ou psíquicos sem comprometimento da cognição.

QUESTÃO 12

São sinais e sintomas da síndrome de *Cushing*:

- (A) obesidade central, depressão, pele fina e quebradiça.
- (B) face redonda, estrias largas e purpúricas, hipermenorréia.
- (C) coxim adiposo na área interescapular ("giba de búfalo"), hiperpotassemia e irritabilidade.
- (D) diabetes, diminuição do peso corporal e suscetibilidade aumentada às infecções.
- (E) hipotensão arterial, estrias largas e purpúricas, obesidade central.

QUESTÃO 13

Ao realizar o exame físico de um paciente com doença valvar reumática, a ausculta cardíaca revelou um sopro meso a telediastólico, mais audível na ponta do coração com o paciente em decúbito lateral esquerdo, de baixa frequência ou em rolar e introduzido por estalido de abertura. Qual a causa clássica desse sopro?

- (A) Estenose aórtica.
- (B) Insuficiência mitral.
- (C) Estenose mitral.
- (D) Insuficiência aórtica.
- (E) Estenose pulmonar.

QUESTÃO 14

Em relação às infecções na gestação, analise as afirmativas abaixo, e assinale a opção correta.

I- São indicações para profilaxia antibiótica de *Streptococcus agalactiae* (GBS), quando rastreio de GBS desconhecido: parto prematuro (<37 semanas), amniorrexe há 18 horas ou mais, temperatura axilar intraparto maior ou igual a 38 C.

II- Na infecção por herpes simples genital a cesariana está indicada em mulheres com infecção primária com lesão ativa no momento do parto ou que a referem no terceiro trimestre da gestação, e será realizada até 4 horas da ruptura das membranas.

III- Não está recomendado o rastreamento universal do citomegalovírus (CMV) no pré natal, sendo indicado somente quando a gestante apresentar sintomatologia semelhante a mononucleose, ou sinais ultrassonográficos sugestivos de infecção fetal por CMV.

IV- Está contraindicada a vacinação para influenza H1N1 no primeiro trimestre de gestação.

V- A amamentação está contraindicada nos casos de infecção por HIV, HTLV e sífilis não tratada.

- (A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (D) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- (E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

QUESTÃO 15

Qual a malformação congênita cardíaca mais comum?

- (A) Comunicação interatrial.
- (B) Coarctação da aorta.
- (C) Prolapso da valva mitral.
- (D) Comunicação interventricular.
- (E) Valva aórtica bicúspide.

QUESTÃO 16

É comprovada que a profilaxia do antibiótico no pré-operatório reduz o risco de infecção de sítio cirúrgico pós-operatórias em muitas circunstâncias. Assinale a alternativa correta sobre a antibioticoprofilaxia.

- (A) Geralmente é indicada na colecistectomia laparoscópica eletiva.
- (B) Previne infecções nosocomiais pós-operatórias.
- (C) É mandatória nas cirurgias limpas.
- (D) Se não administrada de forma adequada, é ineficaz e pode ser prejudicial.
- (E) Não é indicada quando o procedimento envolve secção óssea.

QUESTÃO 17

O primeiro passo para determinar a etiologia de um derrame pleural é identificar se ele é transudato ou exsudato. É característica do transudato:

- (A) relação de proteínas no líquido pleural/soro > 0,5.
- (B) pode ser decorrente de pneumonias bacterianas.
- (C) relação entre LDH no líquido pleural/soro > 0,6.
- (D) LDH no líquido pleural maior que 2/3 do limite superior da sorologia.
- (E) insuficiência ventricular esquerda é uma das causas mais comuns.

QUESTÃO 18

Em relação às doenças benignas da mama, podemos afirmar que:

- (A) os fibroadenomas são os tumores benignos mais comuns da mama e estão associados ao aumento do risco de câncer de mama.
- (B) a dor nas mamas é um sintoma comum na malignidade.
- (C) o etilismo é o principal fator de risco para o abscesso subareolar recidivante.
- (D) os tumores filóides apresentam potencial de crescimento rápido e tendência aumentada a bilateralidade.
- (E) a descarga papilar unilateral crônica, principalmente sanguinolenta é uma indicação de ressecção dos ductos acometidos.

QUESTÃO 19

Na resposta imune humoral ocorre a ativação do sistema complemento por três vias distintas. Quais são elas?

- (A) Clássica, alternativa e de ligação à lecitina.
- (B) Clássica, intrínseca e direta.
- (C) Intrínseca, direta e de ligação à lecitina.
- (D) Alternativa, de ligação à lecitina e direta.
- (E) Clássica, intrínseca e alternativa.

QUESTÃO 20

Sobre os miomas uterinos é correto afirmar que:

- (A) o risco de ter mioma é 2,5 vezes maior nas mulheres que tenham alguma parente em primeiro grau com mioma.
- (B) há uma relação bem definida entre o uso de contraceptivos orais como fator de risco para miomas.
- (C) o risco de ter mioma é 2,9 vezes maior em mulheres brancas que negras.
- (D) a presença de miomas subserosos e sua retirada não afetam as taxas de fertilidade.
- (E) a maioria dos miomas aumenta de tamanho na gravidez.

QUESTÃO 21

A condição clínica definida como granulomatose eosinofílica com poliangeíte e caracterizada por asma, eosinofilia periférica e tecidual, formação de granulomas extravasculares e vasculite de múltiplos órgãos é a:

- (A) poliarterite nodosa.
- (B) síndrome de *Henoch-Schölen*.
- (C) doença de *Kawasaki*.
- (D) síndrome de *Churg-Strauss*.
- (E) arterite de *Takayasu*.

QUESTÃO 22

Com relação a doença de *Crohn*, marque a alternativa correta.

- (A) O tabagismo pode prevenir a doença.
- (B) Pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, porém o reto é um segmento do intestino frequentemente poupado.
- (C) Os achados histológicos demonstram que o processo fica limitado à mucosa e à submucosa superficial, sem acometimento das camadas mais profundas.
- (D) Doença da mucosa difusa (não segmentada), não há espessamento da parede intestinal, nem aspecto de "calçamento".
- (E) O uso de contraceptivos orais não está associado ao aumento do risco de desenvolver a doença.

QUESTÃO 23

Marque a assertiva que corresponde às principais manifestações clínicas das infecções congênitas mais prevalentes.

- (A) Toxoplasmose - calcificações intracranianas difusas, hidrocefalia e coriorretinite.
- (B) Sífilis - rash maculopapular (palma das mãos e plantas dos pés), hidrocefalia e pseudoparalisia de Parrot.
- (C) Rubéola - microcefalia, cardiopatia congênita e catarata.
- (D) Citomegalovírus - calcificações periventriculares, hepatoesplenomegalia e coriorretinite.
- (E) Herpes vírus - vesículas ou cicatrizes mucocutâneas, hidrocefalia e conjuntivite.

QUESTÃO 24

O estudo epidemiológico mais comum disponível que procura descrever padrões de doenças na população ou testar hipóteses relacionadas com o processo saúde/doença é o estudo do tipo:

- (A) coorte.
- (B) caso-controle.
- (C) transversal.
- (D) metanálise.
- (E) longitudinal.

QUESTÃO 25

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o aleitamento materno seja iniciado na primeira hora de vida, pois se associa a:

- (A) benefício nos índices hematológicos na idade de 3 a 6 meses, embora possa elevar a necessidade de fototerapia.
- (B) ganho ponderal satisfatório e maior risco de hemorragia materna.
- (C) benefício nos índices hematológicos evitando a fototerapia e menor risco de hemorragia materna.
- (D) um período maior de amamentação e melhor interação mãe-bebê.
- (E) benefício nos índices hematológicos evitando a fototerapia e melhor interação mãe-bebê.

QUESTÃO 26

Sobre as alterações fisiológicas que ocorrem na gravidez assinale a opção correta.

- (A) As alterações cardiovasculares mais relevantes são aumento da frequência cardíaca, aumento do volume sistólico, aumento do débito cardíaco, aumento da resistência vascular periférica e diminuição da pressão arterial média.
- (B) Ocorre diminuição na produção de hemácias e aumento do volume plasmático, configurando a anemia dilucional fisiológica da gravidez.
- (C) Pode ocorrer hidronefrose fisiológica por fatores hormonais e mecânicos, sendo mais comum a esquerda.
- (D) As principais modificações respiratórias são aumento da frequência respiratória, hiperventilação fisiológica, diminuição do volume corrente e dispnéia.
- (E) A contagem de leucócitos de 14 mil/mm³ é normal na gravidez, podendo atingir 30 mil/mm³ no parto e puerpério.

QUESTÃO 27

O pescoço pode ser uma das regiões mais devastadas no caso de lesão grave. Sobre este tema, é correto afirmar que:

- (A) classicamente o pescoço é dividido em 4 zonas.
- (B) a zona 1 se estende do anel torácico superior à cartilagem tireoideia.
- (C) a zona 3 contém as artérias carótidas e vertebrais, veias jugulares e estruturas do trato aerodigestório.
- (D) no caso de trauma penetrante, os pacientes devem ser levados imediatamente ao centro cirúrgico.
- (E) tradicionalmente, nas lesões da zona II é mandatória a exploração cirúrgica.

QUESTÃO 28

Para a análise crítica de estudos clínico-epidemiológicos são utilizados alguns elementos, sendo um deles a validade. Sobre os possíveis erros metodológicos que podem influenciar na validade de um estudo é correto afirmar que:

- (A) o erro aleatório é um resultado errado, obtido devido a um viés.
- (B) o erro sistemático é um resultado errado, obtido ao acaso.
- (C) o viés é uma diferença sistemática ("erro sistemático") entre os dados obtidos pela pesquisa e os dados verdadeiros na população fonte da pesquisa.
- (D) aumentando o tamanho da amostra reduzimos a influência do erro sistemático.
- (E) o erro aleatório causado pelo instrumento de medição compromete a acurácia da medida utilizada.

QUESTÃO 29

A cirurgia gástrica resulta em numerosas alterações fisiológicas causadas pela perda da função de reservatório, interrupção do mecanismo de esfíncter pilórico e transecção do nervo vago. Das chamadas síndromes pós-gastrectomia, aquela que se caracteriza por dor abdominal em cólica, diarreia explosiva, náuseas e vômitos associados à palpitação, taquicardia, tonturas e rubor é a:

- (A) síndrome da alça aferente.
- (B) gastrite de refluxo alcalino.
- (C) atonia gástrica.
- (D) síndrome da alça eferente.
- (E) síndrome de *Dumping*.

QUESTÃO 30

Assinale a opção cuja hemoglobinopatia está associada ao defeito na biossíntese das cadeias de globina:

- (A) policitemia.
- (B) anemia falciforme.
- (C) talassemias.
- (D) persistência hereditária da hemoglobina fetal.
- (E) hemoglobinopatias adquiridas.

QUESTÃO 31

Em relação aos aspectos epidemiológicos na adolescência, é correto afirmar que:

- (A) a principal causa de internações de adolescentes do sexo feminino no Sistema Único de Saúde (SUS) é gravidez, parto e puerpério.
- (B) a prática contraceptiva entre adolescentes brasileiras é menos frequente do que em mulheres adultas.
- (C) a experimentação/uso de alguma droga, principalmente álcool e tabaco, é pouco frequente e precoce dentre os adolescentes brasileiros.
- (D) as doenças crônicas na adolescência, como neoplasias, asma, sobrepeso e obesidade, ainda não refletem como problemas de saúde pública.
- (E) o início precoce da vida sexual e o uso pouco frequente de preservativos colocam os adolescentes em situação de especial vulnerabilidade às DST, sem comprometer sua saúde atual e futura.

QUESTÃO 32

O triângulo de *Hesselbach* é uma referência anatômica importante no reparo de hérnias inguinais. Assinale a alternativa correta.

- (A) É o local onde ocorrem as hérnias inguinais indiretas.
- (B) É limitado inferiormente pelo ligamento de *Cooper*.
- (C) Seu limite medial é o músculo oblíquo interno.
- (D) Lateralmente é demarcado pelos vasos epigástricos inferiores.
- (E) O assoalho desse triângulo é formado pelo tendão conjunto.

QUESTÃO 33

Lactente de treze meses de idade, sexo feminino, vacinada há trinta dias com vacina tríplice viral (SCR) e varicela (V), em administrações separadas. Houve ocorrência de surto de varicela na creche em que frequenta. Nessa situação, é correto afirmar que:

- (A) a vacina varicela em dose única é altamente eficaz e não é necessário a segunda dose para prevenção de formas leves da doença.
- (B) deve ser mantido o calendário original, com aplicação da segunda dose de reforço aos 15 meses de idade.
- (C) deve ser aplicada dose adicional da vacina varicela, além da dose de reforço prevista para os 15 meses de idade.
- (D) a vacina varicela em administração separada não possui o mesmo grau de prevenção da vacina SCR, e duas novas doses devem ser administradas da vacina SCR com intervalo de 30 dias.
- (E) para prevenir formas leves da doença deve ser antecipada a segunda dose preferencialmente nas primeiras 72 horas após o contato.

QUESTÃO 34

A razão de mortalidade materna reflete a qualidade da atenção à saúde e as condições de acesso aos serviços para a população feminina em idade reprodutiva. Sobre esta medida, assinale a opção correta.

- (A) Considera morte materna qualquer causa de morte relacionada ou agravada pela gravidez, ou por medidas em relação a ela, incluindo causas acidentais ou incidentais.
- (B) É obtida dividindo-se o número de óbitos por causas ligadas à gestação, parto e puerpério, em uma certa área e período, pelo número de nascidos vivos no mesmo local e período, multiplicado por 1000.
- (C) Utiliza como denominador o número de gestações ocorridas em período de um ano.
- (D) É uma medida de risco de óbito da mulher, no período transcorrido desde que a mesma se torna grávida até 42 dias após o término da gravidez.
- (E) Analisa o número de mortes maternas ocorridas em 100.000 partos.

QUESTÃO 35

Em relação às medidas de suporte de vida, assinale a alternativa correta de acordo com as Diretrizes da Ressuscitação Cardiopulmonar de 2010 e reforçada na edição de 2015.

- (A) O reconhecimento da parada cardiorrespiratória (PCR) na criança é feito por apneia ou respiração agônica (gasping) e resposta a estímulos, com ausência de pulso em grandes artérias.
- (B) A sequência de ressuscitação cardiorrespiratória C (circulação/compressões torácicas) - A (abertura de vias aéreas) - B (boas respirações [breathing]) é coerente para promoção/manutenção da circulação do sangue para órgãos vitais (coração e encéfalo).
- (C) A demora no início da ressuscitação da criança pode ser reduzida se houver dois socorristas presentes, o primeiro abre a via aérea e inicia as respirações e o segundo inicia as compressões torácicas tão logo o primeiro socorrista complete sua atividade.
- (D) Em crianças menores de um ano, a pulsação pode ser verificada no pulso braquial ou femoral, enquanto para maiores de um ano até a puberdade e adolescentes pode ser verificado no pulso carotídeo ou femoral.
- (E) Deve-se utilizar equipamento de desfibrilação externa automática (DEA) assim que estiver disponível, para funcionar como monitor cardíaco, somente em pacientes acima de um ano de idade.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa em que todas as doenças e agravos são de notificação imediata.

- (A) Poliomielite, febre amarela e tuberculose.
- (B) Síndrome respiratória aguda grave, febre amarela e tuberculose.
- (C) Síndrome respiratória aguda grave, varíola e febre amarela.
- (D) Poliomielite, raiva humana e hanseníase.
- (E) Febre do Nilo Ocidental, varíola e hanseníase.

QUESTÃO 37

As classificações de *DeBakey* e *Stanford* definem as dissecções aórticas com base na extensão anatômica. Sobre estas classificações, assinale a opção correta.

- (A) Tipo I de *DeBakey* são limitadas à aorta ascendente.
- (B) Tipo II de *DeBakey* envolvem a aorta ascendente e toracoabdominal.
- (C) Tipo IIIa de *DeBakey* envolvem a aorta torácica descendente e aorta abdominal.
- (D) Tipo IIIb de *DeBakey* são restritas à aorta torácica descendente.
- (E) Tipo I e tipo II de *DeBakey* correspondem ao tipo A de *Stanford*.

QUESTÃO 38

O maior número de eventos traumáticos com crianças pequenas, até o fim da idade escolar, acontece no seu próprio domicílio. Além das orientações para tornar a casa mais segura, ainda é recomendável educar as famílias sobre medidas específicas de prevenção dos diferentes tipos de injúrias. Quais as medidas específicas de prevenção de asfixia e de queimaduras no ambiente domiciliar, respectivamente?

- (A) Alimentar a criança sentada à mesa ou em cadeira alta e testar a temperatura do banho com o cotovelo.
- (B) Não permitir brincar ou correr durante as refeições e não ligar vários aparelhos em uma mesma tomada.
- (C) Jamais deixar a criança sozinha durante o banho, principalmente quando estiver utilizando banheira e esconder fósforos, velas e isqueiros.
- (D) Não fumar dentro de casa e cortar os alimentos em pedaços pequenos.
- (E) Sempre verificar a temperatura de madeiras e outros alimentos quentes e ter cuidado com objetos muito pequenos, como grãos de cereais, caroços de frutas e botões.

QUESTÃO 39

Considerando o histórico da epidemiologia no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) A organização dos sistemas nacionais de vigilância epidemiológica independe da definição clara de competências para cada um dos níveis do sistema de saúde (municipal, estadual e federal).
- (B) A atual política de centralização do SUS está possibilitando a reorganização dos sistemas locais de saúde, bem como aporte de recursos necessários à execução de suas atividades.
- (C) As campanhas de erradicação da poliomielite na década de 1960 e da varíola na década de 1970, aliadas à grave epidemia de sarampo ocorrida na década de 1970, contribuíram para consolidar, em meados daquela década, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica no Brasil.
- (D) Na prática regulatória evidências sobre eficácia de medicamentos e vacinas são estabelecidas por meio de estudos observacionais (controlados e randomizados), porém, para a maioria das outras questões regulatórias as evidências em populações humanas têm obrigatoriamente que ser derivadas de estudos experimentais.
- (E) Enquanto o desenvolvimento de inovações concentra-se em poucas nações industrializadas que agregam recursos para fazê-lo, a responsabilidade pela regulação destas inovações é tarefa inerente de cada Estado cuja população venha a utilizar tais inovações.

QUESTÃO 40

São causas de anemia microcítica, EXCETO:

- (A) deficiência de ferro.
- (B) anemia por deficiência de tiamina.
- (C) anemia sideroblástica.
- (D) envenenamento por chumbo.
- (E) síndromes talassêmicas.

QUESTÃO 41

Assinale a alternativa que melhor define o conceito de morbidade.

- (A) A capacidade de determinada doença em produzir danos à saúde.
- (B) Ocorrência de doenças e agravos à saúde em uma dada população.
- (C) Taxa de manifestação de uma determinada doença.
- (D) Proporção de óbitos em relação ao número de casos.
- (E) Índice demográfico que reflete o número de mortes registradas.

QUESTÃO 42

Sobre as respostas hormonais ao estresse cirúrgico, como se encontram, respectivamente, os níveis plasmáticos dos hormônios aldosterona, cortisol e insulina?

- (A) Reduzidos, aumentados e reduzidos.
- (B) Reduzidos, reduzidos e aumentados.
- (C) Aumentados, aumentados e reduzidos.
- (D) Aumentados, aumentados e aumentados.
- (E) Aumentados, reduzidos e aumentados.

QUESTÃO 43

Em relação aos óbitos ocorridos, qual dado é usado para o cálculo da taxa de mortalidade infantil neonatal?

- (A) Até 28 dias de vida.
- (B) Entre 0 e 6 dias de vida.
- (C) Até 2 meses de vida.
- (D) Até 6 meses de vida.
- (E) Até 12 meses de vida.

QUESTÃO 44

O distúrbio do movimento hipercinético caracterizado por contrações musculares sustentadas ou repetidas, padronizadas e involuntárias, frequentemente associadas a movimentos de torção e postura anormal é:

- (A) mioclonia.
- (B) distonia.
- (C) atetose.
- (D) coréia.
- (E) tique.

QUESTÃO 45

Gestante de 32 anos, G2/P1 (parto normal), IG: 31 semanas + 3 dias, sem comorbidades, foi internada na maternidade com diagnóstico de amniorrexe prematura, com saída de líquido claro. Ao exame: tônus uterino normal, atividade uterina ausente e toque vaginal evidenciando colo posterior, grosso e fechado, apresentação cefálica e bolsa rota. Após ser hospitalizada, qual das opções abaixo representa a melhor conduta para o caso?

- (A) Ampicilina 2g intravenosa de 6/6 horas por 48 horas, azitromicina 1 g em dose única, amoxicilina 500 mg de 8/8 horas por 5 dias, corticoterapia para maturação pulmonar e interrupção da gestação após 7 dias.
- (B) Ampicilina 2g intravenosa em dose de ataque, seguido de 1g de 4/4 horas, tocólise, corticoterapia para maturação pulmonar e interrupção da gestação após 48 horas.
- (C) Ampicilina 2g intravenosa em dose de ataque, seguido de 1g de 4/4 horas, corticoterapia para maturação pulmonar, tocólise por 48 horas, rastreio infeccioso, avaliação do bem estar fetal e interrupção da gestação com 34 semanas.
- (D) Ampicilina 2g intravenosa de 6/6 horas por 48 horas, azitromicina 1g em dose única por via oral, seguida por amoxicilina 500 mg de 8/8 horas por 5 dias, corticoterapia para maturação pulmonar, rastreio infeccioso e avaliação do bem-estar fetal e interrupção da gestação com 34 semanas.
- (E) Interrupção da gestação por cesariana.

QUESTÃO 46

Sobre a fisiologia do ciclo menstrual, assinale a afirmativa correta.

- (A) Enquanto o corpo lúteo do ciclo anterior involui, ocorre diminuição da produção lútea de progesterona e inibina B, possibilitando a elevação dos níveis de FSH.
- (B) A teoria da dupla célula, determina que com a estimulação pelo LH, as células da granulosa produzem androgênios, que são convertidos em estrogênios pela ação da aromatase.
- (C) O folículo dominante possui menor número de receptores de FSH e produzem maior concentração de estrogênio e inibina B.
- (D) O corpo lúteo secreta estrogênio, progesterona e inibina A, que servem para manter a supressão das gonadotrofinas.
- (E) O estrogênio estimula o crescimento e diferenciação da camada basal do endométrio, que se prepara para a implantação quando ocorre gestação.

QUESTÃO 47

Segundo o estadiamento da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia 2009 (FIGO) para o carcinoma de vulva, as lesões com mais de 2 cm ou com invasão do estroma maior que 1 mm, limitadas à vulva ou ao períneo, com linfonodos negativos deve ser classificada em qual estágio?

- (A) IA.
- (B) IB.
- (C) II.
- (D) IIA.
- (E) IVA.

QUESTÃO 48

Durante uma consulta de puericultura de um lactente de quatro meses, com o desenvolvimento normal, de acordo com os marcos do desenvolvimento motor, o pediatra deve observar que ele é capaz de:

- (A) transmitir objetos de uma mão para a outra.
- (B) efetuar pinça polegar-dedo.
- (C) sentar com apoio, sustentar a cabeça.
- (D) rolar no leito.
- (E) ficar em pé.

QUESTÃO 49

Sobre os estudos tipo caso-controle, assinale a alternativa correta.

- (A) Têm como desvantagem serem de alto custo.
- (B) Não é útil para o estudo de doenças raras.
- (C) Permite avaliação simultânea de diversos fatores de risco.
- (D) É comum haver perda de seguimento.
- (E) Melhor estudo para estimar a incidência das doenças.

QUESTÃO 50

Lactente, cinco meses, ativo, aleitamento materno exclusivo, chega à unidade de pronto atendimento com quadro de diarreia aguda há um dia relatado pela mãe. Não apresenta sinais de desidratação. De acordo com o quadro clínico:

- (A) a criança pode ser tratada no domicílio, deve continuar a ser amamentada normalmente e deve ser oferecido de 50 a 100 ml de solução de reidratação oral após cada evacuação diarreica.
- (B) a criança pode ser tratada no domicílio, deve-se interromper a amamentação enquanto durar o quadro diarreico e oferecer de 100 a 200 ml de solução de reidratação oral após cada evacuação diarreica.
- (C) a criança deve ficar em observação na unidade de saúde, deve-se interromper a amamentação enquanto durar o quadro diarreico e realizar hidratação endovenosa.
- (D) a criança pode ser tratada no domicílio, deve-se interromper a amamentação enquanto durar o quadro diarreico e oferecer solução de reidratação oral o quanto aceitar, após cada evacuação diarreica.
- (E) a criança deve ficar em observação na unidade de saúde, continuar a ser amamentada normalmente e realizar reposição com solução de reidratação oral por sonda nasogástrica em pequenos volumes.

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assinhe corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
- 4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
 - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
 - fazer uso de banheiro; e
 - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 5 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 6 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 7 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 8 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 90 minutos.
- 9 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
 - a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;
 - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
 - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;
 - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
 - e) cometer ato grave de indisciplina; e
 - f) comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 10 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
 - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
 - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
 - c) assinhe o seu nome no local indicado;
 - d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica; e
 - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

Diretoria de Ensino da Marinha

Nome: ROBERTO SILVA

Assinatura: Roberto Silva

Instruções de Preenchimento

- Não rasure esta folha.
- Não rubriche nas áreas de respostas.
- Faça marcas sólidas nos círculos.
- Não use canetas que borrem o papel.

ERRADO: CORRETO:

PREENCHIMENTO DO CANDIDATO

Inscrição: 5 7 0 2 0 7 DV: 0

P: 2 G: 4

Questões 01 a 25 com opções A, B, C, D, E e respostas marcadas.

TARJA

- 12 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO											PROVA DE COR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50