

**MARINHA DO BRASIL**  
**DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA**

*(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, SOB A FORMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO PARA ENFERMEIROS, NOS MOLDES DE RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM (C-EENF) DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD) EM 2014)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL EXTRA**

**ENFERMAGEM CLÍNICA  
E  
CIRURGIA GERAL**

- 1) NÃO configura causa de hiperpotassemia.
- (A) Transfusão maciça de sangue armazenado.
  - (B) Necrose celular extensa.
  - (C) Período prolongado de vômito e diarreia.
  - (D) Cetoacidose diabética.
  - (E) Insuficiência renal grave.
- 2) A glomerulonefrite é uma inflamação dos capilares glomerulares. Uma das complicações da glomerulonefrite aguda é
- (A) edema pulmonar.
  - (B) infarto.
  - (C) hipotensão.
  - (D) tumor renal.
  - (E) lesão medular.
- 3) Analise as afirmativas abaixo quanto aos cuidados prescritos para submeter o recém-nascido à fototerapia:
- I - proteger os olhos do neonato.
  - II - monitorar para prevenção de hipertermia.
  - III- aplicar solução oleosa para prevenir assadura.
  - IV - expor maior área de superfície corporal.
- Assinale a opção correta.
- (A) Apenas a afirmativa I é correta.
  - (B) Apenas a afirmativa III é correta.
  - (C) As afirmativas I e III são corretas.
  - (D) As afirmativas I, II e IV são corretas.
  - (E) As afirmativas II, III e IV são corretas.
- 4) A principal finalidade da administração da vitamina K no recém-nascido é
- (A) prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido.
  - (B) estimular a produção de insulina pelo pâncreas.
  - (C) acelerar o processo de maturação do intestino.
  - (D) produzir anticorpos necessários para a defesa do organismo.
  - (E) acelerar o processo de sintetização de vitamina D pela flora intestinal.

- 5) A paralisia de BELL é causada pela inflamação unilateral do sétimo nervo craniano. Esse tipo de paralisia acomete qual região do corpo?
- (A) Braços.
  - (B) Face.
  - (C) Tórax.
  - (D) Pernas.
  - (E) Genitália.
- 6) Qual das alternativas abaixo ocorre quando a função do córtex da supra-renal é inadequada para satisfazer as necessidades de hormônios corticais do paciente?
- (A) Síndrome de cushing.
  - (B) Síndrome nefrótica.
  - (C) Insuficiência renal aguda.
  - (D) Doença de addison.
  - (E) Feocromocitoma.
- 7) Após diluída e mantida em correto acondicionamento em geladeira, a vacina tríplice viral pode ser utilizada em até quantas horas?
- (A) 2
  - (B) 4
  - (C) 6
  - (D) 8
  - (E) 12
- 8) Correspondem a sinais e sintomas de Meningite Bacteriana:
- (A) febre, anorexia e mialgia.
  - (B) coriza, náuseas e vômitos.
  - (C) agitação, cefaleia e dispneia.
  - (D) petéquias, sudorese e prostração.
  - (E) rigidez de nuca, febre e tosse.

Prova : Amarela  
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/14

9) Correlacione a ocorrência com o tipo de complicação relacionada ao uso de sonda nasointestinal. Assinale a opção que representa a sequência correta.

- |                            |     |                         |
|----------------------------|-----|-------------------------|
| I - Náuseas e vômitos      | ( ) | Fixação inadequada      |
| II - Deslocamento da sonda | ( ) | Terapia com antibiótico |
| III- Aspiração             | ( ) | Medicações maceradas    |
| IV - Diarréia              | ( ) | Obstrução intestinal    |
| V - Oclusão da sonda       | ( ) | Regurgitação da fórmula |
|                            | ( ) | Hipoglicemia            |

- (A) (II) (III) (-) (I) (V) (IV)  
(B) (II) (IV) (V) (I) (III) (-)  
(C) (V) (-) (II) (I) (III) (IV)  
(D) (III) (V) (II) (-) (IV) (I)  
(E) (I) (V) (-) (II) (IV) (III)

10) O que utilizamos no tratamento preventivo da oftalmia neonatal?

- (A) Colírio ou pomada oftálmica de tetraciclina a 2%.  
(B) Colírio ou pomada oftálmica de eritromicina a 2,5%.  
(C) Solução de nitrato de prata a 2%  
(D) Solução fisiológica à 0,9%.  
(E) Solução de nitrato de prata a 1%.

11) Em relação às emergências psiquiátricas é correto afirmar que

- (A) deve-se evitar colher história suplementar com os familiares do paciente durante a consulta.  
(B) os pacientes nunca estão motivados a revelar-se e cooperar para obter alívio do sofrimento.  
(C) o relacionamento do profissional com o paciente não é determinante para que este possa dizer o que sente.  
(D) o maior erro é considerar uma doença física como causa de uma condição emocional.  
(E) o profissional deve ser direto, honesto, calmo, porém firme, mostrando quem está no controle.

Prova : Amarela  
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/14

- 12) Assinale a mudança fisiológica da gravidez exclusiva ao terceiro trimestre:
- (A) Sinal de Chadwick.
  - (B) Contrações de Braxton-Hicks.
  - (C) Mal-estar matinal.
  - (D) Menor frequência urinária.
  - (E) Início de movimento no abdome.
- 13) Esforço, tosse intensa e a manobra de valsalva são fatores que afetam a cicatrização de uma ferida. Uma das intervenções de enfermagem diante destes estressores é
- (A) monitorar níveis glicêmicos e sinais vitais.
  - (B) incentivar a mudança de posição e a deambulação.
  - (C) fornecer proteção para evitar infecção.
  - (D) providenciar a reposição de líquidos.
  - (E) administrar suplementos de vitamina.
- 14) Quanto à urgência, uma cirurgia pode ser classificada como
- (A) grande.
  - (B) diagnóstica.
  - (C) construtiva.
  - (D) paliativa.
  - (E) eletiva.
- 15) Quanto à tuberculose é INCORRETO afirmar que:
- (A) a transmissão da tuberculose se faz por via respiratória, pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de um doente com tuberculose ativa.
  - (B) quanto menor a intensidade da tosse e a concentração de bacilos no ambiente e quanto maior a ventilação desse ambiente, maior será a probabilidade de infectar os circunstantes.
  - (C) com o início do tratamento adequado e o uso correto dos medicamentos anti tuberculose em pacientes infectados, a transmissibilidade diminui rapidamente em 2 a 3 semanas.
  - (D) ocorrendo a infecção pelo bacilo da tuberculose, as pessoas com maior risco de adoecer são aquelas com imunidade comprometida.
  - (E) destacam-se como ambiente foco das medidas de controle de transmissão da tuberculose, o domicílio do paciente, seu ambiente de trabalho e as unidades de saúde nas quais é atendido.

Prova : Amarela  
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/14

- 16) Sob o ponto de vista estrutural epidemiológico das doenças transmissíveis, uma das propriedades de um bioagente patogênico é definida como a qualidade que tem o agente infeccioso de, uma vez instalado no organismo do homem e de outros animais, produzir sintomas em maior ou menor proporção dentre os hospedeiros infectados. Qual das propriedades listadas abaixo corresponde a essa definição?
- (A) Virulência.
  - (B) Infectividade.
  - (C) Poder Imunogênico.
  - (D) Poder Invasivo.
  - (E) Patogenicidade.
- 17) Após uma ressecção transuretral de próstata, a obstrução do cateter vesical é uma complicação comum. Em relação a este fato é correto afirmar que
- (A) a irrigação contínua do cateter não pode ser prescrita para retirar coágulos obstrutivos.
  - (B) a troca do cateter vesical é indicada para solucionar a obstrução no pós-operatório.
  - (C) um cateter Foley dupla via é adequado para realizar a irrigação contínua da bexiga.
  - (D) a quantidade de líquido recuperado na bolsa coletora de drenagem após a irrigação da bexiga, deve diferir da quantidade injetada.
  - (E) a distensão excessiva da bexiga deve ser evitada porque pode induzir hemorragia.
- 18) O efeito Somogyi é uma das causas de
- (A) hiperglicemia matinal.
  - (B) icterícia e anúria.
  - (C) câncer raquimedular.
  - (D) insuficiência renal aguda.
  - (E) insuficiência renal crônica.
- 19) Qual é o medicamento utilizado para aumentar a frequência cardíaca nos casos de bradicardia sinusal, bloqueio sinoatrial e ritmos juncionais de baixa frequência?
- (A) Propanolol.
  - (B) Lidocaína
  - (C) Atropina.
  - (D) Metoprolol.
  - (E) Esmolol.

Prova : Amarela  
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/14

- 20) A portaria 1.943, de 18 de outubro de 2001, define a relação de doenças de notificação compulsória para todo território nacional. Nesta relação, os casos suspeitos de quais doenças listadas abaixo deverão ser notificados de forma imediata às Secretarias Estaduais de Saúde?
- (A) Botulismo, hantavirose e varíola.
  - (B) Hepatite C, leptospirose e tuberculose.
  - (C) Hantavirose, cólera e hanseníase.
  - (D) Botulismo, hantavirose e dengue.
  - (E) Carbúnculo, peste e tétano.
- 21) Marque a posição corporal do paciente na qual a distribuição de seu peso é colocada no íleo anterior, úmero e clavícula.
- (A) Sims.
  - (B) Fowler.
  - (C) Pronação.
  - (D) Trendelenburg.
  - (E) Dorsal.
- 22) Uma das complicações potenciais de uma cirurgia cardíaca é o tamponamento cardíaco. São sinais e sintomas de tamponamento cardíaco:
- (A) hipotensão arterial, taquicardia e débito urinário decrescente.
  - (B) hipertensão arterial, débito urinário crescente e taquicardia.
  - (C) hipertensão arterial, bradicardia e batimentos cardíacos abafados.
  - (D) hipertensão arterial, taquicardia e débito cardíaco decrescente.
  - (E) hipotensão arterial, bradicardia e batimentos cardíacos hipercinéticos.
- 23) Considerando os diversos tipos de edema cerebral, aquele que predomina na substância branca é o edema
- (A) vasogênico.
  - (B) citotóxico.
  - (C) intersticial.
  - (D) hidrostático.
  - (E) hiposmótico.

Prova : Amarela  
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/14

- 24) O sinal de Brudzinski positivo em um paciente, é indicativo de
- (A) colelitíase.
  - (B) lesão medular.
  - (C) trombose.
  - (D) tetania.
  - (E) irritação meníngea.
- 25) De acordo com o Capítulo V do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (RESOLUÇÃO COFEN 311/2007) que trata sobre Infrações e Penalidades, são consideradas circunstâncias agravantes, EXCETO:
- (A) cometer a infração por motivo fútil.
  - (B) causar danos irreparáveis.
  - (C) cometer infração dolosamente.
  - (D) aproveitar-se da fragilidade da vítima.
  - (E) realizar atos sob coação e/ou intimidação.
- 26) Das penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, a Suspensão do exercício profissional consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a quantos dias?
- (A) 07
  - (B) 15
  - (C) 28
  - (D) 29
  - (E) 30
- 27) A pessoa que exhibe padrão de reclusão social por toda a vida, desconforto com as relações humanas, introversão e afeto embotado, e pode ser vista pelos outros como excêntrica, isolada e solitária, apresenta transtorno de personalidade do tipo
- (A) borderline.
  - (B) narcisista.
  - (C) bipolar.
  - (D) histriônica.
  - (E) esquizoide.

Prova : Amarela  
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/14



- 28) Qual das opções é causa frequente de extra-sístoles ventriculares, principalmente quando ocorre bigeminismo?
- (A) Taquipnéia transitória.
  - (B) Angina pectoris.
  - (C) Bloqueio de ramo.
  - (D) Hipercalcemia.
  - (E) Intoxicação digitálica.
- 29) Das complicações potenciais depois de uma cirurgia intestinal, identifique a alternativa INCORRETA.
- (A) Íleo paralítico.
  - (B) Formação de abscesso.
  - (C) Ruptura da ferida.
  - (D) Deiscência da anastomose.
  - (E) Edema pulmonar.
- 30) Possui mecanismo de transmissão por meio de sangue infectado, principalmente pela via parenteral, sendo a transmissão vertical e sexual pouco frequente, a hepatite
- (A) A.
  - (B) B.
  - (C) C.
  - (D) D.
  - (E) E.
- 31) A regra dos nove é um meio rápido para calcular a extensão de queimaduras. Sendo assim, qual o percentual estimado de área de superfície corporal lesionada em uma vítima com queimaduras na cabeça, genitália e membro inferior esquerdo?
- (A) 09%
  - (B) 19%
  - (C) 27%
  - (D) 28%
  - (E) 36%
- 32) Expectoração de sangue proveniente do trato respiratório é
- (A) hemotórax.
  - (B) hemoptise.
  - (C) epistaxe.
  - (D) empiema.
  - (E) atelectasia.

Prova : Amarela  
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/14

33) Corresponde ao quadro clínico da Dengue Clássica:

- I - febre alta
- II - hemorragia
- III- dor retroorbitária
- IV - mialgia

Assinale a alternativa correta.

- (A) Apenas a alternativa I é verdadeira.
- (B) Apenas a alternativa IV é verdadeira.
- (C) As alternativas I e II são verdadeiras.
- (D) As alternativas I, III e IV são verdadeiras.
- (E) As alternativas II, III e IV são verdadeiras.

34) Um paciente de 24 anos de idade foi recebido na emergência com midríase, calafrios, vômitos e fraqueza muscular. Esse conjunto de sintomas desenvolve-se na intoxicação por

- (A) opióide.
- (B) barbitúrico.
- (C) maconha.
- (D) cocaína.
- (E) cafeína.

35) A Síndrome de Turner é considerada uma alteração cromossômica causada por

- (A) presença de um cromossomo X a mais.
- (B) ausência de um dos cromossomos X.
- (C) presença de três cromossomos, sendo um Y.
- (D) anomalia do braço longo do cromossomo X.
- (E) ausência do cromossomo Y.

36) São sinais e sintomas de intoxicação digitálica:

- (A) anorexia, diarreia, hipertensão e disúria.
- (B) anorexia, náuseas, hipertermia e dor.
- (C) anorexia, náuseas, vômitos e fadiga.
- (D) dor, lipotimia, diarreia e distúrbios visuais.
- (E) vômitos, lipotimia, hipotensão e polifagia.

Prova : Amarela  
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/14

- 37) De acordo com o Manual de Normas de Vacinação, NÃO é uma contra-indicação à vacinação.
- (A) Imunodeficiência adquirida.
  - (B) Neoplasia maligna.
  - (C) Internação hospitalar.
  - (D) Quimioterapia.
  - (E) Radioterapia.
- 38) Na assistência de enfermagem ao paciente em uso de nutrição parenteral, um dos cuidados do enfermeiro é evitar que soluções parenterais ultrapassem um período superior de 24 horas após serem instaladas. A limitação deste tempo ocorre por serem soluções que
- (A) causam diarreia se continuarem sendo infundidas.
  - (B) favorecem a proliferação de microorganismos.
  - (C) cristalizam após 24 horas de infusão.
  - (D) promovem o aumento de enzimas cardíacas.
  - (E) aumentam o risco para hemorragia digestiva.
- 39) A escala de Apgar é utilizada para avaliação e determinação do estado geral do recém-nascido. Sobre essa escala podemos dizer que
- (A) a avaliação geralmente é realizada uma vez após o nascimento.
  - (B) uma pontuação total de 4 a 6 representa sofrimento grave.
  - (C) ao apresentar choro com algum movimento, O RN receberá 2 pontos.
  - (D) quatro itens são avaliados para a determinação do estado geral do recém-nascido.
  - (E) apresentando corpo róseo e extremidades cianóticas o RN receberá 1 ponto.
- 40) Segundo o Ministério da Saúde, a vacina anti-sarampo deve obedecer ao seguinte esquema de doses e via de administração, respectivamente:
- (A) 1 dose, intradérmica.
  - (B) 1 dose, oral.
  - (C) 1 dose, intramuscular.
  - (D) 2 doses, intramuscular.
  - (E) 2 doses, subcutânea.

Prova : Amarela  
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/14

- 41) Assinale a opção que indica um princípio da assepsia cirúrgica.
- (A) Um item estéril que toca itens limpos, contaminados ou questionáveis ainda é considerado estéril.
  - (B) Quando o profissional que realiza o procedimento estéril estiver gripado, o uso de máscara simples é suficiente para garantir a não contaminação do material.
  - (C) Qualquer objeto que seja carregado abaixo da cintura é considerado contaminado, uma vez que nem sempre está ao alcance da visão.
  - (D) Pode ser utilizada uma embalagem estéril úmida, desde que dentro do período de validade de esterilização.
  - (E) As extremidades de um campo ou recipiente estéril são consideradas estéreis.
- 42) Sobre o desenvolvimento do recém-nascido podemos dizer que
- (A) apenas as fontanelas anteriores são palpáveis ao nascimento.
  - (B) até 10% do peso corporal é perdido nos primeiros dias de vida.
  - (C) o sistema auditivo funciona a partir de alguns dias após o nascimento.
  - (D) os movimentos do recém-nascido são assimétricos e esporádicos.
  - (E) a sístole e a diástole têm maior duração e menor intensidade no RN.
- 43) O bloqueio atrioventricular de terceiro grau é um tipo de distúrbio de condução onde os impulsos elétricos são
- (A) completamente bloqueados e não alcançam os ventrículos.
  - (B) retardados antes de alcançar o sistema de condução.
  - (C) bloqueados dentro do nódulo atrioventricular.
  - (D) parcialmente bloqueados em intervalos regulares.
  - (E) bloqueados em intervalos irregulares.
- 44) O Cor pulmonale é uma doença cardíaca pulmonar resultante da hipertensão pulmonar. O cor pulmonale é considerado uma condição onde ocorre
- (A) aumento do ventrículo esquerdo.
  - (B) atrofia do átrio esquerdo.
  - (C) diminuição do ventrículo direito.
  - (D) aumento do ventrículo direito.
  - (E) obstrução da artéria pulmonar.

Prova : Amarela  
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/14

- 45) Prevenção em Saúde Pública é a ação antecipada, tendo por objetivo interceptar ou anular a evolução de uma doença. A prevenção pode ser feita nos períodos de pré-patogênese e patogênese, em níveis primário, secundário e terciário. Nesse contexto, de acordo com a história natural e prevenção de doenças qual das alternativas abaixo menciona um exemplo de prevenção secundária?
- (A) Efetuar imunização.
  - (B) Realizar controle de vetores.
  - (C) Evitar sequelas.
  - (D) Promover terapia ocupacional.
  - (E) Proporcionar saúde ocupacional.
- 46) Assinale o nome do reflexo provocado para avaliação do tônus muscular no recém-nato.
- (A) Brudzinski.
  - (B) Kerning.
  - (C) Glabellar.
  - (D) Babinski.
  - (E) Moro.
- 47) O balão Intra Aórtico é um método de assistência circulatória utilizado em casos de choque cardiogênico. Seu mecanismo de funcionamento consiste em um sistema de inflar/desinflar sincronizado automaticamente com os batimentos cardíacos. Desta forma, em qual momento do ciclo cardíaco o balão intra-aórtico é inflado?
- (A) Início da sístole.
  - (B) Início da diástole.
  - (C) Final da sístole.
  - (D) Final da diástole.
  - (E) No meio da sístole.
- 48) Assinale o mecanismo de perda de calor que é minimizado pela rápida secagem da pele, do cabelo e colocação do recém-nascido em berço aquecido, logo após o nascimento.
- (A) Condução.
  - (B) Convecção.
  - (C) Evaporação.
  - (D) Radiação.
  - (E) Resfriamento.

Prova : Amarela  
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/14

- 49) Na diálise peritoneal, quando o líquido peritoneal não drena de maneira adequada, sem evidências de obstrução do cateter, de que maneira o enfermeiro pode facilitar a drenagem?
- (A) Suspender a diálise e reposicionar o cateter.
  - (B) Empurrar mais o cateter até ocorrer a drenagem.
  - (C) Puxar o cateter e mobilizá-lo até ocorrer a drenagem.
  - (D) Virar o paciente de um lado para o outro.
  - (E) Introduzir 30ml de solução glicosada a 5% pelo cateter.
- 50) Em qual fase da cicatrização de uma ferida, o tecido de granulação é formado?
- (A) Inflamatória.
  - (B) Proliferativa.
  - (C) Reabsortiva.
  - (D) Maturação.
  - (E) Exsudativa.

Prova : Amarela  
Profissão : ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA

Concurso : C-EENF/14